EINS
MIT GETREIDE.

Inatreq™ active

Ein Wirkstoff aus einer
neuen Wirkstoffgruppe
zur Bekämpfung von
Pilzkrankheiten im Getreide

Neue Wirkstoffgruppe

Inatreq™ active ist nicht nur ein neuer Wirkstoff, sondern repräsentiert gleichzeitig eine ganz neue Wirkstoffgruppe im Getreide – die Picolinamide.

Wichtigste Wirkstoffgruppen in Getreidefungiziden gegen Blattkrankheiten und deren Einführungsjahr in Deutschland

1969+	1976+	1996+	2003+	2022
Morpholine	Azole	Strobilurine	Carboxamide	Picolinamide
5	3	11	7	21
FRAC* Code				

Inatreq™ active

mit

i-Q4™
Technologie

Neue Wirkstoffgruppe

Eigenschaften

Neue Wirkstoffgruppe Chemische Klasse:
Picolinamide

Natürliche Herkunft

Entwickelt aus einem *Streptomyces*
Stamm, produziert durch Fermentation,
komplettiert durch eine einzige
Modifikation

Exzellente Leistung

Langandauernder Schutz und hohe kurative
Wirksamkeit

Eigenschaften

Optimierte Formulierung

Verbesserte Retention und Verteilung auf der Blattoberfläche bei gleichzeitiger Mobilität in der Pflanze

Neues Tool für das Resistenzmanagement

Ein neuer Wirkungsmechanismus bei den Getreidefungiziden

Ausgezeichnetes toxikologisches Profil

Sehr geringe Warmblütertoxizität und niedrige Persistenz in der Umwelt

Der Wirkstoff

Neuer Wirkstoff natürlichen Ursprungs

Idee

Identifikation

Isolierung

Fermentation

Produktion

Anwendung

Neuer Wirkstoff natürlichen Ursprungs

Streptomyces spp. bildet durch Ausscheidungen einen Hemmhof, und sichert so seinen Lebensraum gegenüber konkurrierenden Mikroorganismen.

Die Ausscheidungen kristallisieren und sind im Mikroskop als bläuliche Splitter sichtbar.

Neuer Wirkstoff natürlichen Ursprungs

Natürliche Aktivsubstanz

Stabilisierung

Aktivierung

Molekülstabilisierung für den Feldeinsatz
durch Anlagerung eines Esters.

In der Pflanze und im Pilz wird diese Schutzgruppe wieder durch Esterasen (Enzyme) abgespalten.

Inatreq™ active konvertiert dadurch zurück zur natürlichen Aktivsubstanz (UK-2A).

Neuer Wirkstoff natürlichen Ursprungs

Abbau im Boden

Abbau von Inatreq™ active im Vergleich zu Referenzprodukten

Inatreq degradiert* äußerst schnell im Boden

Inatreq und UK-2A zerfallen dort zu nicht biologisch aktiven Komponenten

Neuer Wirkstoff natürlichen Ursprungs FRAC* Einstufungen von Wirkungsmechanismen bei Fungiziden

Mode of Action of Fungicides
FRAC classification on mode of action 2018 (www.frac.info)

C: Respiration

C4: complex III
cytochrome bc1(ubiquinone reductase) at Qi site
21 Qil fungicides (Quinone inside Inhibitors)

Group 21

cyano-imidazole
cyazofamid

sulfamoyl-triazole
amisulbrom

picolinamide
fenpicoxamid
florylpicoxamid

Erster Wirkstoff in der neuen
Getreidfungizidklasse **Picolinamide**

Blockade der Energieproduktion an
der Innenseite der Zellmembran
(Quinone-inside-Inhibitor **Qil**)

Wirkungsmechanismus

Alte Wirkorte

Triazole:
Hemmung der Ergosterolbiosynthese

Carboxamide:
Blockade der Energieproduktion
(Succinat-Dehydrogenase-Inhibitor)

Strobilurine:
Blockade der Energieproduktion
Aussenmembran (Qol)

NEU: Picolinamide (Inatreq)
**Blockade der Energieproduktion
Innenmembran (Qil)**

- ➔ Inatreq active blockiert im Mitochondrium der Pilzzelle den Elektronentransfer der Atmungskette zur Energieproduktion
- ➔ Die Produktion des Energieträgers ATP wird gestoppt.
- ➔ Lebenswichtige biologische Prozesse werden unterbrochen und führen zum Absterben des Pilzes.

Neuer Wirkort

Innenseite der Membran Komplex III:
Quinone-inside-Inhibitor (QiI)

Inatreq active blockiert die mitochondriale Atmung in der Pilzzelle durch Störung des Elektronentransfers

Kreuzresistenzen zu Aktivsubstanzen anderer Komplexe existieren nicht

Resistenzmanagement

Inatreq active ist ein neues und wirkungsvolles Werkzeug für ein nachhaltiges Resistenzmanagement

- im Getreidefungizidbereich **einzigartiger Wirkort**
- **keine Kreuzresistenz** zu anderen Wirkstoffgruppen (Azole, Carboxamide, Strobilurine)

Spritzfolgen können jetzt noch vielfältiger gestaltet werden, um Resistenzen zu vermeiden und Wirkstoffe zu schonen.

Resistenzmanagement

Wirkung auf Fungizid-angepasste Septoria-Stämme

Keine Kreuzresistenz gegenüber Strobilurinen oder Triazolen oder SDHI resistenten Stämmen

Resistenzmanagement

Applikation BBCH 45/49, Bildaufnahme 40 Tage nach Applikation

Univoq: Inatreq active + Prothioconazol
Questar: Inatreq active

Resistenzmanagement

Aktives Resistenzmanagement – Jährliche Untersuchung von Feldproben

Probenstandorte mit intensivem Versuchslayout

Probenstandorte Einzelproben

- Untersuchung auf Resistenzentwicklung **aller** fungiziden Wirkstoffgruppen
- Untersuchungstechniken: Molekular, Nährmedien, Pflanzen

Formulierung, Aufnahme und Verteilung

Die i-Q4™ Technologie ist eine Formulierung, die speziell für Produkte auf Basis von Inatreq active entwickelt worden ist – das bedeutet:

1

Starke Leistung

Verstärkt die Wirkungsbreite und Wirkungssicherheit von Inatreq active

2

Volle Kompatibilität

Sorgt für problemlose Mischbarkeit und stabilisiert die Performance von Tankmischpartnern

3

Höchste Flexibilität

Ermöglicht eine flexible Wasseraufwandmenge, freie Düsenwahl und hohe Fahrgeschwindigkeit

i

Inatreq active

Q

Qualität

4

4 innovative Eigenschaften

ANHAFTUNG

**Starke
Anhaftung der
Sprühtropfen**

BENETZUNG

**Komplette
Benetzung der
Blattoberfläche**

AUFNAHME

**Schnelle Aufnahme
in die Wachsschicht**

VERTEILUNG

**Hohe Wirkstoff-
konzentration im
Blattgewebe**

i-Q4™ Formulierungstechnologie

Komfortables Ansetzen der Spritzbrühe

Überragende Löslichkeit
gepaart mit
höchster Kompatibilität

Härtebereich	°dH
1 (weich)	bis 7,3
2 (mittel)	7,3 bis 14
3 (hart)	14 bis 21,3
4 (sehr hart)	über 21,3

i-Q4™ Formulierungstechnologie

Löslichkeit & Kompatibilität

- **Kompatibilitätsstudien**
 - Labor-, Gewächshaus- und Feldstudien
 - Löslichkeit, Mischbarkeit, Physikalische Kompatibilität und pflanzliche Verträglichkeit
 - Einzel und mehrfache Tankmischungen
- **Wasserbedingungen** (pH, Härte, Temperatur)
- **Formulierungstypen** (WG, SC, EC, OD...)
- **Tankmischpartner** (Fungizide, Herbizide, Insektizide, Wachstumsregulatoren, Flüssigdünger, Mikronährstoffe...)

**Die Ergebnisse bestätigen die
Vorzüglichkeit der iQ4 Formulierung!**

i-Q4™ Formulierungstechnologie

Starke **Anhaftung** durch Löschblatteffekt

Die Sprühtropfen werden wie bei einem Löschblatt “angesaugt”.

Das Fungizid bleibt da, wo es benötigt wird: auf der Pflanze – ohne abzuperlen

i-Q4™ Formulierungstechnologie

Vollständige Benetzung

Die i-Q4 Formulierung bewirkt die Mobilität des Wirkstoffes auf dem Blatt und sorgt für einen umgehenden Schutz der Pflanze vor auftretenden Pilzsporen

Quelle: Corteva R&D, Indianapolis, 2020

i-Q4™ Formulierungstechnologie

Vollständige Benetzung

Direkt nach Applikation

60 Sekunden nach Applikation

Schneller und umfassender Schutz des Blattapparates

i-Q4™ Formulierungstechnologie

Schnelle **Verteilung** auf der Blattoberfläche

i-Q4™ verstärkt die Mobilität von Inatreq™ active und Mischpartnern

i-Q4™ erzielt eine vollflächige Blattabdeckung

i-Q4™ ermöglicht den Einsatz von low-drift Düsen

Metconazol (EC)

Metconazol (EC) im iQ4-Formulierungssystem

Spritzbild bei Abdriftreduzierender Flachstrahldüse IDK 120-03 mit grobem bis mittlerem Tropfenspektrum

Rot – bedeckte Blattfläche, Blau – nicht bedeckte Blattfläche

i-Q4™ Formulierungstechnologie

Schnelle **Aufnahme** in die Wachsschicht

Inatreq™ active mit
Q4™ technology

i-

Regenfest in 30 Minuten

Auch unter Extrembedingungen
(30 Liter Regen in 1h) beweist
Inatreq active mit der i-Q4
Technologie die vorzügliche
Regenfestigkeit

Kontrolle %

Test mit Braunrost am Weizen (protective Applikation)

i-Q4™ Formulierungstechnologie

Schnelle **Verteilung** im Pflanzengewebe

i-Q4™
Technology

Inatreq active wird gleichmässig in die Wachsschicht eingelagert. Von dort diffundiert es in das Pflanzengewebe. Bereits im Pflanzengewebe vorhandene Pilzstrukturen werden zerstört (kurative Wirkung), oder die Pflanze wird vor Pilzangriffen geschützt (protektive Wirkung)

Inatreq active Einlagerung in Wachsschicht **Inatreq active Verteilung im Blattgewebe**

i-Q4™ Formulierungstechnologie

Schnelle **Verteilung** im Pflanzengewebe

Verteilung von Inatreq active messbar mit einem Bioassay (protektive Applikation)

Starke protektive Leistung mit kurativer und translaminarer Aktivität

Basipetale und akropetale Wirkstoffverteilung

i-Q4™ Formulierungstechnologie

Schnelle **Verteilung** im Pflanzengewebe

Krankheitskontrolle auch auf der Blattunterseite (abaxial) nachdem Inatreq active auf der Blattoberseite aufgetragen wurde

Translaminare Wirkstoffverteilung

i-Q4™ Formulierungstechnologie

Inatreq active wirkt
auch auf Pyknidien

Reduziert die Anzahl der Sporen
und deren Lebensfähigkeit

i-Q4™ Formulierungstechnologie

Reduktion des Infektionspotenzials von *Septoria tritici*

Reduktion des Infektionspotentials in % im Vergleich zur unbehandelten Kontrolle

- Weizensämlinge wurden mit *Septoria tritici* inokuliert
- Nach Erscheinen der Krankheit und Ausbildung von Pyknidien wurden Fungizidbehandlungen (Einzelwirkstoffe) durchgeführt
- In jeder Variante wurde die Anzahl der gebildeten Sporen bestimmt (6 Tage nach Applikation)
- **Inatreq active hat die Anzahl Sporen um 75 % verringert**

i-Q4™ Formulierungstechnologie

Reduktion des Infektionspotenzials von *Septoria tritici*

Inatreq active greift an mehreren Stellen in den Infektionszyklus ein und erhöht somit den Bekämpfungserfolg

Leistung im Feld

Produktprofil Univoq™

Wirkstoffe	50 g/l Fenpicoxamid + 100 g/l Prothioconazol (FRAC 21 bzw. 3)	
Formulierung	Emulsionskonzentrat (EC) mit i-Q4-Technologie. Regenfest in 30 min.	
Kultur	Weizen, Roggen, Triticale, Dinkel (weitere <i>Zulassung in Gerste und Hafer ist beantragt</i>)	
Wirkungsspektrum	<p>Weizen, Triticale, Dinkel:</p> <p>Echter Mehltau, Halmbruch, Septoria-Blattdürre (<i>Septoria tritici</i>), Braunrost, Gelbrost, DTR-Blattdürre, Fusarium-Arten (<i>Fusarium spp.</i>), Septoria nodorum, Schneeschimmel</p> <p>Roggen:</p> <p>Rhynchosporium-Blattflecken, Braunrost, Gelbrost, Fusariosen</p>	
Anwendungszeitraum	BBCH 30 - 69 im Frühjahr ab Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome gegen Fusarium: BBCH 59-69 , gegen Halmbruch: BBCH 30-32	
Aufwandmenge	2 l/ha	Weizen, Roggen, Triticale, Dinkel in 150 - 300 l/ha Wasser
Anzahl Anwendungen/Jahr	1	
Anwendungsbestimmungen	Gewässerabstand:	-/-/10/10 m
	Abtragsgefährdete Flächen:	-/-/10/10 m (+ bewachsener Grünstreifen)
Gebindegrösse	5 l

Septoria tritici - Kontrolle und Ertragseffekte 2021

Applikation BBCH 41-59, Bonitur F/F-1

Wirkungsgrad 28-36 Tage nach Applikation

Wirkungsgrad 38-42 Tage nach Applikation

Unbehandelte Kontrolle: 20%
n=40, Tukey-Test p=0.05

VM1: SDHI+Azol
alt @1.125 l/ha

VM2: SDHI+Azol
neu @1.125 l/ha

Unbehandelte Kontrolle: 61%
n=40, Tukey-Test p=0.05

Septoria tritici - Kontrolle und Ertragseffekte 2021

Applikation BBCH 41-59

VM1: SDHI+Azol
alt @1.125 l/ha

VM2: SDHI+Azol
neu @1.125 l/ha

Unbehandelte Kontrolle: 8.2 t/ha
n=32, Tukey-Test p=0.05

Gelbrost - Kontrolle und Ertragseffekte 2020/21

Applikation BBCH 33-49, Bonitur 21-29 Tage nach Applikation, F/F-1

Unbehandelte Kontrolle: 32%
n=64, Tukey-Test p=0.05

VM1: SDHI+Azol
alt @1.125 l/ha

VM2: SDHI+Azol
neu @1.125 l/ha

Unbehandelte Kontrolle: 8.06 t/ha
n=32, Tukey-Test p=0.05

Braunrost - Kontrolle und Ertragseffekte 2017-2019

Applikation BBCH 41-59, Bonitur 23-36 Tage nach Applikation , F/F-1

Unbehandelte Kontrolle: 20.5%
n=48, Tukey-Test p=0.05

VM1: SDHI+Azol
alt @1.125 l/ha

VM3: SDHI+Azol
alt @0.75 l/ha

Unbehandelte Kontrolle: 8.49 t/ha
n=24, Tukey-Test p=0.05

Kontrolle

Schneeschnimmel: Applikation BBCH 49 (14.06.), Aufnahme 08.07.2021

Kontrolle

Schneeschilder: Applikation BBCH 49 (14.06.), Aufnahme 08.07.2021

VM1

VM2

Univoq 1.5

Schneeschnitzel - Kontrolle und Ertragseffekte 2021

Applikation BBCH 41-59, Bonitur 43 Tage nach Applikation, F/F-1

Unbehandelte Kontrolle: 73%
n=16, Tukey-Test p=0.05

VM1: SDHI+Azol alt @1.125 l/ha | VM2: SDHI+Azol neu @1.125 l/ha

Unbehandelte Kontrolle: 6.5 t/ha
n=16, Tukey-Test p=0.05

Ertragsstärke von Univoq 2018-2020

Verschiedene Schadpathogene, unterschiedliche Befallsstärken

VM1: SDHI+Azol
@1.2 l/ha

VM3: SDHI+Azol
@0.8 l/ha

VM4: SDHI+Azol
@1.5 l/ha

Unbehandelte Kontrolle: 9.3 t/ha
n=128 Tukey-Test p=0.05

Univoq Pathogenspektrum Weizen

Wirkung

- 1 herausragend
- 2 sehr gut
- 3 gut
- 4 Nebenwirkung

Univoq Pathogenspektrum

Sichere protektive Wirkung und beeindruckende kurative Leistung gegen alle wichtigen Krankheitserreger im Weizen, Roggen, Triticale, Durum und Dinkel

Inatreq active

Der neue Wirkstoff gegen Krankheiten im Getreide

Natürliche
Herkunft

Neuer
Wirkmechanismus
Getreidefungizide

Innovatives
Resistenz-
management

Optimierte
Formulierung

Exzellente
Leistung