

WEINBAUSPRITZPLAN 2024

Mit aktiver Peronospora- und Oidium-Anti-Resistenz-Strategie gemäß FRAC-Richtlinien



Rebstadium	Zeitpunkt	Spritzdatum	Produkt	AWM/ha	Besondere Hinweise
	BBCH 05		NETZSCHWEFEL KWIZDA	7,5 kg/ha	Gegen Schadmilben und Phomopsis.
	BBCH 13 Stadium 13 – 15 3 bis 5-Blattstadium		WEINTEC (VERWIRRUNG) MULTIVO + SPIROX DUO + NETZSCHWEFEL KWIZDA	max. 400 Dispenser/ha 0,5 lt/ha 0,3lt/10.000 m ² z.B. 23 ml* + 2 kg/ha	Gegen Einbindigen und Bekreuzten Traubenwickler Gegen Phomopsis, Peronospora, Roten Brenner. Gegen Oidium, Zusatzw. Schwarzfäule* Max. 2 kg/ha. Gegen Oidium bei starkem Vorjahresbefall. Gegen Schadmilben und Phomopsis.
	Stadium 55 Triebe ca. 40 cm lang		REBOOT + FOSHIELD + TALENDO EXTRA + NETZSCHWEFEL KWIZDA	0,2 kg /ha + 2 lt /ha + 0,2 lt/ha + 3 kg/ha	Mit Reboot und Fosfield doppelt systemisch gegen Peronospora. Gegen Oidium, Schwarzfäule*. Gegen Schadmilben und Oidium. + 2 l AzoSpeed /ha: N-betont, MG und S in Trockenphasen.
	Stadium 57 – 60 Kurz vor der Blüte		ZORVEC VINABEL* + FOSHIELD + TALENDO EXTRA + NETZSCHWEFEL KWIZDA	0,38 lt/10.000 m ² (zB: 0,2 lt/ha)* + 3 lt/ha + 0,3 lt/ha + 2 kg/ha	Peronospora, Nebenwirkung Botrytis. Gegen Peronospora Oidium, Nebenwirkung Schwarzfäule. Gegen Spring- und Heuwurm: 80 ml Spintor /ha oder 0,2 - 0,4 l Mimic /ha
Rebblüte					
	Stadium 65		FLORGIB TABLETTEN	max. 16 Tabl./10.000 m ²	Zur Lockerung des Stielgerüstes und als Botrytisvorbeugung, in die Vollblüte
	Stadium 71 Abgehende Blüte - 1.Nachblüte		VIDERYO F + KUSABI (=KWIZDA WEIN PACK) + KARATHANE GOLD + FOSHIELD + NETZSCHWEFEL KWIZDA	2,5 lt + 0,3 lt/ha + 0,3 lt/ha + 3 lt/ha + 2 kg/ha	Doppelte Zusatzwirkung auf Botrytis Gegen Oidium Gegen Peronospora Blattdünger: + 3 l Wuxal Mg /ha gegen Mg-Mangel und Stiellähme; + 3 l Wuxal K40 /ha gegen Traubenwelke. + 2 kg Prestop /ha (+ 0,15 l Designer /ha) bei feuchter Witterung als Botrytisvorbeugung.
	Stadium 75 Schrottkorn- bis Erbsengröße		ZORVEC VINABEL* + NISSOVIN (=ZORVINO PACK) + KARATHANE GOLD + NETZSCHWEFEL KWIZDA	0,38 lt/10.000 m ² (zB: 0,3 lt /ha)* + 0,5 lt/ha + 0,3 lt/ha + 3 kg/ha	Peronospora, Nebenwirkung Botrytis, Oidium. Gegen Oidium Blattdünger: + 3 l Wuxal Mg /ha gegen Mg-Mangel und Stiellähme; + 3 l Wuxal K40 /ha gegen Traubenwelke.
	Stadium 77 Beginn - Traubenschließen		REBOOT + NISSOVIN + FOSHIELD + CUPROFOR FLOW + PRESTOP + DESIGNER	0,4 kg/ha + 0,5 lt/ha + 3 lt/ha 1 lt/ha + 2 kg/ha 0,15 lt/ha	Peronospora, Oidium, Nebenwirkung Botrytis Gegen Sauerwurm: 0,8 l Mimic /ha Gegen Sauerwurm und Ohrwurm: 120 – 160 ml Spintor /ha Blattdünger: + 3 l Wuxal Mg /ha gegen Mg-Mangel und Stiellähme; + 3 l Wuxal K40 /ha gegen Traubenwelke.
	Stadium 81 Reifebeginn		VIDERYO F + KUSABI (=KWIZDA WEIN PACK) + CUPROFOR FLOW	2,5 l + 0,3 lt/ha + 1 lt/ha	Doppelte Botrytis Zusatzwirkung. 160 ml Spintor /ha gegen Kirschesigfliege laut Insect-Watch Blattdünger: + 3 l Wuxal Mg /ha gegen Mg-Mangel und Stiellähme; + 3 l Wuxal K40 /ha gegen Traubenwelke.
	Stadium 85 Weichwerden der Beeren		KUPFER FUSILAN WG + KARMA SG	2,5 kg/ha + 0,8 %	Kupfer Fusilan WG verbessert die Holzreife und die Reintönigkeit der Weine. TZ: 0,5 %; 2 kg in max. 250 l Wasser
	Stadium 89 Vollreife der Beeren		KARMA SG + REBOOT	0,8 % + 0,4 kg	TZ: 0,5 %; 2 kg/ha in max. 250 l Wasser Bei anhaltend starkem Peronosporadruck zur Verringerung von Blattbefall und des Sporenausgangsmaterials im Folgejahr.

Pfl.Reg.Nr.: Netzschwefel Kwizda: 1941, Kupfer Fusilan WG: 3621, Multivo 4425/901, Talendo Extra: 3342, Karathane Gold 2981, Kusabi: 3825, NissoVin: 3157-901, Prestop: 3680, Cuprofor flow: 3034-901, Reboot: 3640, Zorvec Vinabel: 4369, Videryo F: 3783, Karma SG 3398, Spirox Duo: 3863-901, Florgib Tabletten: 3789, Spintor 3296, Mimic 2620, Weintec 4270, Fosfield 4346.

* Zorvec Vinabel und Spirox Duo* - Berechnung siehe Seite 5

* Beispiel letzte Vorblüte: 2,8m Reihenabstand; 80cm Laubwandhöhe = 5700m² = 0,21 lt Zorvec Vinabel/ha, bzw. 1,1m in der Nachblüte, 7900m²=0,3l/ha

Zur Beachtung: Überprüfen Sie den pH Wert Ihres Wassers und setzen Sie im Bedarfsfall pH Opti ein, Aufwand/ha je nach Reihenabstand, Laubwandhöhe und Infektionsdruck. Spritzabstände (10 – 12 Tage), beidseitige gründliche Benetzung, Spritzdruck (max. 18 bar), Temperatur (nicht bei Hitze über 25 °C) und die Fahrgeschwindigkeit (5 – 6 km/h) beachten. 0,15 l **Designer**/ha bei Traubenwaschungen zusetzen.

Reihenfolge der Mischpartner: Zuerst Folienbeutel (Rührwerk erst nach Auflösen des Folienbeutels einschalten), dann WG- (wasserdispers. Granulat), SC- (Suspensionskonzentrat) und zum Schluss EC-Produkte (Emulsionskonzentrat) bzw. flüssige Blattdünger in den Spritztank geben.

Kwizda
Agro