

Difend® Extra

Pfl. Reg. Nr. 3793
Gefahrensymbol GHS09

Versandgebinde/Handelsform:
60 l Fass
200 l Kanister
1.000 l Leihcontainer

Fungizide Universalbeize gegen die wichtigsten Krankheiten in allen Getreidesorten mit einzigartiger Formulierung und Verarbeitbarkeit

Abgabe Sachkundenachweis
Suspensionskonzentrat

Registrierungsbereich

1. Indikation:

In Weizen gegen Zwergsteinbrand, Fusarium, Steinbrand mit 200 ml/100 kg Saatgut vor der Saat max. 1x beizen.

2. Indikation:

In Roggen gegen Zwergsteinbrand, Fusarium, Steinbrand mit 200 ml/100 kg Saatgut vor der Saat max. 1x beizen.

3. Indikation:

In Triticale gegen Zwergsteinbrand, Fusarium, Steinbrand mit 200 ml/100 kg Saatgut vor der Saat max. 1x beizen.

4. Indikation:

In Gerste gegen Fusarium mit 200 ml/100 kg Saatgut vor der Saat max. 1x beizen.

5. Indikation:

In Hafer gegen Fusarium mit 200 ml/100 kg Saatgut vor der Saat max. 1x beizen.

6. Indikation:

In Weizen gegen Spelzenbräune, Schneeschimmel mit 200 ml/100 kg Saatgut vor der Saat max. 1x beizen.

7. Indikation:

In Roggen gegen Schneeschimmel mit 200 ml/100 kg Saatgut vor der Saat max. 1x beizen.

8. Indikation:

In Triticale gegen Spelzenbräune, Schneeschimmel mit 200 ml/100 kg Saatgut vor der Saat max. 1x beizen.

9. Indikation:

In Gerste gegen Streifenkrankheit, Schneeschimmel mit 200 ml/100 kg Saatgut vor der Saat max. 1x beizen.

10. Indikation:

In Hafer gegen Streifenkrankheit, Septoria-Saatgutverseuchung mit 200 ml/100 kg Saatgut vor der Saat max. 1x beizen.

Eigenschaften und Wirkungsweise

Difend Extra enthält zwei Wirkstoffe aus den Gruppen der Pyrol- und Triazolderivate, die gegen samen- und bodenbürtige pilzliche Krankheitserreger wirken. Die volle Wirkung der Beize entfaltet sich während des Keimvorganges des Getreides im Boden und schützt die junge Saat. Die Formulierung als Suspensionskonzentrat ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung auf dem Saatgut und weist sehr gute Haft Eigenschaften an der Kornoberfläche auf.

Wirkmechanismus

Difenoconazol (FRAC-Code): 3; Fludioxonil (FRAC-Code): 12

Anwendungshinweise

Maximal 1 Anwendung. Beizen vor der Saat. Die Beizung des Saatguts mit Difend Extra sollte ausschließlich in einem geeigneten Beizgerät erfolgen. Dabei sollte das Gerät vor der Anwendung entsprechend den Herstellerangaben kalibriert werden. Auf eine gleichmäßige Benetzung des Saatgutes ist zu achten.

Optimale Wassermenge

Zur noch besseren Farbgebung und Mittelverteilung am Korn kann Difend Extra bei Bedarf auch mit Wasser verdünnt werden. Zur besseren Farbgebung und Mittelverteilung am Korn wird die Saatgutbeizung mit Verdünnungen von 1:1 empfohlen.

200 ml Difend Extra + 200 ml Wasser/100 kg Saatgut

Zur weiteren Optimierung des Beizbildes z.B. bei Gerste oder Roggen kann die Wassermenge zusätzlich erhöht werden. Verdünntes Beizmittel sollte unmittelbar nach dem Ansetzen verbraucht bzw. nach Beizpausen wieder aufgerührt werden.

Lagerung

Getrennt von Lebens- und Futtermitteln sowie unzugänglich für Kinder und nur in der Difend Extra verschlossenen Originalverpackung aufbewahren. Trocken aufbewahren und Produkt nicht unter 0 °C und nicht über 30 °C lagern. Leere Verpackungen nicht weiterverwenden.

Reinigung

Difend Extra darf nicht mit Produkten gemischt werden, die Lösungsmittel enthalten.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Säcke und Sackteile fachgerecht entsorgen. Behandeltes Saatgut nicht als Lebens- oder Futtermittel verwenden. Verschüttetes Saatgut sofort zusammenkehren und entfernen. Eine Nachbeizung des behandelten Saatgutes ist nicht zulässig. Der maximale Mittelaufwand darf 440 ml/ha nicht überschreiten (entspricht maximal 220 kg Saatgut pro ha).

Erste Hilfe Maßnahmen

Nach Einatmen: Patient an die frische Luft bringen, warm halten, ausruhen lassen. Unverzüglich ärztlichen Rat einholen. **Nach Hautkontakt:** Verunreinigte Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut sofort mit Wasser, anschließend mit Wasser und Seife waschen. Wenn Symptome auftreten, Arzt aufsuchen. **Nach Augenkontakt:** Sofort mindestens 15 Minuten bei gespreizten Lidern mit viel sauberem Wasser gründlich ausspülen. Unverzüglich Arzt aufsuchen. **Nach Verschlucken:** Kein Erbrechen auslösen. Wiederholt Medizinkohle mit viel Wasser eingeben. Keinesfalls einen Bewusstlosen etwas durch den Mund eingeben.

Unverzüglich Arzt aufsuchen. Verpackung bzw. Etikett und, wenn möglich, Gebrauchsanweisung vorzeigen. **Hinweise für den Arzt:** Ein spezifisches Antidot ist nicht bekannt. Symptomatische Therapie anwenden.

Hinweise zur Umweltgefährdung und umweltrelevante Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise auf besondere Gefahren und Sicherheitsratschläge zum Schutz der Gesundheit:

Wirkstoff	Difenoconazol 25 g/l (2,4 %) Fludioxonil 25 g/l (2,4 %)	Produkttyp	Fungizid Wasserlösliches Konzentrat
Vorsicht, Pflanzenschutzmittel!			
Achtung. Giftig für Regenwürmer			
Gefahrenhinweise (H-Sätze)	410		
<i>Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt ist die Gebrauchsanweisung einzuhalten. Die folgenden Sicherheitshinweise sind zu beachten.</i>			
Sicherheitshinweise (P-Sätze)	101, 102, 264, 270, 391, 501		
Weitere Sicherheitshinweise	SP1, SPe5, SPe6		
Ergänzende Gefahrenmerkmale	EUH208, EUH401		
Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren. Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Originalverpackungen oder entleerte Behälter nicht zu anderen Zwecken verwenden. Eine nicht bestimmungsgemäße Freisetzung in die Umwelt vermeiden.			
Sonstige Auflagen und Hinweise: Eine Nachbeizung des behandelten Saatgutes ist nicht zulässig. Verschüttetes Saatgut sofort zusammenkehren und entfernen. Behandeltes Saatgut nicht als Lebens- oder Futtermittel verwenden. Säcke und Sackteile sachgerecht entfernen.			
Zulassungsinhaber und für die Endkennzeichnung Verantwortlicher			
Globachem nv, Brustem Industriepark, Lichtberglaan 2019, B-3800 Sint Truiden			
Vertrieb bzw. Verantwortlicher Inverkehrbringer			
Kwizda Agro GmbH, Universitätsring 6, 1010 Wien, Tel. 059977-40			