

**Express® SX + Pixxaro® EC**

<b>Pfl. Reg. Nr.</b>	2914	2879
<b>Gefahrensymbol</b>	GHS07	GHS07
	GHS09	GHS09

**Versandgebinde/Handelsform:**

1 Kombipack á 100 g Express SX und  
1 l Pixxaro EC für 4 ha Wintergetreide

**Der noch breiter wirksame und  
hochverträgliche Kombipack gegen  
breitblättrige Unkräuter im Getreide**

**Abgabe** Sachkundenachweis  
**Wasserlösliches  
Granulat/Emulsionskonzentrat**

**Registrierungsbereich**

Siehe Einzelprodukte.

**Eigenschaften und Wirkungsweise**

Die Produkte im Kombipack ergänzen einander perfekt in der Wirkung. Pixxaro EC ist breiter wirksam als Starane XL, Express SX übernimmt die Distelwirkung sowie die Sicherheit auf Kamille, Kreuzblütler und Ehrenpreis. Beide sind unabhängig von der Temperatur von früh bis spät einsetzbar und dabei sehr verträglich. Sollten auf der Fläche auch Schadgräser auftreten, ist auch die Mischbarkeit mit allen relevanten Gräsermitteln gegeben.

**Die besonderen Vorteile:**

- Der stärkere und günstigere Nachfolger von „Express SX + Starane XL“
- Noch breiter und sicherer wirksam auf Unkräuter in Winter- und Sommergetreide (außer Hafer)
- Stärkste Wirkung gegen Klettenlabkraut jeder Größe
- Eingebautes Resistenzmanagement durch den neuen Wirkstoff Arylex
- Hervorragende Verträglichkeit, daher auch Spätanwendungen und Korrekturspritzungen bis BBCH 37 möglich
- Gute Mischbarkeit mit Gräsermitteln, Fungiziden und Wachstumsreglern

**Wirkungsweise:**

Express SX und Pixxaro EC werden überwiegend über die Blätter aufgenommen und sehr schnell in der Pflanze verteilt. Der Wachstumsstopp der Unkräuter setzt praktisch unmittelbar nach der Anwendung ein.

**Wirkungsspektrum****Sehr gut wirksam:**

Ackerdistel, Ackerfrauenmantel (Gem.), Ackergauchheil, Ackerlichtnelke, Ackerminze, Ackersenf/Hederich, Ackerspörgel, Ackerwinde, Ackerziest, Amarant (Fuchsschwanz), Ampfer, Ausfallerbsen, Ausfallraps, Ausfallsonnenblume, Besenrauke (Gem.), Brennessel (Kleine), Franzosenkraut, Hahnenfuß (Acker-), Hirtentäschel, Hellerkraut (Acker-), Hohlzahn, Kamille, Klatschmohn, Klettenlabkraut, Knöterich (Ampfer), Knöterich (Floh-), Knöterich (Vogel-), Knöterich (Winden-), Kornblume, Kreuzkraut (Gemeines), Löwenzahn, Pfeilkresse, Rainkohl, Saatwucherblume, Steinsame (Acker-), Melde (Gemeine), Gänsefuß (Weißer), Storchschnabel, Taubnessel, Vergissmeinnicht, Vogelmiere, Wickearten.

**Gut wirksam:**

Melde (Gemeine), Gänsefuß (Weißer), Ehrenpreis (Pers.), Erdrauch, Gänsedistel, Stiefmütterchen.

**Schwach wirksam:**

Ackerschachtelhalm, Ehrenpreis (Efeublättriger).

### **Aufwandmenge(n)**

In Winterweizen, Wintergerste, Winterroggen, Triticale, Sommergerste (ausgenommen Hafer):

**25 g Express SX + 0,25 l Pixxaro EC/ha**

optimale Anwendung bei wüchsigen Bedingungen und Unkräutern im Keim- bis 4-Blatt-Stadium.

### **Anwendung**

#### **Anwendungsbereich:**

Winter- und Sommergetreide ausgenommen Hafer

#### **Anwendungszeitpunkt:**

Im Frühjahr ab Vegetationsbeginn bzw. ab dem 3-Blattstadium bei Temp. über 2° C bis Ende der Bestockung. Frühe Anwendung (Unkräuter müssen aufgelaufen sein) und wüchsige Bedingungen sind generell zu bevorzugen. Dadurch wird die Wirksamkeit noch breiter und die Wirkungssicherheit höher. Vorrübergehend kühle und feuchte Bedingungen oder leichte Nachfröste beeinträchtigen die Wirkung von Express SX und Pixxaro EC nicht.

#### **Verträglichkeit:**

Die Tankmischung Express SX + Pixxaro EC ist ausgezeichnet kulturverträglich. Pixxaro EC ist in Wintergetreidearten (ausgenommen Hafer) auch zur Spätkorrektur (bis BBCH 45 = Blattscheide des Fahnenblattes geschwollen) gegen Klettenlabkraut zugelassen. Express SX ist in allen Wintergetreidearten zur späten Distelbekämpfung (bis EC 37 = Erscheinen des Fahnenblattes) zugelassen.

#### **Streulagen:**

Express SX und Pixxaro EC sind wuchsstofffreie Getreideherbizide und für Streulagen geeignet.

Eine direkte Abdrift auf empfindliche Kulturen wie z.B. Rüben, Mais, Reben, Körnerleguminosen, Sonnenblume, Gemüse, bzw. auf Flächen, die für deren Anbau vorgesehen sind, ist jedoch zu vermeiden.

#### **Einsaaten:**

Getreidebestände mit Untersaaten dürfen mit dieser Tankmischung nicht behandelt werden.

#### **Empfehlungen und empfohlene Wasseraufwandmenge**

Die Tankmischung Express SX + Pixxaro EC kann mit praxisüblichen Wasseraufwandmengen ausgebracht werden. 150 l/ha sollten nicht unterschritten werden. Bei dichten, stärker verunkrauteten Getreidebeständen oder späterer Anwendung 300 - 400 l Wasser/ha einsetzen.

#### **Mischbarkeit**

Die Tankmischung Express SX + Pixxaro EC ist mit CCC-Produkten, Wuxal Blattdüngern und Azo-Speed sowie mit den Getreidefungiziden Vegas, Input Xpro, Variano Xpro, Pronto Plus und Prosaro mischbar. Für von uns nicht ausdrücklich empfohlene Mischungen mit anderen Produkten übernehmen wir keinerlei Haftung, da wir nicht sämtliche in Betracht kommenden Mischungen prüfen können.

#### **Nachbau**

Die entsprechenden Hinweise auf den Einzelpackungen von Express SX bzw. Pixxaro EC in dieser Kombipackung sind zu beachten.

**Herstellen der Spritzbrühe**

Tank etwa zur Hälfte mit Wasser füllen, zuerst Express SX und anschließend Pixxaro EC bei laufendem Rührwerk zusetzen, eventuell weitere Mischpartner zusetzen und bei gutem Umrühren mit der restlichen Wassermenge auffüllen. Nie mehr Spritzbrühe ansetzen als notwendig. Pflanzenschutzmittelbehälter restlos entleeren, mit Wasser ausspülen, Spülwasser der Spritzbrühe begeben!

**Reinigung der Spritzgeräte**

Sofort nach Beendigung der Spritzarbeit reinigen. Vor allem vor Einsatz in empfindlichen Kulturen mit Reinigungsmittel Spritzgerätereiniger (25 %ige Ammoniaklösung) 0,2 l /100 l Wasser gründlich reinigen.

Express SX und Pixxaro EC Gebrauchsanweisung (Einzelpackung) beachten.

**Hinweise zur Umweltgefährdung und umweltrelevante Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise auf besondere Gefahren und Sicherheitsratschläge zum Schutz der Gesundheit:**

**Produkttyp** Herbizid

**Wirkstoff Express SX:** Tribenuron Methyl 500 g/kg (50 %) Wasserlösliches Granulat

**Wirkstoff Pixxaro EC:** Halauxifen-methyl 12,5 g/l (1,21 %)

Fluroxypyr 280 g/l (27,03 %)

Cloquinacet (Safener) 7,9 g/l (0,76 %) Emulsionskonzentrat

**Vorsicht, Pflanzenschutzmittel!**

**Gewässerabstand (Regelabstand/50/75/90/95 %):** 10/5/5/1 m

**Zulassungsinhaber und für die Endkennzeichnung Verantwortlicher sowie weitere Vorsichtsmaßnahmen siehe Einzelpackungen.**

**Vertrieb bzw. Verantwortlicher Inverkehrbringer**

Kwizda Agro GmbH, Universitätsring 6, 1010 Wien, Tel. 059977-10