

Das Beste  
aus Bio und  
Konventionell

2026

BIO SPRITZPLAN MIT  
KONVENTIONELLER SICHERHEIT

| Rebstadium                                                                            | Zeitpunkt                                                                     | Krankheit/Schädling                                                                                                                            | Produkt                                                                                                                   | AWM/ha                                                                                                     | Netzmittel                   | Besondere Hinweise                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | <b>Stadium 3</b><br>(Austriebsspritzung)<br>Anf./Mitte April                  | Oidium, Milben, Phomopsis                                                                                                                      | <b>NETZSCHWEFEL KWIZDA</b>                                                                                                | 7,5 kg                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                         |
|    | <b>Stadium 13</b><br>Triebe 10 – 15 cm lang<br>Ende April                     | Oidium, Milben, Phomopsis<br>Oidium<br>Peronospora, Roter Brenner<br>Rhombenspanner                                                            | <b>NETZSCHWEFEL KWIZDA</b><br><b>LIMOCIDE</b><br><b>CUPROFOR FLOW</b><br><b>SPINTOR</b>                                   | 0,5 % (1 kg)<br>0,4% (0,8 l)<br>0,2 l<br>40 ml                                                             | + 0,33 l<br><b>Nu-Film-P</b> | + Schaumstop 5 ml/100 l<br>nicht auf nasses Laub applizieren<br>+ 2 l Wuxal Ascofol SiCure<br>Ausbringung Weintec                                                       |
|    | <b>Stadium 53 – 55</b><br>Triebe 30 – 40 cm lang<br>Mitte Mai                 | Oidium, Milben, Phomopsis<br>Oidium<br>Peronospora<br><br>Peronospora, Schwarzfäule,<br>Roter Brenner<br>Traubenwickler (Spring-/Heu-<br>wurm) | <b>NETZSCHWEFEL KWIZDA</b><br><br><b>LIMOCIDE</b><br><b>UPSIDE</b><br><br><b>CUPROFOR FLOW</b><br><br><b>LEPINOX PLUS</b> | 0,5 % (1 kg)<br><br>0,4% (0,8 l)<br>2,5l/10.000 m²<br>Laubwandfläche<br>(ca. 0,8 l)<br>0,4 l<br><br>0,6 kg | + 0,1 %<br><b>Nu-Film-P</b>  | + Schaumstop 5 ml/100 l<br><br>nicht auf nasses Laub applizieren<br><br>+ 2 l Wuxal Ascofol SiCure<br>+ 3 kg Radam extra<br><br>oder 80 ml Spintor                      |
|    | <b>Stadium 57 – 60</b><br>Blühbeginn<br>Ende Mai                              | Oidium, Milben, Zikaden<br>Oidium<br><br>Peronospora<br><br>Peronospora, Schwarzfäule,<br>Roter Brenner                                        | <b>NETZSCHWEFEL KWIZDA</b><br><b>KARATHANE GOLD</b><br>+ <b>KUSABI</b><br><b>UPSIDE</b><br><br><b>ANTEVA</b>              | 0,5 % (1 kg)<br>0,3 l<br>+ 0,15 l<br>2,5l/10.000 m²<br>Laubwandfläche<br>(ca. 1 l)<br>1,2 kg               | + 0,1 %<br><b>Nu-Film-P</b>  | + Schaumstop 5 ml/100 l<br>nicht auf nasses Laub applizieren<br><br>+ 3 kg Radam extra<br>+ 0,5 % Kwizda PanAgro                                                        |
|  | <b>Stadium 63 - 65</b><br>Rebblüte                                            | Oidium<br>Oidium<br>Peronospora<br><br>Peronospora, Schwarzfäule<br>Roter Brenner                                                              | <b>NETZSCHWEFEL KWIZDA</b><br><b>LIMOCIDE</b><br><b>UPSIDE</b><br><br><b>CUPROFOR FLOW</b>                                | 0,5 % (1 kg)<br>0,4 % (1 l)<br>2,5l/10.000 m²<br>Laubwandfläche<br>(ca. 1,5 l)<br>1 l                      |                              | + Schaumstop 5 ml/100 l<br>Keine Blattdünger während der<br>Blüte!                                                                                                      |
|  | <b>Stadium 67 – 71</b><br>Abgehende Blüte<br>Mitte Juni                       | Oidium, Milben<br>Oidium<br>Peronospora, Oidium, Doppel-<br>te Zusatzwirkung auf Botrytis                                                      | <b>NETZSCHWEFEL KWIZDA</b><br><b>KARATHANE GOLD</b><br><b>CURIFOL TRIPLE**</b><br>+ <b>KUSABI</b>                         | 0,5% (1 kg)<br>0,3 l<br>3 kg/10.000 m²<br>+ 0,3 l                                                          |                              | + Schaumstop 5 ml/100 l<br>+ 2 l Wuxal Ascofol SiCure<br>(verstärkt die Wirkung von<br>Pflanzenschutzmitteln und puffert<br>Verbrennungen ab)<br>+ 0,5 % Kwizda PanAgro |
|  | <b>Stadium 73 – 75</b><br>Beeren: Schrotkorn-<br>bis Erbsengröße<br>Ende Juni | Oidium, Milben<br>Oidium<br>Peronospora, Oidium, Doppel-<br>te Zusatzwirkung auf Botrytis                                                      | <b>NETZSCHWEFEL KWIZDA</b><br><b>KARMA SG</b><br><b>CURIFOL TRIPLE**</b><br>+ <b>KUSABI</b>                               | 1 % (3 -5 kg)<br>0,5 % (2-3 kg)<br>3 kg/10.000 m²<br>+ 0,3 l                                               |                              | + Schaumstop 5 ml/100 l<br>+ 2 l Wuxal Ascofol SiCure<br>+ 0,5 % Kwizda PanAgro                                                                                         |
|  | <b>Stadium 77 – 79</b><br>Traubenschließen<br>Juli                            | Oidium<br>Peronospora, Schwarzfäule<br>Botrytis<br><br>Traubenwickler (Sauerwurm)                                                              | <b>NETZSCHWEFEL KWIZDA</b><br><b>CUPROFOR FLOW</b><br><b>PRESTOP * oder MEVALONE</b><br><br><b>LEPINOX PLUS *</b>         | 1 % (4 - 6 kg)<br>1 l<br>2 kg oder 3 l/<br>10.000m²<br>1 kg                                                | 0,15 %<br><b>Nu-Film-P</b>   | + Schaumstop 5 ml/100 l<br>+ 0,5 % Kwizda PanAgro<br>+ 2 l Wuxal Ascofol SiCure<br><br>oder 120 - 160 ml Spintor                                                        |
|  | <b>Stadium 81</b><br>Reifebeginn<br>Ende Juli                                 | Oidium<br>Kirschessigfliege<br>Peronospora                                                                                                     | <b>NETZSCHWEFEL KWIZDA</b><br><b>SPINTOR</b><br><b>CUPROFOR FLOW</b>                                                      | 1 % (3 - 5 kg)<br>160 ml<br>1 l                                                                            | 0,1 %<br><b>Nu-Film-P</b>    | + Schaumstop 5 ml/100 l<br>Cuprofor flow härtet die Beerenhaut<br>ab und schützt die jungen Blätter<br>vor Peronospora. Die jungen Blätter<br>bilden Zucker.            |
|  | <b>Stadium 85</b><br>Weichwerden der<br>Beeren<br>August                      | Oidium                                                                                                                                         | <b>KARMA SG</b>                                                                                                           | 0,5 % (2-3 kg)                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                         |

Konventionelle Fungizide

\* Optimal ist eine getrennte Ausbringung in die Traubenzone

\*\* z.B. bei 1,2 m Laubwandhöhe und 2,8 m Reihenabstand = 2,6 kg Curifol Triple/ha

# JE NACH INFEKTIONSDRUCK OPTIONAL ENTSCHEIDEN: BIO ← → KONVENTIONELL

| Rebstadium                                                                                                                                                               | Zeitpunkt                                                                            | Krankheit/Schädling                                                                                                                                       | Produkt                                                                                                                   | AWM/ha                                                                                                                                                      | Netzmittel                          | Besondere Hinweise                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          | <b>Stadium 3</b><br>(Austriebsspritzung)<br>Anf./Mitte April                         | Oidium, Milben, Phomopsis                                                                                                                                 | <b>NETZSCHWEFEL KWIZDA</b>                                                                                                | <b>7,5 kg</b>                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                          | <b>Stadium 13</b><br>Triebe<br>10 – 15 cm lang<br>Ende April                         | Oidium, Milben, Phomopsis<br>Oidium<br>Peronospora, Roter Brenner<br><i>Rhombenspanner</i><br>Peronospora                                                 | <b>NETZSCHWEFEL KWIZDA</b><br><b>LIMOCIDE</b><br><b>CUPROFOR FLOW</b><br><b>SPINTOR</b><br><b>UPSIDE</b>                  | <b>0,5 % (1 kg)</b><br><b>0,4 % (0,8 l)</b><br><b>0,2 l</b><br><b>40 ml</b><br><br><b>2,5l/10.000 m²</b><br><b>Laubwandfläche</b><br><b>(ca. 0,8 l)</b>     | <b>+ 0,33 l</b><br><b>Nu-Film-P</b> | + Schaumstop 5 ml/100 l<br>nicht auf nasses Laub applizieren<br><b>2 l/ha Wuxal Ascofol SiCure</b><br><b>+ 0,5 % Kwizda PanAgro</b><br><i>Ausbringung Weintec</i>                                     |
|                                                                                          | <b>Stadium 53 – 55</b><br>Triebe<br>30 – 40 cm lang<br>Mitte Mai                     | Oidium, Milben,<br>Phomopsis, Zikaden<br>Oidium<br>Peronospora<br><br>Peronospora, Schwarzfäule, Roter Brenner<br><i>Traubenwickler (Spring-/Heuwurm)</i> | <b>NETZSCHWEFEL KWIZDA</b><br><br><b>LIMOCIDE</b><br><b>UPSIDE</b><br><br><b>CUPROFOR FLOW</b><br><br><b>LEPINOX PLUS</b> | <b>0,5 % (1 kg)</b><br><br><b>0,4 % (ca. 1l)</b><br><b>2,5l/10.000 m²</b><br><b>Laubwandfläche</b><br><b>(ca. 1 l)</b><br><b>0,4 l</b><br><br><b>0,6 kg</b> | <b>+ 0,1 %</b><br><b>Nu-Film-P</b>  | + Schaumstop 5 ml/100 l<br><br>nicht auf nasses Laub applizieren<br><br><b>2 l/ha Wuxal Ascofol SiCure</b><br><b>+ 3 kg Radam extra</b><br><b>+ 0,5 % Kwizda PanAgro</b><br><b>oder 80 ml Spintor</b> |
|                                                                                          | <b>Stadium 57 – 61</b><br>Ende Mai                                                   | Oidium, Milben<br>Oidium<br>Peronospora<br><br>Peronospora, Schwarzfäule, Roter Brenner                                                                   | <b>NETZSCHWEFEL KWIZDA</b><br><b>LIMOCIDE</b><br><b>UPSIDE</b><br><br><b>CUPROFOR FLOW</b>                                | <b>0,5 % (1 kg)</b><br><b>0,4 % ( ca. 1l)</b><br><b>2,5l/10.000 m²</b><br><b>Laubwandfläche</b><br><b>(ca. 1 l)</b><br><br><b>1 l</b>                       | <b>+ 0,1 %</b><br><b>Nu-Film-P</b>  | + Schaumstop 5 ml/100 l<br>nicht auf nasses Laub applizieren<br><br><b>+ 3 kg Radam extra</b><br><b>+ 0,5 % Kwizda PanAgro</b>                                                                        |
|                                                                                        | <b>Stadium 63 - 65</b><br>Rebblüte                                                   | Oidium<br>Oidium<br>Peronospora, Schwarzfäule<br>Roter Brenner                                                                                            | <b>NETZSCHWEFEL KWIZDA</b><br><b>KARMA SG</b><br><b>CUPROFOR FLOW</b>                                                     | <b>0,5 % (1 kg)</b><br><b>0,5 % (2-3 kg)</b><br><br><b>1 l</b>                                                                                              |                                     | + Schaumstop 5 ml/100 l<br><br><i>Keine Blattdünger während der Blüte!</i>                                                                                                                            |
|                                                                                        | <b>Stadium 67 – 71</b><br>Abgehende Blüte<br>Mitte Juni                              | Oidium<br>Peronospora, Schwarzfäule<br>Oidium<br>Botrytis                                                                                                 | <b>KARMA SG</b><br><b>CUPROFOR FLOW</b><br><b>LIMOCIDE</b><br><b>MEVALONE</b>                                             | <b>0,5 % (2-3 kg)</b><br><br><b>1 l</b><br><br><b>0,4 % ( ca. 1l)</b><br><br><b>3l /10.000m²</b>                                                            |                                     | + Schaumstop 5 ml/100 l<br><b>+ 0,5 % Kwizda PanAgro</b>                                                                                                                                              |
|                                                                                        | <b>Stadium 73 – 75</b><br>Beeren: Schrot-<br>korn- bis Erbsen-<br>größe<br>Ende Juni | Oidium, Milben<br>Oidium<br>Peronospora, Schwarzfäule                                                                                                     | <b>NETZSCHWEFEL KWIZDA</b><br><b>KARMA SG</b><br><b>CUPROFOR FLOW</b>                                                     | <b>1 % (3 -5 kg)</b><br><b>0,5 % (2-3 kg)</b><br><br><b>1 l</b>                                                                                             |                                     | + Schaumstop 5 ml/100 l<br><b>+ 2 l/ha Wuxal Ascofol SiCure</b><br>(verstärkt die Wirkung von Pflanzenschutzmitteln und puffert Verbrennungen ab)<br><b>+ 0,5 % Kwizda PanAgro</b>                    |
| <br> | <b>Stadium 77 – 79</b><br>Traubenschließen<br>Juli                                   | Oidium<br>Peronospora, Schwarzfäule<br><i>Traubenwickler (Sauerwurm)</i><br>Botrytis                                                                      | <b>NETZSCHWEFEL KWIZDA</b><br><b>CUPROFOR FLOW</b><br><b>LEPINOX PLUS *</b><br><b>MEVALONE</b>                            | <b>1 % (4 - 6 kg)</b><br><br><b>1 l</b><br><br><b>1 kg</b><br><br><b>3 l/10.000 m²</b>                                                                      | <b>0,15 %</b><br><b>Nu-Film-P</b>   | + Schaumstop 5 ml/100 l<br><b>+ 0,5 % Kwizda PanAgro</b><br><b>oder 120 - 160 ml Spintor</b>                                                                                                          |
|                                                                                        | <b>Stadium 81</b><br>Reifebeginn<br>Ende Juli                                        | Oidium<br><i>Kirschessigfliege</i><br>Botrytis                                                                                                            | <b>NETZSCHWEFEL KWIZDA</b><br><b>SPINTOR</b><br><b>MEVALONE</b>                                                           | <b>1 % (3 - 5 kg)</b><br><br><b>160 ml</b><br><br><b>3 l/10.000m²</b>                                                                                       | <b>0,1 %</b><br><b>Nu-Film-P</b>    | + Schaumstop 5 ml/100 l<br>Cuprofor flow härtet die Beerenhaut ab                                                                                                                                     |
|                                                                                        | <b>Stadium 85</b><br>Weichwerden der Beeren<br>August                                | Oidium<br>Botrytis                                                                                                                                        | <b>KARMA SG</b><br><b>MEVALONE</b>                                                                                        | <b>0,5 % (2-3 kg)</b><br><b>3 l/10.000 m²</b>                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                       |

\* Optimal ist eine getrennte Ausbringung in die Traubenzone

Der Bio-Weinbaupflegeplan ist eine Orientierung und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Intervalle und die Auswahl der Pflanzenschutzmaßnahmen sind an die lokalen Infektionsbedingungen anzupassen. Mischbarkelten einzelner Produkte beachten! In der Blüte Intervalle auf max. 7 Tage verkürzen.  
**Lepinox Plus nicht mit Wasserglas und Karma SG mischen. Karma SG verringert in Kombination mit Spintor dessen Wirkung.**  
**Limocide nicht mit Karma SG und Prestop verwenden.**  
**SICHTBARES OIDIUM** : 1. Behandlung: 0,4 % Limocide + 0,2 % Cuprofor Flow + 2 l Wuxal Ascofol SiCure; 2. Behandlung: 0,5 % Karma + 0,5 % Netzschwefel Kwizda + 0,2 % Cuprofor Flow + 0,5 % Kwizda Panagro. Die 2 Behandlungen innerhalb von 3 Tagen mit 300 - 400 l Wasser durchführen.

| Rebstadium                                                                            | Zeitpunkt                        | Spritzdatum | Produkte fett: <b>empfohlene Maßnahme</b><br>Produkte nicht fett: <b>ev. notwendige Maßnahme</b>                                                                                     | AWM/ha                                                                                                                                                       | Besondere Hinweise                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                  |             | Spintor oder Mimic<br><b>Netzschwefel Kwizda</b>                                                                                                                                     | 40ml/ha<br>0,3l/ha<br><b>7,5 kg/ha</b>                                                                                                                       | Bei Bedarf bei verstärktem Auftreten von Rhombenspanner oder Springwurm<br>Gegen Schadmilben und Phomopsis                                                                                                                                                                                  |
|    | 3 bis 5-Blattstadium             |             | <b>Weintec (Verwirrung)</b><br><br><b>Anteva</b><br><b>+ Spirox Duo</b><br><br><b>+ Netzschwefel Kwizda</b><br>+ Samba K (Notfallzulassung beantragt)                                | <b>max. 300-350 Dispenser/ha</b><br><br><b>0,4 kg/ha</b><br><b>0,3l/10.000 m²</b><br><b>z.B. 33 ml*</b><br><b>+ 2 kg/ha</b><br>0,5 l/ha                      | Gegen Einbindigen und Bekreuzten Traubenwickler<br>Gegen Phomopsis, Peronospora, Roten Brenner.<br>Gegen Oidium, Zusatzwirkung Schwarzfäule<br>Gegen Schadmilben und Phomopsis<br>Gegen Schadmilben                                                                                         |
|    | ca. 40 cm                        |             | <b>Foshield</b><br><b>+ Anteva</b><br><b>+ Nissovin</b><br><b>+ Netzschwefel Kwizda</b><br>+ AzoSpeed                                                                                | <b>+ 2 l/ha</b><br><b>0,8 kg/ha</b><br><b>+ 0,2 l/ha</b><br><b>+ 3 kg/ha</b><br>2 l/ha                                                                       | Systemisch gegen Peronospora<br>Gegen Peronospora und Roter Brenner<br>Gegen Oidium<br>Gegen Oidium und Schadmilben<br>N-betont, MG und S in Trockenphasen                                                                                                                                  |
|    | Kurz vor der Blüte               |             | <b>Zorvec Vinabel *</b><br><br><b>+ Talendo Extra</b><br><b>+ Karathane Gold</b><br><b>+ Netzschwefel Kwizda</b><br>+ Spintor<br>+ Mimic<br>+ AzoSpeed                               | <b>0,38 l/10.000 m²</b><br><b>z.B. 0,22 l/ha*</b><br><b>0,2 l/ha</b><br><b>+ 0,3 l/ha</b><br><b>+ 3 kg/ha</b><br>80 ml/ha<br>0,2 - 0,4 l/ha<br>3 l/ha        | Systemisch gegen Peronospora,<br>Zusatzwirkung Botrytis<br>Oidium, Zusatzwirkung Schwarzfäule<br>Gegen Oidium<br>Gegen Oidium und Schadmilben<br>Gegen Spring- und Heuwurm<br>Gegen Heuwurm<br>N-betont, MG und S in Trockenphasen                                                          |
| <b>Rebblüte</b>                                                                       |                                  |             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                       |                                  |             | <b>Florgib Tabletten</b>                                                                                                                                                             | <b>max. 16 Tabl./10.000 m²</b>                                                                                                                               | Zur Lockerung des Stielgerüsts und als Botrytisvorbeugung, in die Vollblüte                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Abgehende Blüte -<br>1.Nachblüte |             | <b>Curifol Triple WG</b><br><br><b>+ Spirox Duo</b><br><br><b>+ Karathane Gold**</b><br><b>+ Netzschwefel Kwizda</b><br>+ Wuxal Mg<br>+ Wuxal K40 SiCure                             | <b>3 kg/10.000 m²</b><br><b>z.B. 2,13 kg/ha*</b><br><b>0,3l/10000m²</b><br><b>z.B. 0,21 l/ha*</b><br><b>0,3 l/ha</b><br><b>+ 3 kg/ha</b><br>3 l/ha<br>3 l/ha | Systemisch gegen Peronospora, Zusatzwirkung Botrytis<br>Gegen Oidium, Zusatzwirkung Schwarzfäule<br><br>Gegen Oidium<br>Gegen Oidium und Schadmilben<br>Gegen Mg-Mangel und Stielähme<br>Gegen Traubenwelke.                                                                                |
|  | Schrotkorn-<br>bis Erbsengröße   |             | <b>Zorvec Vinabel* (=Zorvino Pack)</b><br><br><b>+ Nissovin (=Zorvino Pack)</b><br><b>+ Netzschwefel Kwizda</b><br>+ Wuxal Mg<br>+ Wuxal K40 SiCure                                  | <b>0,38 l/10.000 m²</b><br><b>z.B. 0,3 l/ha *</b><br><b>+ 0,5 l/ha</b><br><b>+ 3 kg/ha</b><br>3 l/ha<br>3 l/ha                                               | Systemisch gegen Peronospora<br>Zusatzwirkung Botrytis.<br>Gegen Oidium<br>Gegen Oidium und Schadmilben<br>Gegen Mg-Mangel und Stielähme<br>Gegen Traubenwelke                                                                                                                              |
|  | Beginn -<br>Traubenschließen     |             | <b>Reboot</b><br><b>+ Foshield</b><br><b>+ Talendo Extra</b><br><b>+ Cuprofor Flow</b><br><b>+ Prestop</b><br>+ Designer<br>+ Mimic<br>+ Spintor<br>+ Wuxal Mg<br>+ Wuxal K40 SiCure | <b>0,4 kg/ha</b><br><b>3 l/ha</b><br><b>+ 0,3 l/ha</b><br><b>1 l/ha</b><br><b>+ 2 kg/ha</b><br>0,15 l/ha<br>0,8 l/ha<br>120 - 160 ml/ha<br>3 l/ha<br>3 l/ha  | Gegen Peronospora, Zusatzwirkung Botrytis<br>Systemisch gegen Peronospora<br>Gegen Oidium<br>Gegen Peronospora, Beerenabhärtung<br>Gegen Botrytis<br>Spezialadditiv („Netzmittel“)<br>Gegen Sauerwurm<br>Gegen Sauerwurm und Ohrwurm<br>Gegen Mg-Mangel und Stielähme<br>Gegen Traubenwelke |
|  | Reifebeginn                      |             | <b>Anteva</b><br><b>+ Kusabi</b><br><b>+ Cuprofor Flow</b><br>+ Spintor<br>+ Wuxal Mg<br>+ Wuxal K40 SiCure                                                                          | <b>1,6 kg/ha</b><br><b>0,3 l/ha</b><br><b>+ 1 l/ha</b><br>160ml/ha<br>+ 3 l/ha<br>3 l/ha                                                                     | Gegen Peronospora, Zusatzwirkung Botrytis<br>Gegen Oidium, Zusatzwirkung Botrytis<br>Gegen Oidium, Zusatzwirkung Botrytis<br>Gegen Peronospora, Beerenabhärtung<br>Gegen Ohrwurm und Kirschessigfliege<br>Gegen Traubenwelke, Gegen Mg-Mangel und Stielähme                                 |
|  | Weichwerden der Beeren           |             | <b>Kupfer Fusilan WG</b><br><b>+ Karma SG</b><br><br>+ Spintor                                                                                                                       | <b>2,5 kg/ha</b><br><b>3,3 kg/10.000m²</b><br>z.B.: 2,84 kg /ha<br>in 500 l Wasser**<br>160 ml/ha                                                            | Gegen Peronospora, verbessert die Holzreife<br>Gegen Oidium und Botrytis<br><br>Gegen Kirschessigfliege ohne Designer nicht mit Karma kombinieren                                                                                                                                           |

Pfl.Reg.Nr.: Netzschwefel Kwizda: 1941, Kupfer Fusilan WG: 3621, Anteva 4470-0, Talendo Extra: 3342, Karathane Gold 2981, Kusabi: 3825, NissoVin: 3157-901, Prestop: 3680, Cuprofor flow: 3034-901, Reboot: 3640, Zorvec Vinabel: 4369, Videryo F: 3783, Karma SG 3398, Spirox Duo: 3863-901, Florgib Tabletten: 3789, Spintor 3296, Mevalone 4558, Mimic 2620, Weintec 4270, Foshield 4346, Limocide 4097.

++ Karathane Gold darf nicht mehr verkauft, aber noch bis 29.9.2026 aufgebraucht werden  
\* Beispiel für Spirox Duo: 2,8 m Reihenabstand; 11 cm Laubwandhöhe = 766,7 m² = 23 ml Spirox Duo/ha  
\* Beispiel letzte Vorblüte: 2,8m Reihenabstand; 80cm Laubwandhöhe =5700m² = 0,21 l Zorvec Vinabel/ha, bzw. 1,1m in der Nachblüte, 7900m²=0,3l/ha