

Wirkungsspektrum Grünlandherbizide				
Deutscher Name	Lateinischer Name			
Ampfer-Arten	<i>Rumex spp.</i>	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Bärenklau, Wiesen-	<i>Heracleum sphondylium</i>	■	■ ■	■ ■ ■ ■
Beinwell, Gewöhnlicher-	<i>Symphytum officinale</i>	■ ■ ■	■ ■	n.b.
Brennnessel, Arten	<i>Urtica spp.</i>	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■
Distel-Arten	<i>Cirsium spp., Carduus spp.</i>	■ ■ ■ ■	■	■
Ferkelkraut, Gemeines-	<i>Hypochaeris radicata</i>	■ ■ ■	n.b.	n.b.
Fingerkraut, Kriechendes-	<i>Potentilla reptans</i>	■ ■ ■	■ ■	n.b.
Flockenblume	<i>Centaurea spp.</i>	■ ■ ■	■	■ ■
Gänseblümchen	<i>Bellis perennis</i>	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Gänsedistel	<i>Sonchus arvensis</i>	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■
Giersch, Zaun-	<i>Aegopodium podagraria</i>	■ ■	■ ■ ■	n.b.
Hellerkraut	<i>Thlaspi arvense</i>	■ ■	■	■ ■ ■
Hirtentäschel	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	■ ■	■ ■	■ ■ ■
Hornkraut, Kleinblütiges-	<i>Cerastium glomeratum</i>	■ ■ ■	n.b.	■ ■ ■
Huflattich	<i>Tussilago farfara</i>	■ ■ ■	■ ■	n.b.
Johanniskraut	<i>Hypericum perforatum</i>	■ ■ ■	■ ■ ■	n.b.
Kälberkropf, Behaarter-	<i>Chaerophyllum hirsutum</i>	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■
Kamille-Arten	<i>Matricaria spp.</i>	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■
Kerbel, Wiesen-	<i>Anthriscus sylvestris</i>	■ ■	■	■ ■ ■ ■
Klee-Arten	<i>Trifolium spp.</i>	■ ■ ■	■ ■ ■	-
Klette, Große-	<i>Arctium lappa</i>	■ ■ ■ ■	■	n.b.
Knöterich, Japanischer Stauden-	<i>Fallopia japonica</i>	■ ■ ■	■	■
Knöterich, Landwasser-	<i>Polygonum amphibium</i>	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■
Knöterich, Sachalin-	<i>Reynoutria sachalinensis</i>	■ ■	■ ■	■
Knöterich, Wiesen-	<i>Polygonum bistorta</i>	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■
Königskerze	<i>Verbascum spp.</i>	■ ■ ■	■ ■	n.b.
Krapp, Levantiner-	<i>Rubia peregrina</i>	■ ■ ■	n.b.	n.b.
Leimkraut, Nelken-	<i>Silene armeria</i>	■ ■ ■	■ ■	n.b.
Löwenzahn, Gemeiner-	<i>Taraxacum officinale</i>	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Luzerne	<i>Medicago spp.</i>	■ ■ ■	■ ■ ■	■
Minze, Acker-	<i>Mentha arvensis</i>	■ ■	■ ■	■ ■ ■
Pestwurz	<i>Petasites hybridus</i>	n.b.	■ ■	n.b.
Pippau, Borsten-	<i>Crepis setosa</i>	■ ■ ■	n.b.	■
Radmelde, Besen-	<i>Kochia scoparia</i>	■ ■ ■	n.b.	n.b.
Rainfarn	<i>Tanacetum vulgare</i>	■ ■ ■	■ ■	n.b.
Sauerklee	<i>Oxalis spp.</i>	■ ■ ■	■ ■ ■	n.b.
Schafgarbe, Gemeine-	<i>Achillea millefolium</i>	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■
Storcheschnabel, Wiesen-	<i>Geranium pratense</i>	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■
Taubnessel, Weiße-	<i>Lamium album</i>	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■
Vergissmeinnicht, Acker-	<i>Myosotis arvensis</i>	■ ■ ■	■ ■ ■	■
Vogelmiere	<i>Stellaria media</i>	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Wasserfenchel, Bibernell-	<i>Oenanthe pimpinelloides</i>	■ ■	n.b.	n.b.
Wegerich-Arten	<i>Plantago spp.</i>	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■
Weidenröschen	<i>Epilobium spp.</i>	■ ■ ■	■ ■ ■	n.b.
Wicke-Arten	<i>Vicia spp.</i>	■ ■ ■	■ ■ ■	-
Wiesenlabkraut	<i>Galium album</i>	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Wiesenmargerite	<i>Chrysanthemum leucanthemum</i>	■ ■ ■	n.b.	n.b.
Wilde Möhre	<i>Daucus carota</i>	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■
Zaunwinde	<i>Calystegia sepium</i>	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■
Ziest, Acker-	<i>Stachys arvensis</i>	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■
Giftpflanzen				
Adlerfarn	<i>Pteridium aquilinum</i>	■	■	■ ■ ■
Bärenklau, Riesen-	<i>Heracleum mantegazzianum</i>	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■
Hahnenfuß, Kriechender-	<i>Ranunculus repens</i>	■ ■ ■	■	■ ■ ■
Hahnenfuß, Scharfer-	<i>Ranunculus acris</i>	■ ■	■	■ ■
Herbstzeitlose	<i>Colchicum autumnale</i>	n.b.	■	n.b.
Kreuzkraut, Jakobs-	<i>Senecio jacobaea</i>	■ ■ ■	■	■ ■
Schachtelhalm, Acker-	<i>Equisetum arvense</i>	■	■ ■	■
Scharbockskraut	<i>Ranunculus ficaria</i>	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■
Wiesenschaumkraut	<i>Cardamine pratensis</i>	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Wolfsmilch, Zypressen-	<i>Euphorbia cyparissias</i>	■ ■ ■	n.b.	n.b.

Die Bekämpfung von einjährigen Samen-unkräutern sollte im Jugendstadium / vor Blühbeginn erfolgen.

- ■ ■ ■ = Ausgeprägte Dauerwirkung
- ■ ■ = Sehr gute bis gute Wirkung
- ■ = Weniger gute Wirkung
- = Nicht ausreichende Wirkung

n.b. = keine Daten vorhanden



Brennnessel (*Urtica dioica*)



Wiesenkerbel (*Anthriscus sylvestris*)



Jakobskreuzkraut (*Senecio jacobaea*)



Distel (*Cirsium arvense*)