FELDBAURATGEBER 2026

Kwizda Agro

Mit Sicherheit wachsen

2026

100 YEARS

PRODUKTNEUHEITEN 2026

DRAGSTER MAIS PACK (für 4 Hektar)

Starke Komplettlösung mit Bodenwirkung

135 g Dragster + 0,4 l Vivolt + 1 l Bozon
+ 1,25 l Quantum/ha
gegen alle im Mais relevanten Unkräuter und Schadgräser mit guter Nebenwirkung gegen Winde-Arten

DRAGSTER (plus Netzmittel Vivolt)

Mit hoch aufgeladenem Wirkstoffanteil

135 g Dragster + 0,4 l Vivolt
Noch bessere Gräserwirkung bei Splitting:
2 x 67,5 g + 0,2 l Vivolt/ha (Abstand 7 Tage)

SACRON WG

Das günstige Cymoxanil-Fungizid gegen Phytophthora in Kartoffel

0,22 kg Sacron WG/ha
in der Regel als Zumischpartner bei hohem Infektionsdruck. Max. 4 Anwendungen.

PANNON STARTER MEGA

Weiterentwicklung und Leistungssteigerung von Pannon Starter

15 kg/ha
Ausbringung mit dem Granulatstreuer bei der Aussaat direkt in die Saatfurche

SICURE FORMULIERUNG

Stärken sie ihre Pflanzen, sichern sie Ihren Ertrag

- **Besser Widerstandsfähigkeit gegen Trockenheit und Hitzestress**
- **Erhöhte Stabilität**
- **Hochwertige Siliziumquelle**
- **Schutz vor äußeren Umwelteinflüssen**

Wuxal Ascofol SiCure 10 l / 25 l
Wuxal Boron SiCure 10 l / 25 l
Wuxal K40 SiCure 10 l
Wuxal SiCure Plus 10 l

Zusätzlich zu den Inhaltsstoffen der bewährten Produkte umfasst die SiCure Linie nun auch pflanzenverfügbares Silizium für eine optimierte Nährstoffversorgung und erhöhte Stressresistenz.

GEPLANTE ART. 53 ANTRÄGE FÜR 2026

Für folgende Kwizda-Produkte werden Anträge gestellt:

Produkt	Kultur	Problem
Belem	Kürbis u.a.	Drahtwurm, Saatenfliege, Raupen
Centurion Plus	Kürbis, Soja u.a.	Einj. Rispe, Weidelgras, Sorghum halopense
Exigon	Grünland	Engerlinge auf Wiesen und Weiden
Kabuki Turbo	Himbeeren, Erdbeere u.a.	Unkräuter
Mospilan 20 SG	Rübe u.a.	Blattläuse, Zikaden, u.a.
Raptol HP	Gemüse, Wein u.a.	Thripse, Blattläuse, Grüne Reiswanze, Marmorierte Baumwanze
Rinpode	Zuckerrübe	Samtpappel, resistenter Gänsefuß
Samba K	Wein	Amerikanische Rebzikade, Kräuselmilben
Spintor	Kern-, Stein- u. Beerenobst	Fruchtstecher, Kirschessigfliege
Univoq	Zuckerrübe	Altern. Wirkstoff gegen Cercospora
Viballa	Sonnenblume	Ambrosia, resistenter Amarant
Zorvec Entecta*	Zwiebel, Salate	Falscher Mehltau

Impressum:
Diese Informationsschrift gilt ab Jänner 2026 und soll beraten. Sie enthält alle bisher gemachten Erfahrungen. Ältere Empfehlungen, die von diesen abweichen, verlieren somit ihre Gültigkeit. Die in der Drucksorte enthaltenen Anwendungsempfehlungen sind in kurzer Form beschrieben. Pflanzenschutzmittel sicher verwenden. Vor der Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen.
www.kwizda-agro.at
facebook.com/KwizdaAgroAT linkedin.com/company/kwizda-agro-gmbh/ @kwizdaagro_com

INHALT

GETREIDE

Getreideherbizide	**5 - 13**
Wachstumsregler/Mäuseköder	**14**
Getreideinsektizide	**15**
Getreidefungizide	**16 - 22**
Blattdünger	**23 - 24**
Biostimulanzien	**25**

MAIS

Maisherbizide	**27 - 30**
Maisinsektizide	**31 - 32**
Start- und Blattdüngung	**34 - 36**

DIGITALE SERVICES

Digitale Services - Kwizda Xperience	**33**

ZUCKERRÜBE

Zuckerrübenherbizide	**38 - 44**
Zuckerrübenfungizide	**45 - 47**
Zuckerrübeninsektizide	**48**

AKTIVATOREN

Additive und Netzmittel	**50 - 52**
Blattdüngung	**53**

KARTOFFEL

Kartoffelherbizide	**55 - 58**
Kartoffelfungizide	**58 - 62**
Blattdüngung	**63**
Krautabtötung	**64**
Kartoffelinsektizide	**65 - 67**
Kartoffelspritzplan	**68 - 69**

RAPS

Rapsherbizide	**71 - 75**
Rapsinsektizide	**76 - 77**
Schneckenkorn	**77**
Blattdüngung	**78 - 80**
Biostimulanzien	**80**

SONNENBLUME

Pflanzenschutzstrategie in Sonnenblume	**82**

SOJABOHNE

Pflanzenschutzstrategie in Soja	**83 - 84**

KÜRBIS

Kürbisherbizide	**85 - 86**

ACKERBOHNE

Ackerbohnenherbizide	**87 - 88**

ZWIEBEL

Zwiebelfungizide	**91 - 92**
Zwiebelinsektizide	**93**
Zwiebelherbizide	**94**
Keimhemmung und Pflanzenstärkung	**95**

GEMÜSE

Zugelassene Produkte im Gemüsebau	**96 - 99**

ERDBEERE

Zugelassene Produkte in Erdbeeren	**99**

GRÜNLAND

Grünlandherbizide, Engerlingstrategie	**101 - 103**

ANSPRECHPARTNER KWIZDA AGRO ZENTRALE

Produktmanager
Kartoffel, Mais

MICHAEL FÜNFKIRCHEN
0664/822 58 64
m.fuenfkirchen@kwizda-agro.at

Produktmanager
Feldkulturen

JOSEF SCHLAGENHAUFEN
0664/422 46 32
j.schlagenhaufen@kwizda-agro.at

Produktmanagerin
Bio Pflanzenschutzmittel
DE/AT, Düngemittel,
Biostimulanzien

MANUELA GEHRKE
0664/780 66 135
m.gehrke@kwizda-agro.at

GETREIDE

WIRKUNGSSPEKTRUM GETREIDEHERBIZIDE

Produkte		*Broadway*	*Broadway Plus*	*Express SX + Pixxaro EC*	*Express SX*	*Pixxaro EC*	*Concert SX*	*Concert Pixxaro Pack*
HRAC: neuer Code (bisheriger Code)		2 (B)	2, 4, (B, O)	2, 4 (B, O)	2 (B)	4 (O)	2 (B)	2, 4 (B, O)
Aufwandmenge/ha	Sommergetreide	175 g + 0,9 l [3]	40 g + 0,6 l	25 g + 0,25 l	45 g	0,5 l [4]	100 g	88 g + 0,22 l
	Wintergetreide	175 g + 0,9 l [3]	50 g + 0,8 l	25 g + 0,25 l	45 - 60 g	0,5 l [4]	150 g [2]	100 g + 0,25 l
Blatt-/Bodenwirkung								
Streulage		+	+	+	+	+	+	+
Nachtfröste bis -3°C		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gewässerabstand		5 m	1 m	-/-/20/10 m	1 m	-/-/20/10 m	5/5/5/1 m	-/-/20/10 m
Entwicklungsstadium BBCH		12 - 30	21 - 32	13 - 29 (37)	13 - 29 (37)	13 - 45	13 - 29	13 - 29
Ackerkratzdistel			60 g		+		5)	
Ackerminze								
Ackersenf/Hederich								
Ackerwinde			60 g	+		+		+
Ampfer			60 g					
Ausfallraps, -erbse, -sonnenblume					12)		11) 9)	
Besenrauke								
Ehrenpreis								+
Erdrauch			+	+		+		+
Franzosenkraut								
Gänsefuß, Weißer			+		6)			
Hirtentäschel								
Hohlzahn, Gemeiner								
Kamille, Echte								
Klatschmohn								
Klettenlabkraut			+	+		+	7)	
Knöterich, Ampferblättriger								
Knöterich, Vogel-								
Knöterich, Winden-								
Kornblume			60 g					
Kreuzkraut, Gemeines								
Melde, Gemeine			+		6)			
Pfeilkresse								
Steinsame, Acker-								
Stiefmütterchen, Acker-								
Storchschnabel								
Taubnessel			60 g					
Vergissmeinnicht								
Vogelmiere				+		+		
Windhalm		+	+				8)	12)
Rispe, Einjährige		9)	60 g				8)	12)
Fuchschwanzgras, Acker-			60 g				12)	12)
Flughafer		+ 10)					12)	12)
Weidelgras		9)	60 g				12)	12)

sehr gut wirksam | gut wirksam | gute Blattwirkung | gute Bodenwirkung

schwach wirksam | nicht wirksam | schwache Blattwirkung | schwache Bodenwirkung

1) Ausgenommen Dinkel, S-Roggen 2) in Wintergerste und Winterhafer 100 g 3) nur Winterweizen, -roggen, -triticale, -Durum und Dinkel 4) ausgenommen Hafer
5) bis zum 6-Blattstadium 6) bis zum 4-Blattstadium 7) bis zum 5-Quirlstadium 8) bis zum 3-Blattstadium 9) bei herbizidtoleranten Sonnenblumen + 1 l Dicopur M/ha
10) Persischer Ehrenpreis 11) nur Erbse und Sonnenblume 12) + 2 l Lentipur 500 früh einsetzen

WIRKUNGSSPEKTRUM GETREIDEHERBIZIDE

Ariane C	*Artus*	*Dicopur M*	*Viper Compact*	*Viper Compact + Lentipur 500*	*Lentipur 500*	*Fantasia*	**Produkte**
2, 4 (B, O)	2, 14 (B, E)	4 (O)	2, 12 (B, F1)	2, 12, 5 (B, F1, C2)	5 (C2)	15 (N)	HRAC: neuer Code (bisheriger Code)
1-1,25 l	40 g	1,5 l [1)]	-	-	-	2,5 - 5 l	Sommergetreide — Aufwandmenge/ha
1 l	50 g	1,5 l [1)]	1 l	0,75 + 1,5 l	1,5 - 3 l		Wintergetreide — Aufwandmenge/ha
							Blatt-/Bodenwirkung
+	+	-	+	+	+	+	Streulage
-	✓	-	✓	+	+	+	Nachtfröste bis -3°C
1 m	1 m	1 m	-/-/20/10 m	-/-/20/10 m	1 m	15/10/5/1	Gewässerabstand
13 - 30 (39)	13 - 32	13 - 39	10 - 29	13 - 29	VA oder 13 - 29	VA	Entwicklungsstadium BBCH
+ 11)	5)						Ackerkratzdistel
							Ackerminze
			6)	6)			Ackersenf/Hederich
+							Ackerwinde
							Ampfer
							Ausfallraps, -erbse, -sonnenblume
							Besenrauke
							Ehrenpreis
							Erdrauch
							Franzosenkraut
							Gänsefuß, Weißer
							Hirtentäschel
							Hohlzahn, Gemeiner
+							Kamille, Echte
							Klatschmohn
+			7)	7)			Klettenlabkraut
	6)						Knöterich, Ampferblättriger
	6)						Knöterich, Vogel-
	6)						Knöterich, Winden-
+			6)	+			Kornblume
							Kreuzkraut, Gemeines
							Melde, Gemeine
							Pfeilkresse
							Steinsame, Acker-
							Stiefmütterchen, Acker-
							Storchschnabel
							Taubnessel
							Vergissmeinnicht
							Vogelmiere
				8)			Windhalm
							Rispe, Einjährige
			*				Fuchsschwanzgras, Acker-
			**		3 l	3 l	Weidelgras

* + 0,9 l Axial 50 ** + 1,2 l Axial 50

sehr gut wirksam | gut wirksam | gute Blattwirkung | gute Bodenwirkung

schwach wirksam | nicht wirksam | schwache Blattwirkung | schwache Bodenwirkung

1) Ausgenommen Dinkel, S-Roggen 2) in Wintergerste und Winterhafer 100 g 3) nur Winterweizen, -roggen, -triticale, -Durum und Dinkel 4) ausgenommen Hafer
5) bis zum 6-Blattstadium 6) bis zum 4-Blattstadium 7) bis zum 5-Quirlstadium 8) bis zum 3-Blattstadium 9) bei herbizidtoleranten Sonnenblumen + 1 l Dicopur M/ha
10) Persischer Ehrenpreis 11) nur Erbse und Sonnenblume 12) + 2 l Lentipur 500 früh einsetzen

EXPERTENTIPP

Ideal in **Weizen** vor **Zuckerrübe** und **Raps**

BROADWAY PLUS

Das breiteste Broadway aller Zeiten mit Arylex active

EINZIGARTIG, DA:

- **Broadway Plus breiter, rascher und sicherer wirkt**
- **Der zusätzliche Wirkstoff „Arylex active" gegen Resistenzen bei Unkräutern hilft**
- **Die konzentrierte GoDry-Formulierung niedrige Aufwandmengen ermöglicht**
- **Es keine Nachbaueinschränkungen gibt**

ZUGELASSEN IN:

- Winterweizen
- Wintertriticale
- Winterroggen
- Dinkel
- Sommerweichweizen
- Sommerhartweizen

ANWENDUNG:

In Winterungen
je nach Unkraut oder Gräserproblem
50 - 60 g/ha Broadway Plus
+ 0,8 - 1 l/ha Netzmittel

In Sommerdurum
40 g/ha Broadway Plus + 0,6 l/ha Netzmittel

WIRKUNGSSPEKTRUM:



ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 4411

Gewässerabstand:
1 m

Packungsgrößen:
7,5 ha Packung:
300 g Broadway Plus
+ 5 l Netzmittel
15 ha Packung:
600 g Broadway Plus
+ 10 l Netzmittel

Wirkstoffe:
Pyroxsulam
Florasulam
Halauxifen-methyl
Broadway Netzmittel 1

HRAC-Gruppen:
2 (B), 4 (O)

Noch breiter gegen mehr Unkräuter
Erdrauch, Taubnessel, Gänsefuß, Melde und aufgelaufene Distel

Noch sicherer in der Wirkung auf:
Kornblume, Taubnessel, Klatschmohn, Hundskerbel und -petersilie

Noch schnellere Wirkung
Klettenlabkraut, Ehrenpreis Arten, Kornblume und Storchschnabel

Mit Arylex active: Resistenz-Management:
Amarant, Kornblume, Klatschmohn, Gänsefuß und Melde, Vogelmiere

Exzellente Nachbaueigenschaften
Perfekte Anwendung in Weizen vor Raps, Begrünungen, Zuckerrüben

BROADWAY PLUS

Empfehlungen auf Flächen mit ALS-resistentem Windhalm

PRAXISTIPP:

In einigen Regionen Österreichs haben sich bei Windhalm und Weidelgräsern ALS-resistente Biotypen etabliert. Diese Ungräser können mit Sulfonylharnstoffen nicht kontrolliert werden, daher empfehlen wir den Zusatz von Lentipur 500 mit einem alternativen Wirkmechanismus:

ANWENDUNG:

50 - 60 g/ha Broadway Plus + 0,8 - 1 l/ha Netzmittel + 2 l Lentipur 500/ha

LENTIPUR 500

Der perfekte Mischpartner mit alternativem Wirkmechanismus

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 3668

Gewässerabstand:
1 m

Packungsgröße:
5 l Kanister

Wirkstoff:
Chlortoluron

HRAC-Gruppe:
5 (C2 alt)

EINZIGARTIG, DA:

- Sicher gegen Windhalm, Einjährige Rispe und viele Unkräuter
- Resistenzbrecher bei Windhalm im Herbst zu Viper compact
- Perfekter Mischpartner zu Broadway plus bei resistentem Windhalm
- Guter Windhalmpartner zu Concert + Pixxaro bei früher Anwendung in der Gerste

ANWENDUNG:

W-Weizen und W-Gerste bis 3 l/ha
W-Triticale und W-Roggen bis 2 l/ha

PIXXARO EC

Der preiswerte Klettenstandard mit Mehrwert

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 3756

Gewässerabstand:
-/-/20/10 m

Packungsgrößen:
1 l Flasche
5 l Flasche

Wirkstoffe:
Halauxifen-methyl
Fluroxypyr

HRAC-Gruppe:
4 (O)

EINZIGARTIG, DA:

- **Sehr gute Wirkung gegen Klettenlabkraut jeder Größe auch bei ungünstigen Bedingungen**
- **Erfasst zusätzlich Problemunkräuter (Erdrauch, Knöterich-Arten, Winden, Gänsefuß, Kornblume, Taubnessel)**
- **Ein neuer Wirkstoff zur Anti-Resistenzstrategie**

ZUGELASSEN IN:

- Allen Winter- und Sommergetreidearten (außer Hafer)

Vergleich: 0,25 l Pixxaro zu 0,5 l Fluroxypyr/ha

ANWENDUNG:

25 g Express SX + 0,25 l Pixxaro EC/ha
in Getreide gegen breitblättrige Unkräuter (mischbar mit Gräserpartner)

100 g Concert SX + 0,25 l Pixxaro EC/ha
als Mischungspartner zur Absicherung der Klettenlabkrautwirkung

0,25 l Pixxaro EC/ha
zur Korrektur gegen Klettenlabkraut einsetzbar bis BBCH 45

PRAXISTIPP:

0,25 l Pixxaro EC/ha ist der sichere Standard zur Kontrolle von Klettenlabkraut in jedem Stadium.

EXPRESS SX

Das Basisherbizid für Winter- und Sommergetreide

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 2914

Gewässerabstand:
1 m

Packungsgrößen:
100 g Dose
750 g Dose

Wirkstoff:
Tribenuron-Methyl

HRAC-Gruppe:
2 (B)

EINZIGARTIG, DA:

- **Idealer Mischungspartner bei wichtigen Problemunkräutern**
- **Anerkannte Distelwirkung**
- **Langer Anwendungszeitraum bei sehr guter Verträglichkeit**

ZUGELASSEN IN:

- Allen Getreidearten
- In Express SX-toleranten Sonnenblumen

ANWENDUNG im Frühjahr:

45 g Express SX + 0,25 l Gondor/ha
Bei Soloanwendung

30 g Express SX + 1 l Dicopur M/ha
Bei Auftreten von Gänsefuß bzw. Express SX-toleranter Ausfallsonnenblume

25 g Express SX + 0,25 l Pixxaro EC/ha
Breite Wirkung auf alle zweikeimblättrigen Unkräuter

EXPERTENTIPP:

35 g Express SX + 0,25 l Gondor/ha als Korrekturmaßnahme gegen Distel. Ideal auch in Kombination mit Fabulis OD und Pronto Plus oder Verben in der Schossphase.

Express SX wirkt effizient auf Distel

CONCERT SX + PIXXARO EC PACK

Der Ehrenpreispack für 4 Hektar Getreide

ÜBERSICHT:

Pfl.Reg.Nr.
Concert SX 2932
Pixxaro EC 3756

Gewässerabstand:
-/-/20/10 m

Packungsgröße:
1,4 kg (2 x 200 g Concert + 1 l Pixxaro)

Wirkstoffe:
Metsulfuron, Thifensulfuron, Fluroxypyr, Halauxifen-methyl

HRAC-Gruppen:
2 (B), 4 (O)

EINZIGARTIG, DA:

- **Breit wirksamer Getreideherbizid Kombipack**
- **Unter optimalen Bedingungen auf 4,5 ha einsetzbar**
- **Schwerpunkt breitblättrige Unkräuter inkl. Ehrenpreis und viele Problemunkräuter**

ZUGELASSEN IN:

- In allen Getreidearten außer Hafer zur Anwendung im Frühjahr bis BBCH 29

ANWENDUNG:

100 g Concert SX +
0,25 l Pixxaro EC/ha

Unter guten Bedingungen und in Sommerungen
Pack auf 4,5 ha =
88 g Concert SX + 0,22 l Pixxaro EC/ha + 2 l Lentipur 500/ha auf Flächen mit Windhalm (noch nicht bestockt - frühe Anwendung)

EXPRESS SX + PIXXARO EC PACK

Der breit wirksame und gut mischbare Unkraut- und Distelpack

ÜBERSICHT:

Express SX
Pfl. Reg. Nr. 2914
Pixxaro EC
Pfl. Reg. Nr. 3756

Gewässerabstand:
-/-/20/10 m

Packungsgröße:
4 ha Packung
100 g Express SX
+ 1 l Pixxaro EC

Wirkstoffe:
Tribenuronmethyl
Arylex, Fluroxypyr

HRAC-Gruppen:
2 (B), 4 (O)

EINZIGARTIG, DA:

- **Breit und sicher wirksam gegen Unkräuter im Getreide**
- **Stärkste Wirkung gegen Klettenlabkraut jeder Größe**
- **Universell mischbar mit Fungiziden (Pronto Plus, Verben), Halmverkürzern (Fabulis OD), Insektiziden (Cymbigon Forte) und Blattdüngern**

ZUGELASSEN IN:

- Allen Winter- und Sommergetreidearten (außer Hafer)

ANWENDUNG:

25 g Express SX
+ 0,25 l Pixxaro EC/ha
gegen alle wichtigen zweikeimblättrigen Unkräuter in Winter- und Sommerungen

EIGENSCHAFTEN:

Die Produkte ergänzen einander perfekt in der Wirkung. Beide Produkte sind, unabhängig von der Temperatur, von früh bis spät einsetzbar und dabei sehr verträglich auch auf taufeuchten Beständen. Bei Schadgräsern mit Gräsermitteln mischbar.

CONCERT SX

2026 CONCERT SX PREISREDUKTION

Bewährt, begehrt in allen Getreidearten

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 2932

Gewässerabstand:
Wintergetreide, ausgenommen Wintergerste, Winterhafer
5/5/5/1 m

Sommergetreide, Wintergerste, Winterhafer
5/5/1/1 m

Öllein
3/3/1/1 m

Packungsgrößen:
200 g Dose
900 g Dose

Wirkstoffe:
Thifensulfuron-Methyl, Metsulfuron-Methyl

HRAC-Gruppen:
2 (B)

EINZIGARTIG, DA:

- ▶ **Ideal in Sommerungen**
- ▶ **Gute Verträglichkeit auch in Mischungen mit Düngern und Fungiziden**
- ▶ **Erfasst auch Ehrenpreis, Ampfer und Knöteriche**

ZUGELASSEN IN:

- Allen Getreidearten
- Splitting im Öllein

EXPERTENTIPP:

Bei sehr großem Klettenlabkraut oder Express SX-toleranter Sonnenblume:
Concert SX + Pixxaro EC Pack einsetzen

Bei Windhalm:
1,5 l Lentipur 500/ha beimischen

Bei Distel oder Express SX-toleranter Ausfallsonnenblume:
1 l Dicopur M/ha beimischen

ANWENDUNG:

120 - 150 g Concert SX/ha In Winterweizen, Winterroggen, Triticale, Winterdurum und Dinkel gegen Unkräuter, Windhalm (bis 3-Blatt) und Einjährige Rispe.

100 g Concert SX/ha In Wintergerste und Winterhafer gegen Unkräuter

80 - 100 g Concert SX/ha In Sommergetreide

2 x 50 g Concert SX/ha Auch anwendbar in Lein (bei guter Wachsschicht + 0,25 l Gondor/ha)
Der Zusatz von Gondor beschleunigt und verstärkt die Wirkung von Concert SX

ARIANE C

Stärkstes Produkt gegen Wurzelunkräuter

Galaktisch gegen Distel und Kornblume

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 3338

Gewässerabstand:
1 m

Packungsgrößen:

1 l Flasche
5 l Kanister

Wirkstoffe:
Fluroxypyr
Florasulam
Clopyralid

EINZIGARTIG, DA:

- ▶ **Breit wirksam auch gegen Distel, Kornblume, Klettenlabkraut**
- ▶ **Langer Einsatzzeitraum**
- ▶ **Wuchsstoff- und Sulfonylharnstofffrei**

ZUGELASSEN IN:

- Allen Getreidearten
- Gräservermehrungen

HRAC:
2 (B), 4 (O)

ANWENDUNG:

Solo: 1 - 1,5 l Ariane C/ha
In allen Winter- und Sommergetreidearten

Als Mischungspartner: 0,75 l Ariane C + 0,75 l Dicopur M/ha
In Sommerungen

Zur Korrekturspritzung in Winterungen: 1 l Ariane C/ha
Auch Spätanwendungen bis knapp vor dem Ährenschieben gegen Distel, Kornblume, Kamille, Klettenlabkraut, Windenknöterich u.a. möglich. Ideal auch in Kombination mit 1 l Fabulis OD + 1 l Pronto Plus oder + 0,5 l Verben in der Schossphase.

ANWENDUNGSZEITRAUM:

Nachauflauf im Frühjahr
Winterweizen, -roggen, -gerste und -triticale: BBCH 13 - 39
Sommerweizen, -gerste und -hafer: BBCH 13 - 30
Gräserbestände zur Saatguterzeugung: BBCH 13 - 29

EXPERTENTIPP:

Gegen Winde, Schachtelhalm, Huflattich und Beinwell bei wüchsigen Bedingungen
1,5 l Ariane C
+ 1 l Dicopur M
+ 0,25 l Gondor/ha

Ariane C mit der nachhaltigsten Distelwirkung

GETREIDE HERBSTSTRATEGIE PFLANZENSCHUTZ 2026

Blattdünger

Aufwandmengen pro Hektar

Verbesserung Winterhärte
Vorbeugung Mn-Mangel
Stärkung Wurzelsystem

1,5 l Wuxal Combi B Plus
(8,4 % B; 7 % Mn; 0,35 % Mo; 1,2 % S)

Herbizide

Windhalm + Unkräuter

1 l Viper Compact

Windhalm + Unkräuter nach ALS-Hemmer im Frühjahr

0,75 l Viper Compact + 1,5 l Lentipur 500

Korrektur Klette, Distel
1 l Ariane C

Windhalm + Unkräuter Resistenzmanagement ALS-Hemmer

2,5 l Fantasia
+ 1,5 l Lentipur 500

Ackerfuchsschwanz und Raygras Standorte

0,6 l Flufenacet-haltiges Produkt

20 g Express SX

oder

Korrektur Klette
0,25 l Pixxaro

Schädlinge

Blattläuse als Virus-Überträger

50 ml Cymbigon Forte + 150 ml Designer

WINTERRUHE

UNKRAUTPROBLEME UND KORREKTURMÖGLICHKEITEN

ALS-tolerante Rüben/Schosser und resistenz-gefährdete Unkräuter

Nach ALS-toleranten Rüben wird meist Getreide gebaut. Damit es zu keiner Bildung resistenter Unkräuter kommt und eventuelle Schosser oder Durchwuchsrüben bekämpft werden, empfehlen wir Getreideherbizide mit alternativem Wirkmodus:

LÖSUNG:

0,25 l Pixxaro EC + 25 g Express SX/ha
1 l Ariane C/ha
0,5 l Pixxaro EC/ha
50 g Broadway Plus + 0,8 l Netzmittel

Klettenlabkraut, Kornblume

LÖSUNG:

50 g Broadway Plus + 0,8 l Netzmittel
0,25 - 0,5 l Pixxaro EC/ha
im Herbst **0,75 l Viper Compact + 1,5 l Lentipur/ha**

Klettenlabkraut, Stiefmütterchen

LÖSUNG:

0,25 l Pixxaro EC
+ 25 g Express SX/ha
50 g Broadway Plus + 0,8 l Netzmittel

Klettenlabkraut, Distel

LÖSUNG:

0,25 l Pixxaro EC
+ 1 l Dicopur M/ha
oder 1 l Ariane C/ha

Klettenlabkraut, Distel, Kamille, Kornblume, Ambrosie

LÖSUNG:

1 - 1,5 l Ariane C/ha
50 g Broadway Plus + 0,8 l Netzmittel

Ackerwinde, Wurzelunkräuter

LÖSUNG:

1,25 l Ariane C
+ 1 l Dicopur M
+ 0,25 l Gondor/ha

Flughafer, Ackerfuchsschwanz, Trespe



LÖSUNG:

60 g Broadway Plus + 1 l Netzmittel
220 g Broadway + 1,1 l NM/ha (bei Problem Trespe)

FABULIS OD

Der fabelhafte Wachstumsregler im Getreide mit der besten Verträglichkeit

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 4034

Packungsgrößen:
1 l Flasche
5 l Kanister
10 l Kanister

Wirkstoff:
Prohexadion-Calcium

EINZIGARTIG, DA:

- **Kraftvoll - Halmstabilisierung Solo oder in Tankmischung**
- **Sicher für die Kultur - Ertragsstabilisierung auch unter Stressbedingungen wie Trockenheit**
- **Einfach in der Anwendung - fertige, rasch wirksame OD-Formulierung**

ZUGELASSEN IN:

- Winterweichweizen
- Winterhartweizen
- Wintergerste
- Sommergerste
- Roggen
- Triticale

ANWENDUNG:

Solo:
1 - 1,25 l Fabulis OD/ha im BBCH 31/32

Splitting:
1 l Fabulis OD/ha im BBCH 31/32
gefolgt von **0,5 l Fabulis OD/ha** im BBCH 36/37
(in Roggen und Triticale im BBCH 34)

Hubert Huemer, Pflanzenschutzberater:
Mein Tipp für das Feuchtgebiet: Kombinieren Sie im BBCH 32 zur Kürzung 1 l Fabulis OD mit 0,5 l Verben/ha. Damit starten Sie stabil und sauber in die Saison.

GRASSROOTER

Preiswerter Wachstumsregler zum Nachkürzen im Getreide

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 3963

Packungsgröße:
5 l Kanister

Wirkstoff:
Ethephon 480 g/l

EINZIGARTIG, DA:

- **Schützt die Gerste vor dem Ährenknicken**
- **Preiswerter Wachstumsregler mit dem Wirkstoff Ethephon**
- **Verkürzt den oberen Halmbereich, verdickt und stabilisiert die Halmwände**

ZUGELASSEN IN:

- Winterweichweizen,
- Winter- und Sommergerste
- Sommerweichweizen
- Wintertriticale
- Apfel
- Gladiolen

ANWENDUNG:

0,5 – 1 l Grassrooter/ha
im BBCH 37 (Triticale) oder 41 (Gerste, Weizen)
zur Halmstabilisierung und gegen Ährenknicken je nach Getreideart einsetzen

Hohe Gerstenerträge ohne Ährenknicken zur Ernte bringen

CYMBIGON FORTE

Hochkonzentriert und günstig gegen Getreideschädlinge

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 3998

Packungsgrößen:
0,25 l für 5 ha
1 l für 20 ha
5 l für 100 ha

Wirkstoff:
Cypermethrin

IRAC-Gruppe:
3A

EINZIGARTIG, DA:

- **Starke Sofortwirkung (Knock-Down-Effekt)**
- **Im Getreide inkl. Blattläuse und Getreidehähnchen**
- **Breit in vielen anderen Kulturen zugelassen**

ZUGELASSEN IN:

- Getreide
- Raps
- Zuckerrübe
- Kartoffel
- Gemüsebau

Cymbigon Forte - hocheffizient gegen Getreidehähnchen und Blattläuse

ANWENDUNG:

50 ml Cymbigon Forte + 150 ml Designer/ha
Ein günstiges Insektizid mit guter Sofortwirkung (Knockdown-Effekt) und breiter Zulassung.

ARVALIN

Feldmausköder in fast allen Kulturen

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 4167
Wirkstoff: Zinkphosphid
Gebinde: 5 kg und 25 kg

ANWENDUNG:

2 kg/ha und Applikation
5 Körner/Loch bzw. 50 Körner/Köderstation
max. 3 Anwendungen

K-OBIOL EC 25

Gegen Vorratsschädlinge im Getreidelager sowie zur Leerraumbehandlung

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 3410

Packungsgröße:
1 l Flasche

Wirkstoff:
Deltamethrin

IRAC-Gruppe:
3A

EINZIGARTIG, DA:

- **Bis zu 12 Monate Schutz**
- **Auch zur Leerraumbehandlung**
- **Keine Wartezeit**
- **Kombinierbar mit Säurekonservierung**
- **Mischung mit Propionsäure sofort anwenden!**

ANWENDUNG:

Im Getreide:
6 Monate Schutz
10 ml K-Obiol in 990 ml Wasser für 1.000 kg
12 Monate Schutz
20 ml K-Obiol in 980 ml Wasser für 1.000 kg

Im Leerraum:
Poröser Untergrund:
20 - 30 ml in 5 l Wasser/50 m²
Glatter Untergrund:
40 - 60 ml in 5 l Wasser/100 m²

ANWENDUNG:

In Getreide:
Gleichmäßiges Einsprühen beim Ein- oder Umlagern des Getreides in den Getreidestrom.

Im Leerraum:
Wände und Boden des gut gesäuberten Lagers gleichmäßig mit Spritze benetzen.

WIRKUNGSSPEKTRUM:

Gegen kriechende Insekten wie z.B. Kornkäfer, Reismehlkäfer, Getreidekapuziner, Getreideplattkäfer, Speisebohnenkäfer und fliegende Insekten wie Getreidemotten.

WIRKUNGSSPEKTRUM GETREIDEFUNGIZIDE

Produkte			Univoq	Input Xpro	Siltra Xpro	Pronto Plus	Nissovin	Verben
FRAC-Gruppe			21, 3	7,3,5	7,3	3,5	U6	13, 3
Aufwandmenge/ha			1,5 - 2 l	1 - 1,25 l	0,8 - 1 l	1 - 1,5 l	0,15 - 0,2 l	0,5 - 1 l
Gewässerabstand in m			-/-/10/10	30/20/15/15	10 + GS	-/20/15/15	1	5/5/5/5
Entwicklungsstadium BBCH			30 - 69	30 - 61	30 - 69	31 - 69	30 - 59	25 - 65
Weizen	Halmbruch		3)		3)			+ 4)
	Echter Mehltau	vorbeugend		+			+	+
		stoppend/heilend		+		+	+	
	Getreideroste	vorbeugend		+	+			
		stoppend/heilend						
	Septoria tritici	vorbeugend	+	+	+			
		stoppend/heilend	+	+				
	Septoria nodorum	vorbeugend			+			1)
		stoppend/heilend						1)
	HTR		1)			1)		
	Ährenfusariosen (Toxinminderung)		+	1)				
	Microdochium nivale					1)		1)
Gerste	Halmbruch			1)	1)			1)
	Echter Mehltau	vorbeugend						+
		stoppend/heilend		+		+	+	
	Zwergrost			+	+			
	Blattfleckenkrankheit (Rhynchosporium)	vorbeugend		+				
		stoppend/heilend		+	+			
	Netzfleckenkrankheit	vorbeugend		+	+			
		stoppend/heilend		+	+			
	Sprenkelkrankheit (Ramularia)				2)	2)		2)

vorbeugende Wirkung
heilend
schwach wirksam
gut wirksam
sehr gut wirksam

1) Es liegt keine Zulassung für diese Zusatzwirkung vor, daher darf das Mittel nicht gezielt dafür eingesetzt werden 2) + 1,5 l Multivo 3) Einsatz im BBCH 30 - 32
4) Einsatz im BBCH 25 - 32 * bei moderatem Krankheitsdruck.

MULTIVO

Das günstige Folpet-Mittel gegen Ramularia

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 4225-901
Gewässerabstand:
5/5/1/1 m
Packungsgröße:
5 l Kanister
Wirkstoff: Folpet 500 g/l
HRAC-Gruppen: M4

EINZIGARTIG, DA:

- **Bester Wirkstoff gegen Ramularia in Gerste zur Befallsminderung**
- **Günstiger Ramulariapartner vom Fahnenblatt bis zur Ähre**
- **Resistenzbrecher bei Septoria Tritici im Weizen**

ANWENDUNG:

1,5 l Multivo +
Systemisches Fungizid
0,8 l Siltra Xpro/ha
oder **1-1,25 l Input Xpro/ha**

EMPFEHLUNGEN GETREIDEFUNGIZIDE

FUNGIZIDE – STRATEGIE „INTENSIV“

Gerste		0,6 l Verben		1,5 l Multivo + 0,8 l Siltra Xpro oder + 1,25 l Input Xpro	
Weizen Roggen Triticale	oder	0,6 l Verben 1 l Pronto Plus		1,5 - 2 l Univoq 1,5 l Univoq	0,8 l Siltra Xpro 0,8 l Verben
Roggen Triticale		1 l Pronto Plus		1,5 l Univoq 1,25 Input Xpro	0,8 l Siltra Xpro

FUNGIZIDE – OSTÖSTERREICH

Gerste		0,75 l Verben 1 – 1,25 l Input Xpro	
Weizen Roggen Triticale		1,5 l Univoq 1 l Input Xpro	
Vorlage	1 l Pronto Plus 0,5 l Verben		

FUNGIZIDE – DURUM

Top-Lösung	0,5 l Verben		1,5 l Univoq
Alternativ	1 l Pronto Plus		0,75 l Verben



BBCH 21 25 29 30 31 32 37 39 45 51 59 65

UNIVOQ

Hochwirksames Getreidefungizid aus neuer Wirkstoffgruppe

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 4340

Gewässerabstand:
-/-/10/10 m

Packungsgröße:
5 l Kanister

Wirkstoffe:
50 g/l Fenpicoxamid
(= Inatreq active)
100 g/l Prothioconazol

FRAC-Gruppen:
21, 03

EINZIGARTIG, DA:

- **Einzigartiger Wirkmechanismus – Inatreq active + Prothioconazol**
- **Robuste Wirkung gegen alle relevanten Getreidekrankheiten**
- **Resistenzbrecher, besonders bei Septoria tritici**
- **Flexible Anwendung durch die i-Q4 Formulierung**

ZUGELASSEN IN:

- Weizen
- Roggen
- Triticale
- Dinkel
- **Art. 53 Zulassung in Rübe gegen Cercospora beantragt**

ANWENDUNG:

von BBCH 30 bis 69 ab dem Auftreten der Krankheiten, mit 150 - 300 l Wasser.

Zugelassen und empfohlen bei starkem Befallsdruck und frühen Soloanwendungen
2 l Univoq/ha

Standardaufwandmenge in den meisten Situationen und bei Spritzfolgen
1,5 l Univoq/ha



VERBEN

Das Universalfungizid mit Boosting-Effekt

EINZIGARTIG, DA:

- **Breit wirksam in Weizen, Gerste, Triticale und Roggen**
- **Besondere Stärke im frühen Bereich gegen Halmbruch und Mehltau**
- **Hohe Wirkstoffaufladung mit Prothioconazol**
- **Auch gegen Fusariosen zugelassen (bis BBCH 65)**

ZUGELASSEN IN:

- Weizen
- Gerste
- Roggen
- Triticale

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 4329

Gewässerabstand:
5/5/5/5 m

Packungsgrößen:
5 l Kanister

Wirkstoffe:
50 g Proquinazid/l
200 g Prothioconazol/l

FRAC-Gruppen:
13, 03

ANWENDUNG:

Mit 150 - 400 l Wasser/ha anwenden.
Halmbruch 0,8 - 1 l im BBCH 30-32
früher Mehltau - Ausräumbehandlung 0,5 l im BBCH 32 - 37

0,5 – 0,8 l Verben/ha
Als Vorlage bis Schossbeginn in Spritzfolgen

oder

0,75 - 1 l Verben/ha
Bei Soloanwendungen im Fahnenblattstadium gegen Braunrost und Fusariosen bis BBCH 65.



EIGENSCHAFTEN:

Verben ist in Weizen und Triticale gegen Mehltau, Roste, Septoria und DTR vom Stadium 25 bis Mitte Blüte zugelassen, gegen Halmbruch bis Schossbeginn. Fusarienzulassung bis BBCH 65 gegeben. Auch in der Gerste werden alle wichtigen Krankheiten abgedeckt, gegen Ramularia nur in Kombination mit Multivo. Roggen wird gegen Rhynchosporium bis BBCH 49 behandelt.

VERBEN IM VERGLEICH ZU STANDARDLÖSUNG

(Corteva Zulassungsversuche Weizen, Gerste N = 9-37)



PRONTO PLUS

Das frühe Fungizid gegen Mehltau und Gelbrost

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 2628

Gewässerabstand:
-/20/15/15 m

Packungsgrößen:
5 l Kanister
15 l Kanister

Wirkstoffe:
Tebuconazol
Spiroxamine

FRAC-Gruppen:
03, 05

EINZIGARTIG, DA:

- **Fungizid mit dem Top Preis-Leistungs-Verhältnis**
- **Ideale Vorlage bei Doppelbehandlung im Trockengebiet**
- **Ausgezeichnete Wirkung gegen Mehltau und frühe Blattkrankheiten inklusive Gelbrost**
- **Günstige Lösung in der Blüte gegen Fusariosen**

ZUGELASSEN IN:

- Weizen
- Gerste
- Roggen
- Triticale

ANWENDUNG:

1 l Pronto Plus/ha
Standardaufwandmenge bei durchschnittlichem Krankheitsdruck in Mischung mit Herbiziden und Fabulis OD gegen frühe Blattkrankheiten, besonders Mehltau und Gelbrost.

1,25 - 1,5 l Pronto Plus/ha
Breitwirksame und günstige Lösung zur Abreifespritzung oder gegen Fusariosen in die Blüte im Trockengebiet.

EXPERTENTIPP:

Pronto Plus ist mit den beiden Wirkstoffen Spiroxamin und Tebuconazol in Sofort-und Dauerwirkung die stärkste Lösung im preisgünstigen Segment.

Früher Blattbereich - optimal mit Pronto Plus

Peter Rojacz, Pflanzenschutzberater:
Meine Empfehlung gegen Mehltau und Gelbrost ist Pronto Plus in Tankmischung mit dem innovativen Wachstumsregler, Fabulis OD.

NISSOVIN

Heilende und vorbeugende Wirkung gegen Echten Mehltau

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 3157-901

Gewässerabstand:
1 m

Packungsgrößen:
1 l Flasche
5 l Kanister

Wirkstoff:
Cyflufenamid

FRAC-Gruppe:
U6

EINZIGARTIG, DA:

- **Rasche Anfangswirkung**
- **Effiziente Verteilung in der Pflanze - lokalsystemisch, translaminar und über die Dampfphase auch in angrenzende Pflanzenteile**
- **Heilende Wirkung bis zum Sichtbarwerden der ersten Symptome**

ANWENDUNG:

0,2 l Nissovin/ha
Besonders effizient in Durumweizen und anfälligen Sommergerstensorten.

ZUGELASSEN IN:

- Weizen
- Gerste
- Roggen
- Triticale
- Hafer

MISCHBARKEIT:

Gut mischbar mit Broadway, Broadway Plus, Ariane C, Concert SX, Pixxaro EC und Express SX sowie mit dem Wachstumsregulator Fabulis OD. Nicht mischen mit Abbrennern wie Artus.

ANWENDUNGSZEITRAUM:

Bei Sichtbarwerden der ersten Symptome im Zuge der Herbizidanwendung (BBCH 25 - 32) oder bei stärkerem Auftreten von Echtem Mehltau.

MEHLTAU STRATEGIE 2026:

Frühe Behandlungen sind sinnvoll:
0,2 l Nissovin/ha: Spezialprodukt (mit Herbizidbehandlung)
1 l Pronto Plus/ha: In Spritzfolgen gegen Mehltau und frühe Blattkrankheiten
0,6 l Verben/ha für einen sauberen Start ohne Mehltau, Septoria, Rost, Ramularia
1 l Input Xpro/ha: Top-Lösung mit langer Dauerwirkung
Zum Kürzungstermin kombinierbar mit **1 l Fabulis OD/ha.**
3,5 l Thiopron/ha (flüssiger Schwefel) zur Kürzung

THIOPRON

Effektiver flüssiger Schwefel in vielen Kulturen

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 3997

Gewässerabstand:
1 m

Packungsgröße:
10 l Kanister

Wirkstoff:
Schwefel

FRAC-Code:
M02

IRAC-Code:
UN

EINZIGARTIG, DA:

- Zugelassenes Fungizid gegen Echten Mehltau (*Erysiphe graminis*) im Acker-, Gemüse-, Hopfen-, Obst- und Zierpflanzenbau.
- Top Formulierung als flüssiger, feinst vermahlener Schwefel mit großer wirkungsaktiver Oberfläche
- Enthält bereits Haftmittel für bessere Regenfestigkeit und längere Wirkungsdauer

ANWENDUNG:

2 bis 7,5 l Thiopron/ha je nach Kultur
gegen Echten Mehltau mit Nebenwirkung auf Milben

EXAKTVERSUCH FUNGIZIDEINSATZ IN WINTERGERSTE

LfL Institut für Pflanzenschutz Bayern 2022



Thiopron erhöhte den absoluten **Mehrertrag um 120 kg/ha**

SILTRA XPRO

Top gegen Krankheiten im Fahnenblatt und in der Ähre

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 3800

Gewässerabstand:
10 m GS

Packungsgröße:
5 l Kanister

Wirkstoffe:
Prothioconazol
Bixafen

FRAC-Gruppen:
03, 07

EINZIGARTIG, DA:

- Breite Zulassung inkl. Hafer und Dinkel
- Herausragend gegen Ährenfusariosen und Rostkrankheiten
- Hauptempfehlung in der Gerste kombiniert mit Multivo

ZULASSUNGS-ZEITRAUM:

• **Weizen, Dinkel, Triticale:**	Halmbruch	30-32
	Fusarium	61-69
	andere Krh.	31-65
• **Gerste:**	Ramularia	31-51
	andere Krh.	31-49
• **Roggen:**	zugel. Krh.	31-59
• **Hafer:**	zugel. Krh.	31-59

ANWENDUNG:

0,8 l Siltra Xpro/ha zur Fusarienbehandlung
0,8 l Siltra Xpro + 1,5 l Multivo/ha Gerstenkrankheiten inkl. Ramularia

WIRKUNGSWEISE:

Siltra Xpro passt perfekt in Spritzfolgen mit Verben oder Univoq zur Ähren- oder Blütenbehandlung. Die breite Zulassung in allen Getreidearten und relevanten Krankheiten machen das Produkt sehr flexibel in der Anwendung.

KWIZDA AGRO EXAKTVERSUCH

WW 2024 Ernsthofen



1: unbehandelt
2: 0,6 Verben T1, 1,5 Univoq T2
3: 0,6 Verben T1, 1,5 Univoq T2, 1,5 Mulitvo T2
4: 0,6 Verben T1, 1,25 Vglm. 1 T2
5: 0,6 Verben T1, 0,9 Vglm. 2 T2
6: 1,5 Univoq T2, 0,8 Siltra Xpro T3

JEDE ÜBERFAHRT MIT BLATTDÜNGER – ES LOHNT SICH!

WUXAL P-PROFI

Zur Ausbildung eines robusteren Wurzelsystems

ÜBERSICHT:

Packungsgrößen:
5 l Kanister
20 l Kanister
200 l Fass
600 l Fass

Nährstoffe:
70 g/l N
260 g/l P
70 g/l K

EINZIGARTIG, DA:

- Versorgt die Jungpflanze mit Phosphor
- Anregung des Wurzelwachstums und Bildung von Feinwurzeln
- Puffert den pH-Wert und homogenisiert die Spritzbrühe

ANWENDUNG:

2 l Wuxal P-Profi/ha
Gemeinsam mit der Herbizidbehandlung im Frühjahr zur Unterstützung der Wurzelbildung.

COMBI B PLUS

Blattdüngung mit Bor, Mangan und Molybdän für Winterungen

ÜBERSICHT:

Packungsgröße:
10 l Kanister

EINZIGARTIG, DA:

- Verbesserte Jugendentwicklung, verbesserte Winterhärte
- Nährstoffe entsprechen den spezifischen Ansprüchen im Raps und Getreide
- Sichert kritische Nährstoffversorgung unter widrigen Umwelt- und Bodenbedingungen

ANWENDUNG:

Ackerbau: 1,5 - 2 l/ha

NEU

WUXAL SICURE PLUS

Der NP- Blattdünger mit Spurenelementen und Silizium für eine erhöhte Stand- und Strukturfestigkeit.

EINZIGARTIG, DA:

WUXAL SiCure Plus ist ein neuartiger, siliziumhaltiger Blattdünger zur Stärkung Ihrer Pflanzen. Der Dünger wurde mit besonderem Fokus auf den Mikronährstoffbedarf des Getreides und Mais entwickelt, um gezielt die Zellwandstabilität und Widerstandskraft der Pflanzen zu unterstützen. Das enthaltene Silizium wird in pflanzenverfügbarer Form bereitgestellt und lagert sich in der Zellwand ein. Dadurch wird die mechanische Festigkeit der Halme erhöht, der Halmdurchmesser vergrößert und die Ligninbildung stimuliert. Diese strukturelle Verstärkung führt zu einer verbesserten Standfestigkeit und einer höheren Toleranz gegenüber Trockenstress und abiotischen Belastungen.
Durch die integrierte pH-Pufferung wird die Spritzbrühe stabilisiert, was die Nährstoffaufnahme über das Blatt verbessert und die Mischbarkeit mit Pflanzenschutzmitteln erhöht.

ANWENDUNG:

2 l/ha in Ackerkulturen, Gemüsebau, Wein- und Obstbau

DURCHSCHNITTLICHER ERTRAGSUNTERSCHIED

über 7 Standorte



ÜBERSICHT:

Gebinde:
10 l Kanister

Nährstoffe:
35,1 g/l N
52 g/l P
32,7 g/l S
6 g/l Cu
12,1 g/l Mn
0,6 g/l Zn
96,8 g/l Si

N-LEAF

Fixiert Luftstickstoff für die Kulturpflanzen

EINZIGARTIG, DA:

- **Fixiert atmosphärischen Stickstoff und macht diesen pflanzenverfügbar**
- **Unterstützt Wurzelbildung, Photosynthese und Nährstoffaufnahme**
- **Umweltfreundlich**
- **Stärkt die Vitalität und Widerstandsfähigkeit der Pflanzen**

ANWENDUNG:

N-LEAF 0,5 l/ha für viele Kulturen, darunter Getreide, Raps, Mais, Gemüse, Sonnenblume, Soja, Kartoffel.

ÜBERSICHT:

Packungsgröße:
1 l
5 l

Inhaltsstoffe:
10^9 UFC/ml
Methylobacterium und Arthrobacter

Lagertemperatur:
4-25 °C

Lagerung:
Luftgeschützt, lichtgeschützt, bei stabiler und mäßiger Temperatur lagern.

KORN-SPEED

Die richtigen Nährstoffe für das Frühjahr

ÜBERSICHT:

Packungsgröße:
5 l Kanister

Nährstoffe:
250 g/l Mn
100 g/l Cu
250 g/l Zn

EINZIGARTIG, DA:

- **Hoher Mangan- und Kupferbedarf des Getreides im Frühjahr wird gedeckt**
- **Förderung von Wachstum und Bestockung**
- **Hervorragende Pflanzenverträglichkeit**
- **Auch in Kombination mit einem Herbizid**

ANWENDUNG:

0,5 - 1 l Korn-Speed/ha
Gemeinsam mit der Herbizidbehandlung im Frühjahr zur Förderung des Wachstums

EXPERTENTIPP:

Generell ist Manganmangel vermehrt bei lockeren Böden sowie trockenen Bedingungen zu beobachten, da Mangan hier oxidiert wird. Guter Bodenschluss der Pflanzen, wie etwa in Fahrspuren, weisen aufgrund der besseren Verfügbarkeit von Mn meist eine dunklere Grünfärbung auf als der Rest. Ein guter Indikator für Manganmangel im restlichen Feld.

AZO-SPEED

Die Top-Blattdüngung mit Stickstoff, Magnesium und Schwefel

ÜBERSICHT:

Packungsgrößen:
20 l Kanister
für 1 - 4 ha

200 l Fass
für 10 - 40 ha

1.000 l Gittercontainer
für 50 - 200 ha

Nährstoffe:
300 g/l Stickstoff (N)
67 g/l Schwefel (SO_3)
33 g/l Magnesium (MgO)

EXPERTENTIPP:

AZO-SPEED kann, je nach Einsatztermin, mit Herbiziden, Fungiziden, Insektiziden und Wachstumsregulatoren kombiniert werden.

EINZIGARTIG, DA:

- **Hoch effizienter Stickstoff-Blattdünger**
- **Sehr gute Verträglichkeit auch in Mischungen mit Fungiziden**
- **Einfache Handhabung**
- **Verbesserte Stickstoffverwertung durch Magnesium und Schwefel**
- **Besonders bei Trockenheit empfiehlt sich die Versorgung über das Blatt**

EMPFOHLEN IN:

- Winterweizen
- Winterroggen
- Wintertriticale
- Winterdurum
- Wintergerste*
- Sommergerste*
- Sommerdurum
- Dinkel

* frühe Anwendung bis Fahnenblatt

ANWENDUNG:

5 - 10 l AZO-SPEED/ha
Bestockung bis Schossen zur Überbrückung von Stresssituationen

10 - 20 l AZO-SPEED/ha
Fahnenblatt bis Ende Ähreschieben zur Ertragsabsicherung

10 - 20 l AZO-SPEED/ha
Blüte bis Kornfüllung zur Qualitätsabsicherung

AZO-SPEED ist ein hocheffizienter, N-betonter Blattdünger mit Magnesium und Schwefel zur verbesserten Stickstoffverwertung in den Kulturpflanzen. Der Stickstoff liegt zu $\frac{1}{3}$ als langsam freigesetzter Formaldehydstickstoff, zu $\frac{2}{3}$ als rasch wirksamer Urea-Stickstoff vor. Biuretarm, daher treten keine Verbrennungen auf.

EXPERTENTIPP

Ideales Produkt bei **Mehltau, Rost** und **Septoria**

INPUT Xpro

Input im Blattbereich für mehr Output beim Ertrag

EINZIGARTIG, DA:

- **Systemischer Alleskönner mit dem Mehltau-Plus**
- **Längere Dauerwirkung und Blattgesundheit inkl. Septoria**
- **Gegen Gerstenkrankheiten inkl. Ramularia in Kombination mit Multivo**

ZUGELASSEN IN:

- Weizen
- Gerste
- Roggen
- Triticale

ANWENDUNG:

1 l Input Xpro/ha
Im Trockengebiet oder bei wenig anfälligen Sorten

1,25 l Input Xpro/ha
Bei hohem Infektionsdruck oder früher Anwendung

PRAXISTIPP:

In Gebieten mit Ramularia-auftreten empfehlen wir 1,25 l Input Xpro in Kombination mit 1,5 l Multivo.

WIRKUNGSWEISE:

Durch drei starke Wirkstoffe kombiniert Input Xpro breiteste Wirkung mit höchster Sicherheit und positiven physiologischen Effekten:

- Prothioconazol = modernstes und bestes Azol
- Bixafen = starkes Carboxamid mit enormer Dauerwirkung
- Spiroxamine = abstoppender Mehltauspezialist

Der Erfolg – gesunde Getreidebestände für höchste Erträge und Top-Qualitäten.

Vor allem in Ostösterreich treten Mehltau und Rost häufig gleichzeitig und früh auf. Input Xpro ist das perfekte Produkt für gesunde Bestände

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 3302

Gewässerabstand:
30/20/15/15 m

Packungsgrößen:
5 l Kanister
15 l Kanister

Wirkstoffe:
Spiroxamine
Bixafen
Prothioconazol

FRAC-Gruppen:
07, 03, 05

MAIS

WIRKUNGSSPEKTRUM MAISHERBIZIDE

Produkte	*Kwizda Mais Pack*	*Dragster (+Netzmittel Vivolt)*	*Dragster Mais Pack*	*Lontrel 720 SG + Gondor*	*Kwizda Dicamba*
HRAC-Gruppe	B (2), F2 (27) O	B, Neu:2	B (Neu:2), F2 (Neu:27), K3 (Neu:15)	O	O
Aufwandmenge/ha	1 l + 1 l + 0,4 l	135 g + 0,4 l	135 g + 0,4 l + 1 l + 1,25 l	165 g + 0,5 l	0,3-0,4 l
Anwendung	NA (3 - 5 Blattstadium)	NA (4 - 6 Blattstadium)	NA (3 - 6 Blattstadium)	NA	NA (2 - 5 Blattstadium)
Blatt- / Bodenwirkung					
Gewässerabstand (+Mischungspartner)	5/1/1/1 m	20 m	20 m	1 m	1 m
Ackerminze					
Ackerwinde					
Amarant					
Ambrosie, Beifußblättrige					
Ampfer					
Ausfall-Leguminosen					
Ausfallraps/-sonnenblume				2)	
Distelarten					
Ehrenpreisarten					
Franzosenkraut					
Gänsefuß/Melde					
Hederich/Senf					
Hirtentäschel					
Hohlzahnarten					
Huflattich					
Kamillearten					
Klettenlabkraut					
Knöterich, Ampferblättriger					
Knöterich, Vogel-					
Knöterich, Winden-					
Nachtschatten, Schwarzer					
Schönmalve					
Stechapfel					
Storchschnabel					
Taubnessel					
Vogelmiere					
Zweizahn					
Schadgräser					
Borstenhirse	4)	4)			
Finger-/Bluthirse	1)	1)	1)		
Hühnerhirse					
Rispenhirse					
Glattblättrige und Gabelästige Hirse	1)	1)	1)		
Flughafer/Ausfallgetreide					
Quecke	3)	3)	3)		

schwache Bodenwirkung | gute Bodenwirkung | schwache Blattwirkung | gute Blattwirkung

sehr gut wirksam | gut wirksam | schwach wirksam | nicht wirksam

Ergänzung durch 0,4 l Kwizda Dicamba

1) Anwendung bis zum 2-Blattstadium | 2) nur Sonnenblumen | 3) ab 4-Blattstadium | 4) bis zum 3 - 4 -Blattstadium

KWIZDA MAIS PACK

Blattaktiv, bärenstark

ÜBERSICHT:

Talismann
Pfl. Reg. Nr. 3767-0

Barracuda
Pfl. Reg. Nr. 3821-0

Mural
Pfl. Reg. Nr. 3776-0

Gewässerabstand:
5/1/1/1 m

Packungsgrößen:
5 l Talisman
+ 5 l Barracuda
+ 2 x 1 l Mural für 5 ha

2 l Talisman
+ 2 l Barracuda
+ 0,8 l Mural für 2 ha

Wirkstoffe:
Nicosulfuron
Mesotrione
Dicamba

HRAC-Gruppen:
B (2), F2 (27), O

EINZIGARTIG, DA:

- **Flüssige Formulierung**
- **Leistungsstark, alle Unkräuter, Hirsen und Nichthirsegräser inkl. Distel und Winde**
- **Für Wasserschongebiete geeignet**
- **Bei Bedarf flexibel mit Bodenpartner einsetzbar**
- **Günstiger Gewässerabstand**

HAUPTEMPFEHLUNGEN KWIZDA MAIS PACK:

Trockengebiet bei normaler Verunkrautung (blattbetont, ohne Bodenwirkung):
Kwizda Mais Pack → Anwendung ab dem 4-Blattstadium des Maises

Starker Hirsedruck und schwer zu bekämpfende Hirse-Arten mit Bodenwirkung:
Kwizda Mais Pack + 1 l Spectrum/ha
Kwizda Mais Pack + 2 l Successor 600 oder + 2 l Spectrum Gold oder + 2 l Successor TX
(TBZ-Verordnung beachten!)
Durch die Bodenwirkung sind auch später auflaufende Unkräuter und Ungräser nachhaltig erfasst.
→ Anwendung im 2 - 5-Blattstadium des Maises

Wasserschon- und -schutzgebiet und Teilnahme an Maßnahme „Vorbeugender Gewässerschutz“:
Kwizda Mais Pack + 1 l Spectrum/ha → Anwendung ab dem 2-Blattstadium des Maises

PRAXISTIPP:

Je früher appliziert wird, desto sinnvoller erscheint ein Ausbringen des Kwizda Mais Packs in Tankmischung mit einem bodenwirksamen Produkt **wie 1 l Spectrum.** Besonders unter Stress-bedingungen hat sich das Beimischen von **2 l Wuxal P-Profi/ha** bewährt.

Kwizda Mais Pack + 1 l Spectrum, 34 Tage nach Applikation

AKTION IM MAIS 2026

GRATIS

Beim Kauf von:
2 x Kwizda Maispack (5 ha) + 1 x 20 l Wuxal P Profi = 1 x 5 l Wuxal P Profi GRATIS
oder **2 x Omega Gold Pack (5 ha) + 20 l Wuxal P Profi = 1 x 5 l Wuxal P Profi GRATIS**
oder **2 x Dragster Mais Pack + 1 x 20 l Wuxal P Profi= 1 x 5 l Wuxal P Profi GRATIS**
Rechnungskopie bis 31.6.2026 per mail an: **kwizdamaispack@kwizda-agro.at**

NEU DRAGSTER MAIS PACK

Komplettlösung für den mittleren bis späten Nachauflauf

EINZIGARTIG, DA:

- **Starke Blattwirkung gegen alle relevanten Unkräuter, alle Hirsearten, Panicum-Hirsen (frühe Anwendung), Johnsongras, Weidelgräser und Nichthirsegräser (Quecke, Flughafer, Ausfallgetreide)**
- **Sehr gute Blattwirkung und gute Bodenwirkung**
- **Vier sich ergänzende Wirkstoffe**

ANWENDUNG:

135 g Dragster
+ 0,4 l Vivolt
+ 1 l Bozon
+ 1,25 l Quantum mit 250-300 l Wasser/ha

im 3 - 6 Blattstadium gegen alle relevanten Unkräuter und Ungräser in Mais.

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 4501-0/ 4529-0/2881-901

Gewässerabstand:
20 m

Packungsgröße:
540 g Dragster
+ 1,6 l Netzmittel Vivolt
+4 l Bozon
+5 l Quantum

Wirkstoffe:
Thifensulfuron
Rimsulfuron
Mesotrione
Pethoxamid

HRAC-Gruppen:
B (neu:2), F2 (neu:27), K3 (neu:15)

NEU DRAGSTER

In vielen Fällen eine ausreichende Herbizidlösung zur Unkrautkontrolle

EINZIGARTIG, DA:

- **Nicosulfuron-frei**
- **Als Zumischpartner für mehr Hirseleistung**
- **Anwendung vom 1 - 8-Blattstadium des Mais möglich**
- **Höchste Wirkstoffaufladung**

EMPFEHLUNG:

Dragster ab 4-Blatt bis spätestens 6-Blattstadium einsetzen, nachdem die Mehrheit der Unkräuter und Ungräser aufgelaufen sind.
135 g Dragster + 0,4 l Vivolt mit 250-300 l Wassser/ha

Splittinganwendung möglich: 2 x 67,5 g Dragster + 0,2 l Vivolt oder
85 g Dragster + 0,2 l Vivolt gefolgt von 50 g Dragster + 0,2 l Vivol. Abstand 7 Tage.

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 4501-0

Gewässerabstand:
20 m, 10 m bei Splitting

Packungsgröße:
540 g Dragster + 1,6 l Netzmittel Vivolt für 4 ha

Wirkstoffe:
Thifensulfuron
Rimsulfuron

HRAC-Gruppen:
B (neu:2)

LONTREL 720 SG

Effizient bis in die Wurzel

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 3409-0

Gewässerabstand:
1 m

Packungsgrößen:
165 g Dose
1 kg Dose

Wirkstoff:
Clopyralid

HRAC-Gruppe:
O

EINZIGARTIG, DA:

- **Die Lösung gegen Distel, Kamille und herbizidtolerante Sonnenblume**
- **Hochkonzentriertes wasserlösliches Granulat**
- **Weniger Verpackung**

WIRKUNGS-SPEKTRUM:

Distel, Huflattich, Kamille, Hundspetersilie, Kleearten werden sehr gut bekämpft.

ANWENDUNG:

165 g Lontrel 720 SG + 0,5 l Gondor/ha
Bei **wüchsigen Bedingungen** und entsprechender Blattmasse der Unkräuter anwenden. Für einen optimalen Bekämpfungserfolg sind Nachttemperaturen über 10 °C, 2 Tage lang nach der Anwendung erforderlich.

Nachhaltig gegen Distel, von der Zuckerrübe bis zum Mais!

KWIZDA DICAMBA

Gegen ausdauernde Unkräuter

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 3776-901

Gewässerabstand:
1 m

Packungsgrößen:
1 l Flasche
5 l Kanister

Wirkstoff:
Dicamba

HRAC-Gruppe:
O

Max. Anzahl Spritzungen:
1

EINZIGARTIG, DA:

- **Dicamba, unerlässlich gegen Winde und Distel**
- **Beste Löslichkeit**
- **Schnelle und starke Wirkung**

ANWENDUNG:

0,3 - 0,4 l Kwizda Dicamba/ha
in Tankmischung;
bei Soloeinsatz maximal 0,75 l kg/ha

PRAXISTIPP:

Eine gleichmäßige Benetzung, eine Luftfeuchtigkeit > 60 % sowie Temperaturen > 15 °C bis max. 25 °C während der Anwendung erhöhen die Wirkung. Winde-Arten sollten zum Zeitpunkt der Anwendung mindestens 15 - 20 cm lang sein.

EMPFEHLUNG:

Kwizda Dicamba ist mit Arigo, Omega Gold Pack und Titus sowie den meisten am Markt befindlichen Maisherbiziden sehr gut mischbar.

Auf Windenstandorten + 0,4 l Kwizda Dicamba/ha zur Tankmischung

BELEM 0,8 MG

Stopp für Maiswurzelbohrer und Drahtwurm

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 3553/0

Gewässerabstand:
10 m

Packungsgröße:
12 kg Sack

Wirkstoff:
Cypermethrin
(als Mikrogranulat)

IRAC-Gruppe:
3A

EINZIGARTIG, DA:

- **Wirksam und zugelassen gegen Maiswurzelbohrer und Drahtwurm**
- **Wichtiges Produkt gegen die Larven in umfassender Diabrotica-Strategie**
- **Drahtwurm-Zulassung in Mais, Zuckermais, Sonnenblume, Hirse und Kartoffel**

EXPERTENTIPP

Richtige Montage der Diffusoren ist entscheidend!

ANWENDUNG:

Je nach Kultur und Schädlingsdruck, 12 kg woder bei hohem Druck 24 kg Belem 0,8 MG/ha
Gleichmäßig, mit richtig montierten Diffusoren, während der Aussaat in der Säfurche verteilen. Schützt den behandelten Wurzelbereich gegen Diabrotica-Larven und Drahtwurm.

WIRKUNGSWEISE:

- Belem 0,8 MG wirkt nur über Kontakt mit den Larven, bildet einen „Insektizid-Hof“ im Wurzelbereich. Die speziell für Belem 0,8 MG entwickelten Diffusoren müssen richtig montiert werden.
- Empfohlene Fahrgeschwindigkeit 6 km/h (max. 8 km/h) nicht überschreiten.
- Gegen Drahtwurm ist mit Belem 0,8 MG eine gute Wirkung erzielbar, wenn die Empfehlungen eingehalten werden. Bei starkem Druck kann trotz Einsatz von 12 kg Belem 0,8 MG/ha nicht mit einer vollen Wirkung gerechnet werden.

PICADOR 1,6 MG

Geringere Aufwandmenge - stärkere Sofort- und längere Dauerwirkung

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 4109-0

Gewässerabstand:
1 m

Packungsgröße:
12 kg Sack

Wirkstoff:
Cypermethrin
(als Mikrogranulat)

IRAC-Gruppe:
3A

EINZIGARTIG, DA:

- **Doppelt konzentriert, niedriger Preis**
- **Dadurch noch mehr Sicherheit**
- **Gegen Drahtwurm in Kartoffel und Sorghumhirse**
- **Gegen Diabrotica in Mais**

Gerhard Panagl, Unterstützung bei technischen Fragen zu Belem oder Picador:
0664 823 8390
g.panagl@kwizda-agro.at

Im Vergleich zur unbehandelten Kontrolle (oben), ist durch den Einsatz von Belem oder Picador eine Wurzelbildung (unten) möglich.

MOSPILAN 20 SG

Noch wirksamer gegen Diabrotica-Käfer

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 2830-0

Gewässerabstand:
10 m
Keine Anwendung auf abtragsgefährdeten Flächen

Packungsgrößen:
500 g Dose
3 kg Packung

Wirkstoff:
Acetamiprid

IRAC-Gruppe:
4A

EINZIGARTIG, DA:

- Verstärkt durch Aktivator Designer
- Kontakt-, systemische und translaminare Wirkung
- Längere Wirkungsdauer durch höher zugelassene Aufwandmenge
- Kann gemeinsam mit Prosaro von Anfang bis Ende Blüte ausgebracht werden.

DAS EINZIG ZUGELASSENE INSEKTIZID GEGEN DIABROTICA KÄFER

ANWENDUNG:

Designer®

250 g Mospilan 20 SG + zugelassenes Pyrethroid + 0,15 l Designer/ha

Gegen Maiswurzelbohrer von Beginn bis Ende der Maisblüte, bei Käferauftreten, zum Schutz vor Narbenfraß und zur Populationskontrolle einsetzen. Ausbringung in der Regel mit luftunterstützten Düsen mit Stelzengeräten zu Blühbeginn.

SHENZI

Das stärkste Insektizid gegen Maiszünsler

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 2984-903

Gewässerabstand:
1 m

Packungsgröße:
1 l Flasche

Wirkstoff:
Chloranthraniliprole

IRAC-Gruppe:
28

EINZIGARTIG, DA:

- Eigene Wirkstoffgruppe
- Keine Resistenzgefahr
- Superlative in Wirkung und Wirkungsdauer
- Erfasst alle Stadien
- In Mais und Zuckermais

Maispflanzen knicken am Einbohrloch der Maiszünslerlarven um

ANWENDUNG:

Anwendung in Mais und Zuckermais gegen Maiszünsler:

Max. 1 x/Saison mit 0,125 l/ha
von Beginn Rispenschieben bis sortentypische Korngröße erreicht.

Aufgrund der Persistenz von Shenzi wird der Maiszünsler auch bei verzettelter Eiablage erfasst.

Kwizda Xperience

Bessere Daten, bessere Ernte.

Relevante Daten. Richtiges Timing. **Dein Erfolg.**

KX verbindet die langjährige Erfahrung von Kwizda Agro im Pflanzenschutz mit modernen digitalen Tools und Services.

- **KX Planner** – Maßgeschneiderte Pflanzenschutzstrategien mit individuellen Spritzplänen.
- **KX Vine** – Lokale Informationen zu Infektionsrisiken und Spritzwetter in Deinem Weingarten.
- **KX Field** – Kombiniert Krankheitsprognose mit optimalem Anwendungszeitpunkt – für Dein Feld.
- **KX Rain** – Aktuelle und historische Regenmengen je Tag/Monat/Jahr, inklusive Niederschlagsvergleich.

Jetzt registrieren und profitieren:

www.kwizda-agro.at/kx

Kwizda Agro

PANNON STARTER MEGA

NEU

Starterdünger für Vorsprung in der Jugendentwicklung

ÜBERSICHT:

Nährstoffe:
110 g/kg N
490 g/kg P
15 g/kg Fe
17 g/kg Zn

Packungsgröße:
20 kg Sack

EINZIGARTIG, DA:

- **Verbesserte und schnellere Wasser- und Nährstoffaufnahme**
- **Optimale Wurzel- und Kulturentwicklung**
- **Phosphor genau dort, wo er am meisten benötigt wird**
- **Ausgezeichnete Pflanzenverfügbarkeit durch „Slow release“**
- **Höhere Erträge und verbesserte Qualität**

ZUGELASSEN IN:

allen Kulturen - speziell für Mais , Zuckerrübe, Sonnenblume, Kürbis und Kartoffel.

ANWENDUNG:

15 kg Pannon Starter Mega/ha
wird bei der Aussaat in die Saatfurche ausgebracht

STARTER-EFFEKT DURCH PANNON STARTER MEGA:

Erhöhte Wurzelbiomasse - mehr feine Seitenwurzeln
erhöhte Biomasse - mehr Blätter, besseres Längenwachstum

EXPERTENTIPP:

Vorteil: die Nähe des kaum mobilen Phosphors zu den jungen Wurzeln. Es kommt zu einer problemlosen Umstellung von der Ernährung aus dem Saatkorn auf die Ernährung über die Wurzeln.
Das enthaltene Eisen unterstützt die Chlorophyllbildung und den Energiestoffwechsel, wodurch die Photosyntheseleistung und Jugendentwicklung gesteigert werden.

WUXAL P-PROFI

Fördert die Wurzelentwicklung im Mais

ÜBERSICHT:

Packungsgrößen:
5 l Kanister
20 l Kanister
200 l Fass
600 l Fass

Nährstoffe:
70 g/l N
260 g/l P
70 g/l K

EINZIGARTIG, DA:

- **Versorgt die gestresste Jungpflanze mit Phosphor**
- **Puffert den pH-Wert und homogenisiert die Spritzbrühe**
- **Positive Effekte auf Wirkungssicherheit der Maisherbizide**

ANWENDUNG:

2 l Wuxal P-Profi/ha gemeinsam mit dem Herbizid ausbringen

4 l Wuxal P-Profi + 5 l Azo-Speed vitalisiert gestresste Bestände

EXPERTENTIPP:

Phosphor ist im Boden kaum mobil. Staunässe, Kälte und verdichtete Böden behindern die Phosphataufnahme über den Boden. Gerade im Frühjahr ist der Einsatz von Wuxal P Profi wichtig für eine gute Versorgung.

NEU

WUXAL ASCOFOL SICURE

Der Allrounder zur Stärkung der Pflanzengesundheit unter biotischem und abiotischem Stress

EINZIGARTIG, DA:

- **Innovative SiCure Technologie: Kombination aus bioverfügbarem Silizium und hochwertigem Algenextrakt für maximale Pflanzenvitalität.**
- **Synergistische Wirkung: Stärkt Stressresistenz gegenüber Trockenheit, Hitze und Frost durch aktivierte pflanzliche Schutzmechanismen.**
- **Gezielte Mikronährstoffversorgung: Fördert Zellteilung, Fruchtgröße und Schalenqualität durch optimierte Photosynthese und Nährstoffeffizienz.**

WUXAL Ascofol SiCure kombiniert natürliche Algenextrakte aus der Braunalge Ascophyllum nodosum mit Mikronährstoffen und einer einzigartigen Siliziumquelle, die vollständig wasserlöslich und optimal verfügbar ist. Die Kombination aus Algenextrakt und Silizium erhöht die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen und unterstützt ihre Fähigkeit, biotischem Stress wie Pilzkrankheiten und abiotischen Herausforderungen wie Trockenheit, Hitze oder Frost standzuhalten.

ÜBERSICHT:

Gebinde:
10 l Kanister
25 l Kanister

Inhaltsstoffe:
6,5 % Kalium
3 % Bor
0,8 % Mangan
0,5 % Zink
3 % organischer Kohlenstoff
5% Silizium

AZO-SPEED

Die Top-Blattdüngung mit Stickstoff, Magnesium und Schwefel

ÜBERSICHT:

Packungsgrößen:
20 l Kanister für 1 - 4 ha
200 l Fass für 10 - 40 ha
1.000 l Gittercontainer für 50 - 200 ha

Nährstoffe:
300 g/l Stickstoff (N)
67 g/l Schwefel (SO_3)
33 g/l Magnesium (MgO)

EINZIGARTIG, DA:

- **Hohe Effizienz durch Blattapplikation**
- **N-betonter Blattdünger mit Magnesium und Schwefel zur verbesserten Stickstoffverwertung**
- **Hervorragend mischbar**
- **2/3 Urea-Stickstoff (schnell verfügbar) + 1/3 Formaldehydstickstoff (langsame Freisetzung)**

ANWENDUNG:

5 - 10 l AZO-SPEED/ha
ab dem 3-Blattstadium oder bei Stresssituationen

2 l Wuxal Boron Plus + 5 l AZO-SPEED/ha
Power-Mix speziell für den Mais zur besseren Befruchtung, Kolbenausbildung, Jugendentwicklung im 6 - 10-Blattstadium anwenden.

4 l AZO-SPEED + 4 l Wuxal P-Profi + 2 l Wuxal Boron Plus/ha
Speziell für die Anwendung im Saatmais

KORN-SPEED

Der richtige Nährstoffmix für ein optimales Wachstum

ÜBERSICHT:

Packungsgröße:
5 l Kanister

Nährstoffe:
250 g/l Zink
250 g/l Mangan
100 g/l Kupfer

EINZIGARTIG, DA:

- **Hoher Gehalt an Mikronährstoffen**
- **Gute Zinkversorgung im Mais**
- **Förderung des Kohlenhydrat-Stoffwechsels**
- **Beugt Mangelsymptomen vor**

EXPERTENTIPP:

Mais weist einen hohen Zinkbedarf auf. Bei akutem Zinkmangel im Mais kommt es zu Wachstumshemmung. Erkennbar ist Zinkmangel an chlorotischen Streifen parallel zur Blattachse.

ANWENDUNG:

0,5 - 1 l Korn-Speed/ha
zur Herbizidspritzung für eine optimale Versorgung mit Zink

ZUCKERRÜBE

WIRKUNGSSPEKTRUM ZUCKERRÜBENHERBIZIDE

Produkte	*Betanal Tandem*	*Tanaris*	*Metafol SC*	*Lontrel 720 SG + Gondor*	*Venzar*
HRAC-Gruppe	5 (C1), 15 (N)	15 (K3), 4 (O)	5 (C1)	4 (O)	5 (C1)
Aufwandmenge/ha	1,25 - 1,5 l	2. und 3. NAK je 0,5 l	1 - 2 l	165 g + 0,5 l	100 ml 1. NAK 150 ml 2.+3. NAK
Blatt-/Bodenwirkung					
Gewässerabstand	1 m	1 m	1 m	1 m	5/1/1/1
Ackersenf/Hederich					
Ackerwinde					
Amarant					
Ambrosia					
Ausfallraps					
tolerante Sonnenblume					
Ausfallsonnenblume					
Bingelkraut			*		
Distel					
Ehrenpreis					
Erdrauch			*		
Franzosenkraut					
Gänsefuß, Weißer					
Hellerkraut					
Hirtentäschel					
Hohlzahn, Gemeiner					
Hundspetersilie					
Kamillearten					
Klatschmohn					
Klettenlabkraut	2)		*		
Knöterich, Ampferblättr.					
Knöterich, Vogel-					
Knöterich, Winden-					
Kreuzkraut, Gemeines					
Melde, Gemeine	+				
Nachtschatten, Schwarzer					
Platterbse					
Schönmalve					
Stechapfel					
Stiefmütterchen, Acker-					
Taubnessel					
Vogelmiere					
Hirsearten					
Ausfallgetreide					
Flughafer					
Fuchsschwanzgras, Acker-					
Quecke	1)	1)	1)	1)	1)

nicht wirksam

schwach wirksam

gut wirksam

sehr gut wirksam

gute Bodenwirkung

schwache Bodenwirkung

gute Blattwirkung

schwache Blattwirkung

1) 2,5 l Centurion Plus oder 2,25 l Panarex

2) im Keimblatt bis beg. 1 Quirlstadium

+ 80 g Lontrel 720 SG + 0,5 l Gondor ab 2. NAK

zwischen 2 NAK´s 1 l Centurion Plus oder 0,8 - 1 l Panarex/ha

HERBIZID-STRATEGIE IN ZUCKERRÜBE

	1. NAK	2. NAK und 3. NAK
Basislösung inkl. Bodenpartner und Aktivator	1,25 l Betanal Tandem + 1 l Metafol SC + 0,5 l Gondor	1,5 l Betanal Tandem + 1,5 l Metafol SC + 0,5 l Gondor
Verstärkung bei Gänsefuß, Kamille, Raps, Knöterich, Bingelkraut	+ 100 ml Venzar	+ 150 ml Venzar
Große Unkräuter, späte NAK Absicherung gegen Amarant, Melden, Knöterich, Begrünungsreste	+ 0,5 l Betosip	+ 1 l Betosip
Blattdünger + Extrakick für Jugendentwicklung, Wirkung und Verträglichkeit	+ 2 l Wuxal P-Profi	+ 2 l Wuxal P-Profi

Problemunkräuter
Ausfallsonnenblumen, Kamille, Kleearten, Ambrosia, Hundspetersilie

Spätkeimer
Amarant, Hirsen, Hundspetersilie

+ 80 g Lontrel 720G

oder

+ 0,5 l Tanaris

Rinpode Art. 53 Antrag
Gegen Schönmalve, resistenten Gänsefuß, Amarant und andere Unkräuter wurde ein Art. 53 Antrag für Rinpode gestellt.

Betanal Tandem + Metafol SC + Gondor breit wirksame Basis im NAK-System	**Venzar** verstärkt die Wirkung gegen viele Unkräuter	**Wuxal P-Profi** fördert die Jugendentwicklung und Herbizidwirkung	**Tanaris** bei Spätverunkrautung in der 2. + 3. NAK zugesetzt	**Lontrel 720 SG** Distel, Kamille, Ambrosia u.a.

DISTEL- UND GRÄSERBEKÄMPFUNG IN ZUCKERRÜBEN:

- **165 g Lontrel 720 SG + 0,5 l Gondor/ha** gegen Disteln
- **1 l Centurion Plus** oder **1l Panarex/ha** gegen Schadgräser

Zwischen 2 NAKs anwenden (Abstand ≥ 5 Tage) - Kombination beider Maßnahmen möglich.

BETANAL TANDEM

Der Standard im NAK-Programm

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 3677

Gewässerabstand:
1 m

Packungsgröße:
5 l Kanister

Wirkstoffe:
Phenmedipham
Ethofumesate

HRAC-Gruppen:
5 (C1), 15 (N)

EINZIGARTIG, DA:

- **Die breit wirksame Basislösung gegen Unkräuter im NAK System**
- **Unkrautbekämpfung mit anderem Wirkmechanismus verhindert Resistenzbildung**
- **Perfekt in Kombination mit Metafol SC, Gondor und Venzar**
- **Unabhängig von der Wachsschicht und Sonneneinstrahlung**

ANWENDUNG:

1,25 l Betanal Tandem/ha
Als Basisherbizid in der 1. NAK (abhängig von Unkrautgröße bis 1,5 l Betanal Tandem) in Kombination mit Metafol SC und 0,5 l Gondor/ha

1,25 - 1,5 l Betanal Tandem/ha
Als Basisherbizid mit Metafol SC, Gondor in der 2. und 3. NAK kombinierbar mit 0,5 l Tanaris oder ab dem 4 Blattstadium der Rübe mit 80 g Lontrel 720SG gegen Problemunkräuter

EXPERTENTIPP:

Günther Fischelmaier: Die Herbizidstrategie mit 3 NAKs hält Ihre Rübenbestände sicher sauber. Bei verspäteter Anwendung und größeren Unkräutern hilft die Zugabe des verträglichen Betosip. 0,5 l bei der 1. NAK bzw. 1 l bei der 2. und 3. NAK. Außerdem sollten immer 2 l Wuxal P Profi dazugemischt werden.

WINDENKNÖTERICH BEKÄMPFUNG - STRATEGIE 2026

Sicher gegen Windenknöterich
Ziel = Bekämpfung im Keimblatt mit
1,25 l Betanal Tandem + 1 l Metafol SC + 100 ml Venzar 500 SC + 0,5 l Gondor
Bei guter Verträglichkeit und entsprechender Wachsschicht ist der Zusatz von **0,5 - 1 l EMU 11E Öl** möglich und sinnvoll.

Besonders bei größerem Windenknöterich bis zum Herzblattstadium ist der Ölzusatz wichtig.
Bekämpfen Sie den Windenknöterich rechtzeitig und vermeiden Sie das Auftreten größerer Pflanzen.

Problemunkräuter Landwasserknöterich und Schönmalve:
0,1 l /ha Centium CS jeweils bei der 2. und 3. NAK zugeben (Rüben mit mind. 2 Laubblättern); ev. auftretenden Aufhellung der Zuckerrüben wachsen sich ohne Einfluss auf den Ertrag aus.

VENZAR 500 SC

Verstärkt den Wirkungsgrad der Spritzfolge

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 3682

Gewässerabstand:
5/1/1/1 m

Packungsgrößen:
1 l Flasche
5 l Kanister

Wirkstoff:
Lenacil

HRAC-Gruppe:
5 (C1)

EINZIGARTIG, DA:

- **Bodenwirkstoff und Aktivator in einem**
- **Wirkungsverstärker bei Knöterich, Raps, Melde, Bingelkraut, Vogelmiere**
- **Nachhaltiger Effekt durch Bodenwirkung**



ANWENDUNG:

100 ml Venzar in 1. NAK
150 ml Venzar in 2. NAK
150 ml Venzar in 3. NAK

METAFOL SC

Metamitron gegen Spätverunkrautung

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 3573

Gewässerabstand:
1 m

Packungsgröße:
5 l Kanister

Wirkstoff:
Metamitron

HRAC-Gruppe:
5 (C1)

EINZIGARTIG, DA:

- **Lange Bodenwirkung gegen Spätverunkrautung**
- **Zusätzlich hervorragende Blattwirkung**
- **Feinstvermahlener Wirkstoff (700 g/l Metamitron) für beste Wirksamkeit**

ANWENDUNG:

1 - 2 l l Metafol SC/ha
als Bodenpartner bei den NAKs

EXPERTENTIPP:

Zumischung bei allen NAKs. Metafol SC ist das Rübenherbizid in jeder Spritzfolge, wenn Spätverunkrautung unerwünscht ist. Es erweitert und verstärkt die Wirkung reiner Blattherbizide durch seine Bodenwirkung und erfasst auch spätkeimende Unkräuter.

CENTIUM CS

Problemlöser mit Power

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 2733

Gewässerabstand:
1 m

Packungsgröße:
0,5 l Flasche

Wirkstoff:
Clomazone

HRAC-Gruppe:
13 (F4)

ANWENDUNG:

2 x 0,1 l Centium CS/ha
als Tankmischpartner bei der 2. und 3. NAK gegen Problemunkräuter wie Landwasser-Knöterich, Schönmalve und andere.

Vorübergehende Blattaufhellungen bei der Zuckerrübe, die sich wieder auswachsen sind möglich.

RINPODE

Art. 53 Antrag gegen Schönmalve gestellt

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. Zulassung 2026 erwartet, daher Art. 53 Antrag gestellt

Packungsgröße:
0,25 l Flasche

Wirkstoff:
Florpyrauxifen-benzyl
(Tradename Rinskor)

HRAC-Gruppe:
4

ANWENDUNG:

3 x 26 ml Rinpode/ha
als Tankmischpartner bei allen 3 NAKs gegen Problemunkräuter, Schönmalve, resistenten Gänsefuß, Amarant und andere.

TANARIS

Der Alleskönner gegen Spätverunkrautung

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 3697

Gewässerabstand:
5/1/1/1 m

Packungsgröße:
5 l Kanister

Wirkstoffe:
Quinmerac
Dimethenamid-p

HRAC-Gruppen:
15 (K3) 4 (O)

EINZIGARTIG, DA:

- **Flexibler Mischungspartner zu Standardherbiziden**
- **Wirkungsergänzung gegen Hundspetersilie, Ausfallsonnenblumen, Klettenlabkraut, Kamille**
- **Aktivierung von Mischpartnern durch ölige Formulierung**
- **Nachhaltige Bodenwirkung gegen Spätverunkrautung (Amarant, Hirsen)**

ZUGELASSEN IN:

- Zuckerrübe
- Futterrübe
- Winterraps

ANWENDUNG:

Tanaris im NAK System:
2. NAK 0,5 l/ha
3. NAK 0,5 l/ha

Anwendung in Tankmischung mit
Betanal Tandem + Metafol SC + Gondor.

WIRKUNGSWEISE:

Der Einsatz von Tanaris in der Rübe bringt vor allem auf Flächen mit Problemunkräutern (Hundspetersilie, tolerante Ausfallsonnenblumen) oder mit Spätverunkrautung (Hirsen, Amarant) Vorteile. Es wird über Wurzeln, Hypokotyl, Keim- und Laubblätter der Unkräuter und Hirsen aufgenommen und erfasst daher am besten die frühen Entwicklungsstadien. Besonders gute Wirkung bei ausreichender Bodenfeuchtigkeit.

EXPERTENTIPP:

Josef Schlagenhaufen:
Die Wirkstoffe Quinmerac und Dimethenamid sind in Tanaris als sehr aktive Suspensionsemulsion formuliert. Tanaris verstärkt auch andere Produkte in der Tankmischung. Als Aktivator das verträgliche Gondor (= Netzmittel und Öl) mit 0,5 l/ha einsetzen!

Nachhaltig saubere Rübenbestände

DIM-Wirkstoff

CENTURION PLUS

Macht mit Ungräsern Schluss

EINZIGARTIG, DA:

- **Fertigformulierung des Wirkstoffs Clethodim + Öl**
- **Einfache und günstige Anwendung**
- **Einziger Wirkstoff gegen Einjährige Rispe und Raygräser**
- **Ideales Resistenzmanagement dank DIM-Wirkstoff**

ZUGELASSEN IN:

- Zucker- und Futterrübe
- Kartoffel
- Raps
- Zwiebel
- Karotte
- Mohn
- Kümmel
- Erdbeere
- einigen Gemüsekulturen
- vielen Zierpflanzen

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 4254

Gewässerabstand:
1 m

Packungsgröße:
5 l Kanister

Wirkstoff:
Clethodim

HRAC-Gruppe:
1 (A)

ANWENDUNG:

1 l Centurion Plus/ha
gegen einjährige Ungräser

2,5 l Centurion Plus/ha
gegen **Quecke** (bei 15 - 20 cm)

EXPERTENTIPP:

Mischung Lontrel 720 SG + 1 l Centurion Plus zwischen 2 NAKs gegen Ungräser und Distel in einer Überfahrt möglich.

Centurion Plus ist das hochwirksame Gräsermittel mit dem Wirkstoff Clethodim in aktiver EC-Fertig-formulierung. Es braucht keinen weiteren Ölzusatz. Mit dem DIM-Wirkstoff erfasst Centurion alle wichtigen Ungräser, auch solche, bei denen FOP Produkte nicht mehr wirken. Centurion Plus ist perfekt für das Resistenzmanagement, auch gegen Ackerfuchsschwanzgras und Weidelgräser.

Beste Beratung und saubere Rüben auch bei Gräser- und Distelproblemen

LONTREL 720 SG

Effizient bis in die Wurzel

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 3409

Gewässerabstand:
1 m

Packungsgrößen:
165 g Dose
1 kg Dose

Wirkstoff:
Clopyralid

HRAC-Gruppe:
4 (O)

EINZIGARTIG, DA:

- **Die Lösung gegen Distel und herbizidtolerante Sonnenblume**
- **Hochkonzentriertes wasserlösliches Granulat**
- **Weniger Verpackung**

ZUGELASSEN IN:

- Zuckerrübe
- Zwiebel

ANWENDUNG:

Zwischen 2 NAK's:
165 g Lontrel 720 SG + 0,5 l Gondor/ha
Splitting in Tankmischung mit Betanalen:
80 g Lontrel 720 SG/ha gegen Ausfallsonnenblume und andere Problemunkräuter

Bei wüchsigen Bedingungen und entsprechender Blattmasse der Unkräuter ab dem 4-Blattstadium der Rübe anwenden. Für einen optimalen Bekämpfungserfolg sind Nachttemperaturen über 10 °C, 2 Tage lang nach der Anwendung erforderlich.

WIRKUNGSSPEKTRUM:

Distel, Huflattich, Ausfallsonnenblume (inkl. herbizidtolerante Sorten), Kamille, Hundspetersilie, Kleearten, Knollenplatterbse, Ambrosie

Hohe Wirkstoffkonzentration

- Weniger Verpackung – mehr Platz im Pflanzenschutzlager
- Sichere und starke Wirkung bis in die Wurzel
- Sehr gut verträglich und mischbar

PANAREX

Hohe Sicherheit zum günstigen Preis

FOP-Wirkstoff

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 3201

Gewässerabstand:
1 m

Packungsgröße:
5 l Kanister

Wirkstoff:
Quizalofop-P-tefuryl

HRAC-Gruppe:
1 (A)

EINZIGARTIG, DA:

- **Flüssigformulierung enthält bereits Netzmittel**
- **Sicher gegen Ausfallgetreide und Ungräser**
- **Rasche Wirkung**
- **Idealer Mischungspartner mit Spectrum**

ANWENDUNG:

1 l Panarex/ha
Gegen Ausfallgetreide und einjährige Ungräser (ausgenommen Einjährige Rispe)

2,25 l Panarex/ha
Gegen Quecke

Das blattaktive Panarex wird zwischen 2 NAKs nach dem Auflaufen der Schadgräser mit 200 bis 400 l Wasser/ha gespritzt. Der Wirkstoff wird systemisch verteilt und stoppt sofort die Pflanzenentwicklung.

GRÄSERBEKÄMPFUNG MIT SYSTEM:

- Abwechslung von Gräserherbiziden mit den Wirkstoffen-FOP (Panarex) und -DIM (Centurion Plus)
- Ideal zum Einbau ins Resistenzmanagement, v.a. gegen Ackerfuchsschwanz (beginnend auch bei Windhalm, Flughafer, Weidelgräsern)
- Sichere Wirkung gegen alle Gräser

PRAXISTIPP:

1 l Panarex + 0,6 l Spectrum/ha
zwischen 2 NAKs angewendet erfasst aufgelaufene Schadgräser und verhindert Nachauflauf.

CERCOSPORA-STRATEGIE 2026



* Art.53 Antrag gestellt

ALLE MÖGLICHKEITEN NUTZEN!

- Rechtzeitiger Spritzstart (Agrana-Warnmeldung per SMS geschickt)
- Besonderes Augenmerk auf Sortenanfälligkeit
- Infektionssituation (Staulage, neben vorjährigem Rübenfeld, Bewässerungsrohre, usw.)
- Cercospora-Spritzungen in den Morgenstunden mit guter Spritztechnik durchführen
- Zusatz von je 1,5 l Cuprofor flow/ha bei jeder Cercospora-Behandlung als Resistenzbrecher
- 0,15 l Designer/ha als Aktivator für Fungizide und Sticker für höhere Regenfestigkeit
- Mischbar mit 2 l Wuxal Boron SiCure/ha zur sicheren Borversorgung
- AZO-SPEED zur Leistungssteigerung der Rübe; Wuxal K40 SiCure vor Trockenperioden; Promesa Greening-Effekt - für Stresstoleranz

Mit der richtigen Strategie gesunde Rübenbestände bis zur Ernte

CUPROFOR FLOW

Der Resistenzbrecher gegen Cercospora aus Österreich

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 3034-901

Gewässerabstand:
-/-/-/20 m

Packungsgrößen:
1 l Flasche
5 l Kanister
10 l Kanister

Wirkstoff:
Kupfer (-oxychlorid)

FRAC-Gruppe:
Multi-site

EINZIGARTIG, DA:

- Feinst vermahlenes Kupfer mit hohem Wirkungsgrad durch den „Flow"-Effekt
- Als Mischungspartner für systemische Fungizide (bis zu 4 Anwendungen)
- Gute Anhaftung und beste Regenfestigkeit aller Kontaktwirkstoffe

PREIS AKTION
CUPROFOR FLOW
10 L KANISTER
SOLANGE DER VORRAT REICHT

ANWENDUNG:

1,5 l Cuprofor flow/ha
Als Resistenzbrecher in jeder Tankmischung mit systemischen Fungiziden

2,5 l Cuprofor flow/ha
4. Spritzung + 0,15 l Designer

UNIVOQ

Zulassung Art. 53 beantragt - vorbehaltlich Genehmigung

Neue Wirkstoffgruppe gegen Cercospora

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 4340

Gewässerabstand:
-/-/10/10 m

Packungsgröße:
5 l Kanister

Wirkstoffe:
50 g/l Fenpicoxamid
(= Inatreq active)
100 g/l Prothioconazol

FRAC-Gruppen:
21, 03

EINZIGARTIG, DA:

- Stärkste Wirkung gegen Cercospora
- Neue Wirkstoffgruppe fürs Resistenzmanagement
- Top-Produkt gegen Cercospora in der Rübe und Septoria im Getreide

ANWENDUNG:

1,5 l Univoq + 1,5 l Cuprofor flow + 150 ml Designer/ha

In jeder Cercospora-Strategie bei der ersten oder zweiten Spritzung einmal die neue Wirkstoffgruppe einsetzen!

Art. 53 Zulassung beantragt für Univoq, das stärkste Mittel aus einer neuen Wirkstoffgruppe

SEKVENCA

Top für die 1. oder 3. Cercospora-Spritzung

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 4001

Gewässerabstand:
10/5/5/1 m

Packungsgrößen:
1 l Flasche
5 l Kanister

Wirkstoff:
Difenoconazol

FRAC-Gruppe: 03

EINZIGARTIG, DA:

- **Günstig & sicher - kombiniert mit Cuprofor flow + Designer**
- **Breite Zulassung in vielen Kulturen**
- **In Phasen mit geringerem Cercosporadruck anwenden.**

ANWENDUNG:

0,4 l Sekvenca/ha
für die erste oder dritte Cercospora-Spritzung mit Cuprofor Flow und Designer

WIRKUNGSWEISE:

Das Fungizid Sekvenca ist systemisch wirksam. Difenoconazol wird rasch von Blättern und Stängeln aufgenommen und in den Pflanzen transportiert. Die rasche Regenfestigkeit ist bemerkenswert.
In der Zuckerrübe ist die Kombination mit dem Kontaktmittel Cuprofor Flow und dem Spezialadditiv Designer optimal.
Vorbeugend und befallshemmend verhindert Sekvenca die weitere Ausbreitung der Cercospora und anderer pilzlicher Schaderreger in vielen Kulturen.

EMINENT

Absolut richtig für die 1. oder 3. Cercospora-Behandlung

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 3361-902

Gewässerabstand:
1 m

Packungsgröße:
5 l Kanister

Wirkstoff:
Tetraconazol

FRAC-Gruppe: 03

EINZIGARTIG, DA:

- **Systemisches Fungizid gegen Cercospora**
- **Stark in Kombination mit Cuprofor flow + Designer**

ANWENDUNG:

1 l Eminent/ha
bei der 1. oder 3. Cercospora-Behandlung mit Cuprofor flow und Designer

behandeltes Rübenblatt

ZUCKERRÜBE - INSEKTIZIDSTRATEGIE

Schädlinge und Möglichkeiten, die Rüben davor zu schützen

SITUATION:

Durch die insektizide Beize werden die jungen Rüben bis in den frühen Nachauflauf vor wichtigen Schädlingen geschützt. Dazu gehören Erdflöhe, Blattläuse, Moosknopfkäfer und, bis zu einem gewissen Grad, auch die Rübenderbrüssler. Bei Wegfall dieser Beizen oder bei biologischer Rübenproduktion müssen diese Schädlinge auf andere Weise in Schach gehalten werden.

SCHÄDLINGE:

ERDFLÖHE – Art. 53 CYMBIGON FORTE

werden derzeit nur von insektiziden Beizen erfasst. Sie müssten direkt im Auflaufen der Rüben über Flächenspritzungen bekämpft werden (Art. 53 Zulassung beantragt).

GLASFLÜGELZIKADEN

für Mospilan 20SG wird eine Art. 53 Zulassung beantragt.

RÜBENDERBRÜSSLER

Gegen den Derbrüssler muss im Befallsgebiet ein Bündel von Maßnahmen angewendet werden (Fallen, Rillenpflug, Randbehandlungen). Ein Antrag wurde gestellt zur Artikel 53 Zulassung für die Produkte Cymbigon Forte und Mospilan 20 SG. Diese Zulassung ist zum Zeitpunkt der Drucklegung des Ratgebers noch nicht gegeben.

BLATTLÄUSE – CYMBIGON FORTE

werden auf jungen Rübenpflanzen durch insektizide Beizen erfasst, später mit zugelassenem Pyrethroid (Cymbigon Forte) im Zuge der Cercospora-Behandlung behandelt. Achtung - sind auch Virusüberträger, daher nicht zu unterschätzen.
Artikel 53 für Mospilan 20 SG gegen Blattläuse ist beantragt (Resistenzmanagement)

RÜBENMOTTE – CYMBIGON FORTE

besonders in Trockenjahren tritt die Rübenmotte vermehrt auf. Bei Blattverlust durch Trockenheit oder Krankheit werden die neu gebildeten Blätter im Rübenherz für die Ertragsbildung benötigt. Aber gerade diese werden durch die Larven der Rübenmotte zerstört. Da die Larven schwer zu treffen sind, erfolgt die Bekämpfung am besten gegen die adulte Motte, vor oder bei der Eiablage, (im Zuge der Cercospora-Behandlungen) mit Cymbigon Forte.

WEITERE SCHÄDLINGE:

SCHNECKEN:

Allowin Schneckenkorn: 5 kg/ha gleichmäßig streuen

FELDMÄUSE:

Arvalin Mäuseköder: 2 kg/ha oder 5 Körner/Loch mit Legeflinte in Mauslöcher

ZUCKERRÜBE

Eine Kultur mit anspruchsvollem Nährstoffmanagement

WUXAL P-PROFI

2 l Wuxal P-Profi bringen den Extrakick für die Jugendentwicklung und fördern die Herbizidwirkung. Das Nährstoffverhältnis sorgt für eine ausgewogene Ernährung der Jungpflanzen. Der eingebaute pH-Puffer puffert die Spritzlösung im optimalen Bereich.

WUXAL BORON SICURE

2 l Wuxal Boron SiCure mit SiCure Technologie bei Reihenschluss versorgen die borliebenden Zuckerrüben zuverlässig mit ausreichend Bor. Die innovative SiCure Technologie unterstützt die effiziente Aufnahme von Bor und fördert die Stabilität der Nährstofflösung. Das ausgewogene Nährstoffverhältnis in Wuxal Boron SiCure sorgt so für eine bessere Nutzung der Spurenelemente als bei Einzelnährstoffdüngern. Die integrierte pH-Wert-Pufferung bleibt auch in Tankmischungen wichtig, um die Spritzbrühe im optimalen Wirkungsbereich anzuwenden.

WUXAL K40 SICURE

2 l Wuxal K40 mit SiCure Technologie fördern und sichern den Zuckerertrag. Kalium reguliert den Wasserhaushalt der Pflanze und wird vorzugsweise vor Beginn von Trockenperioden ausgebracht. Die SiCure Technologie liefert zusätzlich pflanzenverfügbares Silizium, das die mechanische Festigkeit der Zellwände erhöht. Durch die verstärkte Zellwandstruktur wird die Pflanze widerstandsfähiger gegenüber abiotischem Stress. Der Einsatz von Wuxal K40 mit SiCure Technologie trägt zur Erhaltung der Blattspannung und zur raschen Regeneration nach Stressphasen bei, was die Zuckerbildung und Rübenqualität positiv beeinflusst.

WUXAL ASCOFOL SICURE

2 l WUXAL Ascofol mit SiCure Technologie bei Reihenschluss zur Vitalisierung und Stärkung des Bestandes. Die innovative SiCure Technologie kombiniert bioverfügbares Silizium mit hochwertigem Algenextrakt und bietet maximale Unterstützung für die Pflanzenvitalität. Pflanzliche Schutzmechanismen werden aktiviert, die Stressresistenz gegenüber abiotischen Faktoren wie Trockenheit, Hitze oder Frost deutlich erhöht. Das in WUXAL Ascofol SiCure enthaltene Silizium erhöht die Stabilität der Zellwände, während der Algenextrakt die Photosyntheseaktivität und Nährstoffeffizienz fördert. Das Resultat sind vitalere Bestände mit gleichmäßigerem Wachstum und reduzierten Ertragseinbußen unter Stressbedingungen.

VERSUCHSERGEBNIS AUS DER PRAXIS (Mittelwert aus 10 Versuchen)





AKTIVATOREN

DER RICHTIGE AKTIVATOR

Holt noch mehr Leistung aus Ihrem Pflanzenschutzmittel

ERWÜNSCHTE EIGENSCHAFTEN VON ADDITIVEN:

- Herabsetzen der Oberflächenspannung - größere Aufnahmefläche
- Bessere Benetzung von wachsigen, haarigen Pflanzen und Schädlingen
- Förderung der Penetration (Eindringen von systemischen Wirkstoffen)
- Stärkere Anhaftung der Spritzbrühe an der Zielfläche (geringere Ablaufverluste, Regenfestigkeit)
- Verminderung der Abdriftverluste während der Ausbringung
- Anhaftung an Bodenteilchen verbessern (Auswaschung, Einwaschung in Keimzone verhindern)
- Verbesserung der Wasserqualität (Wasserhärte, pH-Wert)

EIN NETZMITTEL FÜR ALLES? NEIN, SPEZIALISTEN BRINGEN MEHR!

- Nicht ionische Netzmittel fördern viele Herbizide und Insektizide (Neo-Wett)
- Sticker und Spreader fördern Benetzung und Anhaftung von Insektiziden und Fungiziden (Designer)
- Anti-Drift und Penetrationsförderung für Glyphosat, Sulfonylharnstoffe, Herbizide und Wachstumsregulatoren (Gondor)
- Anti-Drift-Additive und Anhaftungsverstärker (Grounded)
- Wasserkonditionierer mit Wuxal P Profi

SPEZIALADDITIVE BEI KWIZDA AGRO:

FUNKTION	GONDOR	DESIGNER	GROUNDED	WUXAL P PROFI	NEO-WETT
Benetzen	++(+)	+++	0	+	++(+)
Retention	+++	+++	0	+	++
Sticker	+	+++	0	0	0
Penetration	+++	+	0	+	++
Trocknungsverzögerung	+	0	0	±	0
Trocknungsbeschleunigung	0	+	0	±	++
Driftkontrolle	+++	+	+++	0	±
pH-Wert, Wasserhärte	0	0	0	+++	0
Bodenapplikation	0	0	+++	0	±

Mehr Leistung mit dem richtigen Aktivator

DER RICHTIGE AKTIVATOR

Holt noch mehr Leistung aus Ihrem Pflanzenschutzmittel

DESIGNER

Perfekter Aktivator für Fungizide und Insektizide

WIRKUNGSWEISE:

- **Benetzungsfunktion:** größere benetzte Fläche - vor allem bei Kontaktfungiziden ist ein vollständiger, stabiler Fungizidfilm wichtig
- **Stickerfunktion:** schützt die aktiven Stoffe vor dem Abwaschen durch Regen
- **Retentionsfunktion:** verhindert Spritzverlust durch Zerstäuben der auftretenden Tropfen

ANWENDUNG:

0,15 l Designer/ha

ANHAFTUNG UND VERTEILUNG AUCH AUF TAUNASSEN OBERFLÄCHEN

Besonders wichtig bei Cercospora-Spritzungen in der Rübe, die meist morgens bei Tau durchgeführt werden – Runoff-Verluste werden minimiert. Die Regenfestigkeit ist aufgrund der langen Spritzabstände ebenfalls wichtig (Cuprofor flow als Resistenzbrecher).

OHNE DESIGNER

MIT DESIGNER



ANWENDUNGSGEBIETE:

- Cercospora-Spritzung in der Zuckerrübe
- Phytophtora-Spritzung in Kartoffeln
- Blüten-Spritzungen im Getreide (gute Benetzung der Blütenanlagen entscheidend)
- Insektizid-Spritzungen bei schwer benetzbaren/ bekämpfbaren Schädlingen

Thripse in diversen Kulturen, Stängelrüssler im Raps, Blattläuse, Getreidehähnchen, Maiszünsler und -wurzelbohrer.

PRAXISTIPP:

Mit Designer kann die Wassermenge bei Verwendung entsprechender Düsen auf 100 - 150 l/ha reduziert werden.

FUNGIZIDVERSUCH IN DER WINTERGERSTE

LK Oberösterreich, 2020



DER RICHTIGE AKTIVATOR

Holt noch mehr Leistung aus Ihrem Pflanzenschutzmittel

GONDOR

Gondor als Spezialadditiv für NAK-Spritzungen insbesondere bei der Anwendung von Betanal Tandem, Metafol SC, Venzar, Lontrel 720SG und Tanaris. In der Rübenstrategie spielt Gondor eine wesentliche Rolle. Es ist der perfekte Aktivator für die NAK – Tankmischungen mit guter Verträglichkeit für die Zuckerrüben.

WARUM GONDOR?

- **Einfacher:** Gondor kombiniert die Eigenschaften von Netzmittel und Öl in einem Produkt
- **Wirkungssicher:** Gondor bringt die gleiche Wirkungsverstärkung wie Netzmittel + Öl
- **Verträglicher:** Gondor ist deutlich verträglicher als ein Ölzusatz - das zeigt sich in allen Versuchen und Praxisflächen in Österreich

WIRKUNGSWEISE:

Multifunktionale Wirkung für Herbizide
Abdriftminderung – Benetzung – Anhaftung – Eindringen

- Verbesserte Anlagerung der Spritztropfen auf der Pflanze
- Besseres Eindringen der Wirkstoffe in die Pflanze
- Fördert ein homogenes Tröpfchenspektrum
- Reduziert den Anteil an Kleintropfen - weniger Abdrift

PRAXISTIPP:

Mit Gondor kann bei entsprechender Düsentechnik die Wassermenge reduziert werden. Das erhöht die Flächenleistung bei der Ausbringung, sichert die Wirkung und vermindert die Abdrift.

ANWENDUNG:

0,5 l Gondor/ha ersetzt Paraffinöl und Netzmittel



Spritzfilm mit Gondor


Spritzfilm ohne Gondor

KARTOFFEL

WIRKUNGSSPEKTRUM KARTOFFEL

Produkte	*Stallion SyncTec + Fantasia*	*Stallion SyncTec*	*Fantasia*	*Titus + Gondor*	*Centurion Plus, Panarex*
HRAC-Gruppe	3 (K1), 13 (F4), 15 (K3)	3 (K1), 13 (F4)	15 (N)	2 (B)	1 (A)
Aufwandmenge/ha	2,5 l + 2,5 l	2,5 - 3 l	5 l	40 g + 0,35 l	1 l, 1,25 l
Anwendung	VA	VA	VA	NA	NA
Gewässerabstand	-/-/15/5 m	-/-/15/5 m	10/5/5/1 m	5/1/1/1 m	1 m
Ackersenf/Hederich	■	▪	■	▪	
Ackerwinde		▪		▪	
Amarant	■	▪	■	▪	
Ausfallraps	■	▪	■	▪	
Ausfallsonnenblume	■	▪		▪	
Bingelkraut	■	▪	■	▪	
Distel		▪		▪	
Ehrenpreis	■	▪	■		
Erdrauch	■	▪	■	▪	
Franzosenkraut	■	▪	■	▪	
Gänsefuß, Weißer	■	▪	■	▪	
Hellerkraut	■	▪	■	▪	
Hirtentäschel	■	▪	■	▪	
Hohlzahn, Gemeiner	■	▪	■	▪	
Kamille, Echte	■	▪	■	▪	
Klatschmohn	■	▪	■	▪	
Klettenlabkraut	■	▪	■	▪ 1)	
Knöterich, Ampferblättriger	■	▪	■	▪	
Knöterich, Vogel-	■	▪	■	▪	
Knöterich, Winden-	■	▪	■	▪	
Kreuzkraut, Gemeines	■	▪	■	▪	
Melde, Gemeine	■	▪	■	▪	
Nachtschatten, Schwarzer	■	▪	■		
Platterbse	■	▪		▪	
Stechapfel	■	▪		▪	
Stiefmütterchen, Acker-	■	▪	■	▪	
Taubnessel	■	▪	■	▪	
Vogelmiere	■	▪	■	▪	
Zweizahn	■	▪	■	▪	
Borstenhirse	■	▪	■	▪	■
Finger-/Bluthirse	■	▪	■	▪ 2)	■
Hühnerhirse	■	▪	■	▪	■
Rispenhirse, Einjährige Rispe	■	▪	■	▪	■
Ausfallgetreide	■	▪		▪ 3)	■
Flughafer	■	▪	■	▪ 3)	■
Fuchsschwanzgras, Acker-	■	▪	■	▪	■
Quecke		▪		▪ 3) 4)	■ 4)
Windhalm	■	▪	■	▪	■

■ sehr gut wirksam ■ gut wirksam ■ schwach wirksam □ nicht wirksam

1) Klettenlabkraut wird bei wüchsigen Bedingungen im 2- bis 5- Quirlstadium sehr gut erfasst 2) Finger-/Bluthirse wird bis zum 2- Blattstadium erfasst
3) Anwendung im 3- bis 4- Blattstadium 4) 2,5 l Centurion Plus; 2,25 l Panarex

STALLION SYNCTEC

Vorauflauf-Herbizid zur Bekämpfung einjähriger Unkräuter und Schadhirsen

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 3483

Gewässerabstand:
-/-/15/5 m

Packungsgröße:
5 l Kanister

Wirkstoffe:
Clomazone
Pendimethalin

HRAC-Gruppen:
15 (N)

EINZIGARTIG, DA:

- **Patentierte Synchron Technologie**
- **Kontrollierte Freigabe beider Wirkstoffe**
- **Breites Wirkungsspektrum**

ANWENDUNG:

Auf feinkrümeligen, gut abgesetzten Böden im VA spritzen.

HAUPTEMPFEHLUNG:
2,5 l Stallion SyncTec + 2,5 l Fantasia/ha
im VA vor dem Durchstoßen der Kartoffel
bei Nachtschatten, Klettenlabkraut

TIPP:

Stechapfelstrategie inkl. Nachtschatten:
3 l Stallion SyncTec + 2 l Fantasia + 1,5 l Proman/ha

AKTION IN KARTOFFEL 2026

Beim Kauf von:
15 l Stallion SyncTec + 15 l Fantasia
= 10 l Wuxal P Profi GRATIS
Rechnung Kopie bis 31.6.2026 per mail an:
kartoffelaktion@kwizda-agro.at

FANTASIA

Der Spezialist gegen Schwarzen Nachtschatten

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 4342

Gewässerabstand:
10/5/5/1 m

Packungsgrößen:
5 l Kanister
15 l Kanister NEU

Wirkstoff:
Prosulfocarb

HRAC-Gruppe:
3 (K1), 13 (F4)

EINZIGARTIG, DA:

- **Verträglich in allen Sorten**
- **Mischbar mit allen Herbiziden**
- **Sicherheit gegen Schwarzen Nachtschatten**

ZUGELASSEN IN:

- Kartoffel
- Getreide, Mohn, Zwiebel, Sonnenblume, u.a.

Kein Problem mit Nachtschatten dank Fantasia

CENTIUM CS

Der Klettenlabkraut- und Knöterichspezialist in Kartoffel und vielen anderen Kulturen

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 2733

Gewässerabstand:
1 m

Packungsgröße:
0,5 l Flasche

Wirkstoff:
Clomazone

HRAC-Gruppe:
13 (F4)

EINZIGARTIG, DA:

- **In allen Sorten verträglich**
- **Gegen Problemunkräuter**
- **Perfekter Mischungspartner mit dem Wirkstoff Clomazone**

ZUGELASSEN IN:

- Allen Kartoffelsorten im Vorauflauf

Zusätzlich in:

- Raps
- Kürbis
- Karotte
- Zuckerrübe
- Mohn
- Erbse

ANWENDUNG:

0,25 l Centium CS/ha
Gegen Klettenlabkraut, Knöterichcharten und Stechapfel

Centium CS ist mit vielen Kartoffelherbiziden wie Fantasia, Bandur u.v.m. mischbar und ergänzt oder erweitert das Unkrautspektrum.

Auf strategische Vorteile bauen: Der Kwizda Agro Spritzplan für die Kartoffelproduktion auf Seite 68 - 69

TITUS

Der Spezialist gegen Unkräuter und Schadgräser im Nachauflauf

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 2478

Gewässerabstand:
5/1/1/1 m

Packungsgröße:
100 g Dose

Wirkstoff:
Rimsulfuron

HRAC-Gruppe:
2 (B)

EINZIGARTIG, DA:

- **Einzigartige Unkrautkontrolle im Nachauflauf**
- **Wirkungssicherheit auch bei Trockenheit**
- **Flexibel in der Anwendung**
- **unterdrückt Distelwachstum**

ZUGELASSEN IN:

- Kartoffel (ausgenommen Vermehrungsbestände)
- Mais
- Chinaschilf

Titus, die Korrekturmöglichkeit im Nachauflauf

ANWENDUNG:

40 g Titus
+ 0,35 l Gondor/ha
Oder **im Splitting** mit
2 x 20 g Titus + 0,35 l Gondor/ha im Abstand von ca. 10 Tagen

40 g Titus
+ 0,35 l Gondor
+ 4 l Fantasia/ha
Knapp vor dem Durchstoßen der Kartoffel

PANAREX

FOP-Wirkstoff

Hohe Sicherheit zum günstigen Preis

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 3201

Gewässerabstand:
1 m

Packungsgröße:
5 l Kanister

Wirkstoff:
Quizalofop-P-tefuryl

HRAC-Gruppe:
1 (A)

EINZIGARTIG, DA:

- **Flüssigformulierung enthält bereits Netzmittel**
- **Besonders stark gegen Ausfallgetreide und Flughafer**

ZUGELASSEN IN:

- Allen Kartoffelsorten gegen Schadgräser und Ausfallgetreide
- Raps
- Ackerbohne
- Lein
- Zuckerrübe
- Futtererbse

ANWENDUNG:

1 l Panarex/ha gegen Ungräser

2,25 l Panarex/ha gegen Quecke

Das blattaktive Panarex wird nach dem Auflaufen der Schadgräser im 2-Blattstadium bis Ende Bestockung mit 200 bis 400 l Wasser/ha gespritzt. Der Wirkstoff wird systemisch verteilt und stoppt sofort die Pflanzenentwicklung.

Auf strategische Vorteile bauen: Der Kwizda Agro Spritzplan für die Kartoffelproduktion auf Seite 68 - 69

CENTURION PLUS

DIM - Wirkstoff

Das kluge Gräserherbizid

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 4254

Gewässerabstand:
1 m

Packungsgröße:
5 l Kanister

Wirkstoff:
Clethodim

HRAC-Gruppe:
1 (A)

EINZIGARTIG, DA:

- **Centurion Plus wirkt auch da, wo alle anderen nichts mehr bewirken**
- **Hochwirksam gegen alle Ungräser inkl. Ausfallgetreide, Weidelgras, Einj. Rispe und Flughafer**
- **Ideales Resistenzmanagement dank DIM-Wirkstoff**

ANWENDUNG:

1 l Centurion Plus/ha
gegen Einjährige Ungräser

2,5 l Centurion Plus/ha
gegen Quecke (bei 15 - 20 cm)

REBOOT

Dank Cymoxanil auch kurativ wirksam

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 3640

Gewässerabstand:
5/1/1/1 m

Packungsgrößen:
1 kg Packung
5 kg Packung

Wirkstoffe:
Cymoxanil
Zoxamid

FRAC-Gruppen:
27, 22

Max. Anzahl Spritzungen:
3

EINZIGARTIG, DA:

- **Cymoxanil + Zoxamid – bewährtester systemischer Wirkstoff + innovativer Kontaktwirkstoff**
- **Kontakt und teilsystemisch, vorbeugend und kurativ gegen Kraut- und Knollenfäule**
- **Ideales Resistenzmanagement**

ANWENDUNG:

0,45 kg Reboot/ha

Designer®

EMPFEHLUNG:

Cymoxanil ist systemisch und im Kartoffelbau einer der stärksten kurativen Wirkstoffe. Wir empfehlen daher bei sichtbarem Befall oder auch als kurative Vorsorge die Tankmischung

0,45 kg Reboot + 0,4 l Winner/ha.

Diese Tankmischung war auch in den Euroblight-Versuchen in Holland, Deutschland und England eine der besten Varianten und wurde mit 4,3 (von 5) bewertet. Eine günstige Maßnahme, mit der Sie den Schaderreger vorbeugend, kurativ und sporenabtötend im Griff haben.

Auf strategische Vorteile bauen: Der Kwizda Agro Spritzplan für die Kartoffelproduktion auf Seite 68 - 69

ZORVEC ENTECTA

Die neueste Wirkstoffkombination gegen Phytophthora

EINZIGARTIG, DA:

- ▶ Systemisch zum Spritzstart gegen Stängelphytophthora
- ▶ Jetzt erstmals Zoosporen abtötend
- ▶ Ideal zum Spritzstart gegen Erstinfektionen
- ▶ Schnellste Regenfestigkeit
- ▶ Wirkt protektiv und kurativ

ZUGELASSEN IN:

- Kartoffel
- Zulassung in Zwiebelgemüse und Salate erwartet

EUROBLIGHT EINSTUFUNG

	Blatt-befall1	Neu-zuwachs	Stängel-befall	präven-tive Wirkung	Kura-tivität	Anti-sporula-tion	Regen-festigkeit	Wirkstoff-verteilung²
Zorvec Endavia (0,4 l/ha)	**4,9**	**++(+)**	**++(+)**	**+++**	**++**	**++(+)**	**+++**	**S + T**
Zorvec Entecta (0,25 l/ha)	**4,9**	**++(+)**	**++(+)**	**+++**	**++**	**++(+)**	**+++**	**S + C**
Mandipropamid + Cymoxanil (0,6 kg/ha)	4,4	++	+(+)	+++	++	+(+)	+++	C/T + T
Mandipropamid + Difenoconazol (0,6 l/ha)	4,0	++	+(+)	+++	+	+(+)	+++	C/T + C
Propamocarb + Fluopicolide (1,6 l/ha)	3,8	++	++	+++	++	++(+)	++(+)	S + C/T

1 Gesamteinstufung Wirkung gegen Blattbefall, Skala 2–5
2 S: systemisch; T: translaminar; C: Kontakt

Aktuell höchste Einstufung

Quelle: EuroBlight-Fungizideinstufung Mai 2022 (www.euroblight.net)

Einstufung	Beschreibung
+++	Sehr gute Wirkung
++	Gute Wirkung
+	Ausreichende Wirkung

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 4403

Gewässerabstand:
5 m

Packungsgrößen:
1 l Flasche
5 l Kanister

Wirkstoffe:
Oxathiapiprolin
Amisulbrom

FRAC-Gruppen:
49, 21

Max. Anzahl Spritzungen:
4

Wartefrist:
7 Tage

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG:

Bis zu 4 Anwendungen mit 0,25 l/ha.

Zorvec Entecta wirkt vorbeugend und heilend und ist das Mittel gegen Erstinfektionen zum Spritzstart. In den Folgebehandlungen wird Zorvec Entecta im Wechsel mit anderen systemischen Fungiziden wie Reboot oder Infinito eingesetzt. Zorvec Entecta erfasst aufgrund des 2.Wirkstoffes auch resistente Isolate.

IT'S ZORVEC-TIME!

Auf strategische Vorteile bauen: Der Kwizda Agro Spritzplan für die Kartoffelproduktion auf Seite 68 - 69

KWIZDA KARTOFFEL UND ZWIEBEL PACK

Doppelt vorbeugend und sporizid

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr.
Winner 2528
Prevint Flow 4221-901

Gewässerabstand:
10/5/5/5 m

Packungsgröße:
20 l Pack (5 l Winner + 15 l Prevint Flow)

Wirkstoffe:
Initium (Ametoctradin)
Fluazinam

FRAC-Gruppen:
45, 29

Wartezeit:
7 Tage

EINZIGARTIG, DA:

- Völlig neue Wirkstoffkombination in der Kartoffel
- Einlagerung in Wachsschicht und Wiederverteilung von Initium
- Eingebautes Resistenzmanagement
- Gute Regenbeständigkeit
- Günstige Krankheitsbekämpfung in der 2. Vegetationshälfte

Der Kwizda Kartoffel und Zwiebel Pack besteht aus Prevint Flow (Initium) und Winner (Fluazinam). Initium greift in die Atmung des Schaderregers ein und hemmt die Differenzierung und Beweglichkeit der Zoosporen sowie die Zoosporenentlassung aus den Zoosporangien. Diesem speziellen Wirkungsmechanismus wird der Multi-Site Wirkstoff Fluazinam als Resistenzvorbeugung zur Seite gestellt. Zusammen ergibt dies eine zweifach vorbeugende und durch Winner eine zusätzlich Sporen abtötende Wirkungsweise.

ANWENDUNG:

Max. 3 x/Jahr in Kartoffel, max. 2 x/Jahr in Zwiebel.
1,2 l Prevint Flow
+ 0,4 l Winner/ha.

Mit dieser Aufwandmenge reicht der Pack für 12,5 ha.

Wenngleich Winner wegen seiner sporiziden Wirkung auch bei sichtbarem Befall appliziert werden könnte, den Kwizda Kartoffel Pack nach Möglichkeit immer vorbeugend einsetzen, auch wenn die Wirkstoffe eine gewisse Systemizität zeigen. Daher den Kwizda Kartoffel & Zwiebel Pack nach der Hauptwachstumsphase einsetzen.

Der neue Kwizda Kartoffel & Zwiebel Pack hält die Kartoffel- und Zwiebelbestände bis zur Ernte gesund.

Auf strategische Vorteile bauen: Der Kwizda Agro Spritzplan für die Kartoffelproduktion auf Seite 68 - 69

WINNER

Mehr Gewinn für Ihre Kartoffelernte -
WINNER - das Original

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 2528

Gewässerabstand:
5/1/1/1m

Packungsgrößen:
1 l Flasche
3 l Flasche

Wirkstoff:
Fluazinam

FRAC-Gruppe:
29

EINZIGARTIG, DA:

- Das Kontaktfungizid der Sonderklasse auch in Zwiebel
- Sporenabtötende Wirkung - verhindert Krankheits-ausbreitung
- Wartezeit nur 7 Tage
- Ideale Kombination mit Kabuki zur Stängelsikkation

ZUGELASSEN IN:

- Kartoffel
- Zwiebel

Max. Anzahl Spritzungen:
6 x in Kartoffel
3 x in Zwiebel

Winner mit dem sporentötenden Wirkstoff

ANWENDUNG:

0,4 l Winner/ha gegen Phytophthora

- Vorbeugend in Abständen von 7 - 10 Tagen anwenden
- In Tankmischungen zur Sporenabtötung
- Als Abschlussspritzung

PRAXISTIPP:

Bei bereits sichtbarem Befall empfehlen wir eine Mischung eines kurativen Produktes + Winner:
0,4 kg Reboot + 0,4 l Winner/ha oder **0,22 kg Sacron WG + 0,4 l Winner**

SACRON WG

NEU

Das preiswerte Cymoxanil Fungizid

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 3289-0

Gewässerabstand:
1 m

Packungsgröße:
1 kg

Wirkstoff:
Cymoxanil

FRAC-Gruppe:
27

EINZIGARTIG, DA:

- Bester Kurativ-Wirkstoff
- Tankmischpartner für jede Fungizidspritzfolge
- Heilende Wirkung auf latente Infektionen
- Günstige Granulatformulierung

CUPROFOR FLOW

Mehr als ein Fungizid

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 3034-901

Gewässerabstand:
-/-/-/20 m

Packungsgrößen:
1 l Flasche
5 l Kanister
10 l Kanister

Wirkstoffe:
Kupfer (-oxychlorid)

FRAC-Gruppen:
Multi-site

EINZIGARTIG, DA:

- Unentbehrlich im Bio-Landbau
- Als Bakterizid gegen Nassfäule
- Hilft bei Wundverschluss nach Hagel
- Feinst vermahlen
- Regenbeständiger als andere Kupferprodukte

Auf strategische Vorteile bauen: Der Kwizda Agro Spritzplan für die Kartoffelproduktion auf Seite 68 - 69

DAGONIS

Alternaria Spezialist und vieles mehr

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 4036

Gewässerabstand:
5 m

Packungsgröße:
5 l Kanister

Wirkstoffe:
Difenoconazol
Fluxapyroxad
(XEMIUM®)

FRAC-Gruppen:
3, 7

EINZIGARTIG, DA:

- Systemisch
- vorbeugend und heilend
- Neuer bewährter Wirkstoff
- Synergieeffekt
- Breite Zulassung - breite Wirkung
- In vielen Gemüsekulturen zugelassen

ANWENDUNG:

0,75 l Dagonis/ha
Max. 4 Anwendungen/Jahr. Ein früher Einsatz schon bei der 2. Applikation verhindert Frühinfektionen durch Alternaria. **0,75 l Dagonis/ha**

WIRKUNGSSPEKTRUM DAGONIS®:



HERAUSRAGENDER SCHUTZ DER KARTOFFELN

20 Versuche, 2013 – 2016 in BE, DE, NL, UK, PL



PROMESA

Hält mehr als der Name verspricht

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 4286

Gewässerabstand:
5/1/1/1 m

Packungsgrößen:
1 l Flasche
5 l Kanister

Wirkstoff:
Azoxystrobin

FRAC-Gruppe:
11

EINZIGARTIG, DA:

- 168 Indikationen in vielen Kulturen
- Flexible Anwendung in der Kartoffel
- Gegen Alternaria mit Nebenwirkung Phytophthora

Unbehandelte Kontrolle


Alternariawirkung von 0,5 l/ha Promesa

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG:

Blattspritzungen gegen Alternaria
mit max. 3 x 0,5 l Promesa/ha pro Vegetationsperiode alternierend mit 0,75 l Dagonis/ha einsetzen.

oder

Furchenbehandlung
mit max. 1 x 3 l Promesa/ha gegen Rhizoctonia und Colletotrichum.

Auf strategische Vorteile bauen: Der Kwizda Agro Spritzplan für die Kartoffelproduktion auf Seite 68 - 69

WUXAL P-PROFI

Unterstützt den Knollenansatz

ÜBERSICHT:

Packungsgrößen:
5 l Kanister
20 l Kanister
200 l Fass
600 l Fass

Nährstoffe:
70 g/l N
260 g/l P
70 g/l K

EINZIGARTIG, DA:

- **Versorgt die gestresste Jungpflanze mit Phosphor**
- **Puffert den pH-Wert und homogenisiert die Spritzbrühe**
- **Positive Effekte auf Wirkungsabsicherung von Pflanzenschutzmitteln**

ANWENDUNG:

2 l Wuxal P-Profi/ha
verbessert die Phosphorversorgung und erhöht den Knollenansatz

N-LEAF

Atmosphärische Stickstofffixierung

ÜBERSICHT:

Packungsgrößen:
1 l, 5 l

Inhaltsstoffe:
10^9 UFC/ml
Methylobacterium und Arthrobacter

Lagertemperatur:
4-25 °C

Lagerung:
Luftgeschützt, lichtgeschützt, bei stabiler und mäßiger Temperatur lagern.

EINZIGARTIG, DA:

- **Fixiert atmosphärischen Stickstoff und macht diesen pflanzenverfügbar**
- **Unterstützt Wurzelbildung, Photosynthese und Nährstoffaufnahme**
- **Umweltfreundlich**
- **Stärkt die Vitalität und Widerstandsfähigkeit der Pflanzen**

ANWENDUNG:

N-LEAF 0,5 l/ha für viele Kulturen, darunter Getreide, Raps, Mais, Gemüse, Sonnenblume, Soja, Kartoffel.

WUXAL K40 SICURE

NEU

K&K-Strategie - vom Kraut in die Knolle

ÜBERSICHT:

Packungsgröße:
10 l Kanister

Nährstoffe:
50 g/l N
400 g/l K
47 g/l Si
264 g/l S

ANWENDUNG:

3 l Wuxal K40 SiCure/ha
reduziert Trockenstress vor Trockenperioden

WUXAL K40 SiCure ist eine hochkonzentrierte Kaliumsuspension, mit Spurenelementen und einer einzigartigen pflanzenverfügbaren Siliziumformulierung. Die Kombination von Kalium und Silizium stärkt die Pflanzenstruktur und verbessert den Wasserhaushalt. Das verstärkte Pflanzengewebe reduziert die Verdunstungsrate, während Kalium die Regulierung der Spaltöffnungen unterstützt.
Kalium reguliert die osmotische Balance und ermöglicht eine optimale Wasserverteilung in der Pflanze. Es steuert die Stomatafunktion, fördert die Photosyntheseaktivität und unterstützt die Assimilatverlagerung in Phasen der Fruchtentwicklung.
Silizium stärkt die Zellstruktur und Cuticula, reduziert Wasserverluste und stabilisiert den Stoffwechsel bei Trocken- und Hitzestress.

Auf strategische Vorteile bauen: Der Kwizda Agro Spritzplan für die Kartoffelproduktion auf Seite 68 - 69

KABUKI TURBO

Das weiter entwickelte Kabuki Go

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 2907

Gewässerabstand:
5/3/1/1 m

Packungsgrößen:
2,8 l Packung für 1 ha
(0,8 l Kabuki + 2 l Toil)
14 l Packung für 5 ha
(4 l Kabuki + 2 x 5 l Toil)

Wirkstoff:
Pyraflufen-ethyl

HRAC-Gruppe:
14 (E)

EINZIGARTIG, DA:

- **Mit Toil, dem noch stärkeren Additiv**
- **Auch in Obst und Wein zugelassen**
- **Flexibler Einsatz**
- **Unschlagbar bei Wiederaustrieb**
- **Gleichmäßige Abreife**
- **Keine Schäden an Knollen**

ANWENDUNG:

- Wenig vitale (leicht seneszente) Sorten:
  1 (-2) x 2,8 l Kabuki Turbo + 2 l EMU 11 E/ha
- Krautige, sehr vitale Sorten (z.B. Belmonda):
  2 x 2,8 Kabuki Turbo + 2 l EMU 11 E/ha
  1 l Shark + 5 l PA-Oil/ha
- Saatkartoffel:
  Schlegeln, unmittelbar danach **1 x 2,8 l Kabuki Turbo + 2 l EMU 11/ha**
  (Kraut darf nicht die verbleibenden Stängel abdecken)
  oder nur chemisch
  2 x 2,8 l Kabuki Turbo + 2 l EMU 11/ha
  1 l Shark + 5 l PA-Oil/ha

TIPP:

Kabuki Turbo zur schnelleren und noch besseren Wirkung immer 2 l EMU 11 E (Öl)/ha zur Tankmischung dazugeben!
Warme Sommertage und Sonnenlicht sind für eine gute Wirkung wichtig. 0,4 l Winner/ha der Tankmischung zusetzen, wenn sporulierende Phytophthora Infektionen im Bestand sind. Zoosporen können die Knollen über den Boden noch tagelang infizieren (Lagerfäule!).

Sorte Marabel: 2 x 2,8 l Kabuki Turbo + 2 l EMU 11/ha

Auf strategische Vorteile bauen: Der Kwizda Agro Spritzplan für die Kartoffelproduktion auf Seite 68 - 69

PICADOR 1,6 MG

Geringere Aufwandmenge - stärkere Sofort- und längere Dauerwirkung

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 4109

Gewässerabstand:
1 m

Packungsgröße:
12 kg Sack

Wirkstoff:
Cypermethrin
(als Mikrogranulat)

IRAC-Gruppe:
3A

EINZIGARTIG, DA:

- **Doppelt konzentriert, niedriger Preis**
- **Dadurch noch mehr Sicherheit**
- **Gegen Drahtwurm in Kartoffel und Sorghum-hirse**
- **Gegen Diabrotica in Mais**

ZUGELASSEN GEGEN:

- Drahtwurm und Erdraupen in Mais, Kartoffel und Sorghumhirse
- Maiswurzelbohrer in Mais

Für eine gute Wirkung von Belem und Picador ist eine gleichmäßige Verteilung des Granulates unerlässlich. Versuche haben bestätigt, dass eine Ausbringung mit dem geeigneten Diffusor im Vergleich ohne Montage von Diffusoren die Wirkung erheblich steigert.
Berater Günther Fischelmaier

Montageanleitungen finden sie hier

Die Larven des Maiswurzelbohrers und des Schnellkäfers können erhebliche Schäden anrichten. Insektizide Bodengranulate können Schäden bei starkem Druck nicht gänzlich ausschalten, aber drastisch reduzieren!

BELEM 0,8 MG

Du kannst nicht vorbei!

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 3553

Gewässerabstand:
10 m

Packungsgröße:
12 kg Sack

Wirkstoff:
Cypermethrin
(als Mikrogranulat)

IRAC-Gruppe:
3A

EINZIGARTIG, DA:

- **Wirksam gegen Drahtwurm**
- **Räumt mit Bodenschädlingen auf**
- **Auch in anderen Kulturen bewährt**

Nur die Schnellkäferlarve = Drahtwurm schädigt direkt.

ANWENDUNG:

24 kg Belem 0,8 MG/ha gegen Drahtwurm. Die ca. 100 Tage andauernde Wirkung erfasst die 1. Welle des Drahtwurms sicher.

EXPERTENTIPP

Richtige Montage der Diffusoren ist entscheidend!

Gerhard Panagl, Unterstützung bei technischen Fragen:
0664 823 8390
g.panagl@kwizda-agro.at

Auf strategische Vorteile bauen: Der Kwizda Agro Spritzplan für die Kartoffelproduktion auf Seite 68 - 69

SHENZI

Mehr Sicherheit gegen Kartoffelkäferlarven

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 2984-903

Gewässerabstand:
1 m

Packungsgröße:
1 l Flasche

Wirkstoff:
Chlorantraniliprole

IRAC-Gruppe:
28

EINZIGARTIG, DA:

- ▶ Sehr gut und lange wirksam
- ▶ Einzigartiger Wirkungsmechanismus
- ▶ Keine Resistenzgefahr
- ▶ Erfasst Larven und Käfer
- ▶ Auch in anderen Kulturen einsetzbar

ZUGELASSEN IN:

- Kartoffel, Mais, Gemüse, Obst

Shenzi® 200 SC
Insecticide

ANWENDUNG:

60 ml/ha
gegen Kartoffelkäfer; max. 2 Anwendungen.
Shenzi erfasst im Prinzip alle Stadien.
Praktisch erfolgt die Bekämpfung der Junglarven!
Adulte Käfer werden dabei mit erfasst.

Zu früh!

Richtiger Appliationszeitpunkt

MOSPILAN 20 SG

Preisgünstig und sicher

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 2830

Gewässerabstand:
1 m

Packungsgrößen:
500 g Dose
3 kg Packung

Wirkstoff:
Acetamiprid

IRAC-Gruppe:
4A

EINZIGARTIG, DA:

- Leistungsstarke Wirkstoffgruppe
- Kontakt-, systemische und translaminare Wirkung
- Zugelassen gegen Kartoffelkäfer und Blattläuse
- Stark gegen Blattläuse mit 250 g/ha

Kartoffelkäferlarve

Virosen sind Vergangenheit

ANWENDUNG:

Gondor®

250 g Mospilan 20 SG + 0,25 l Gondor/ha

Gegen Blattläuse und Kartoffelkäfer

CYMBIGON FORTE

Fünffach konzentriert gegen Kartoffelschädlinge

Pfl. Reg. Nr. 3998

Packungsgrößen:
0,25 l für 5 ha
1 l für 20 ha
5 l für 100 ha
Wirkstoff: Cypermethrin
IRAC-Gruppe: 3A

ANWENDUNG:

50 ml Cymbigon Forte + 0,15 l Designer/ha
Max. 2 Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr

Designer®

SPINTOR

Moderner Wirkstoff gegen Kartoffelkäferlarven

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 3296

Gewässerabstand:
5/5/5/1 m

Packungsgrößen:
0,5 l Flasche
2 l Flasche NEU

Wirkstoff:
Spinosad

IRAC-Gruppe:
5

EINZIGARTIG, DA:

- Neuer Wirkmechanismus für Anti-Resistenz-Strategie
- Sichere und rasche Bekämpfung der Larven des Kartoffelkäfers
- Breite Zulassung auch gegen Thripse in Zwiebel und vielen anderen Kulturen
- Biotauglich

ZUGELASSEN GEGEN:

- Larven des Kartoffelkäfers
- viele Schadinsekten im Acker-, Gemüse- , Obst- und Weinbau.

ANWENDUNG:

Designer®

50 ml Spintor/ha + 0,15 l Designer
In 200 - 400 l Wasser/ha; max. 2 Anwendungen mit mindestens 7 Tagen Abstand.

Ab dem Schlüpfen der ersten Larven, bei Erreichen des Schwellenwertes oder nach Warndienst. Zugelassen ab 9 Blättern des Kartoffelhauptsprosses bis Beginn der Laubblatt-Vergilbung.

PRAXISTIPP:

Für den Bekämpfungserfolg wichtig ist, noch vor der Entwicklung großer Larven (L3, L4) zu spritzen. Der Zusatz von Designer verbessert die Benetzung und vor allem die Anhaftung an den Blättern und Schädlingen. Raschere und nachhaltigere Wirkung und höhere Fahrgeschwindigkeit sind möglich.

Schädlingsfreie Kartoffelbestände

Auf strategische Vorteile bauen: Der Kwizda Agro Spritzplan für die Kartoffelproduktion auf Seite 68 - 69

SPRITZPLAN FÜR DIE KARTOFFELPRODUKTION

		00 Unmittelbar vor dem Pflanzen	01 - 09 Keimung	10 - 19 Blattentwicklung	21 - 29 Blatt- und Stängel-ausbildung
Unkrautbekämpfung	**Unkräuter & Schadgräser**		**Stallion Sync Tec + Fantasia** 2,5 l + 2,5 l/ha		
	Flughafer, Wildhirsen, Quecke[1], **Ausfallgetreide**			**Titus + Gondor** 40 g + 0,35 l/ha **Panarex** oder **Centurion Plus**[1] 1 l/ha	
Schädlinge	**Drahtwurm** **Kartoffelkäfer**	**Belem** 24 kg/ha **Picador** 12 kg/ha			
Krankheiten	**Kraut- und Knollenfäule/ Alternaria**				
Beize, Keimhemmung/Dünger	**Stickstoff/Magnesium/Schwefel + Spurenelemente**	Vor oder beim Legen: **0,2 l Moncut/t** oder **2 kg Symphonie/t** gegen Rhizoctonia		**N-Leaf 0,5 l/ha** im 4 bis 5 Blattstadium BBCH 14-15	
	Verhinderung der Triebbildung am Lager **Erhöht Stresstoleranz der Kultur**	**Pannon Starter Mega** 15 kg/ha beim Legen mit Granulat-streuer ausbringen.			
Wachstumsstadien BBCH					

* ab 25/35 mm Knollendurchmesser bei Speise-/Stärkekartoffeln bis spätestens 3 Wochen vor der Ernte | 1) bei Quecke 2,25 l Panarex/ha bzw. 2,5 l Centurion Plus

Krautabtötung Kabuki Turbo
2,8 l + 2 l EMU 11 E/ha

Kartoffelkäfer: 60 ml/ha **Shenzi**, 50 ml/ha **Spintor**, 0,6 l/ha **Raptol HP**
Blattläuse: 250 g/ha **Mospilan**, 50 ml/ha **Cymbigon Forte**

Zorvec Entecta
0,25 l/ha

Reboot + Winner + Dagonis
0,45 kg + 0,4 l + 0,75 l/ha

Zorvec Entecta + Promesa
0,25 l/ha + 0,5 l/ha

Reboot + Winner + Dagonis
0,45 kg + 0,4 l + 0,75 l/ha

Prevint Flow + Winner (=Kwizda Kartoffel&Zwiebel Pack)
+ Promesa 1,2 l + 0,4 l + 0,5 l/ha

Reboot + Propulse
0,45 kg + 0,5 l/ha

Prevint Flow + Winner (=Kwizda Kartoffel Pack)
1,2 l + 0,4 l/ha

Winner
0,4 l/ha

AZO-SPEED
in Summe 20 l (4 x 5 l oder 2 x 10 l)/ha

Bei Trockenstress: **Wuxal K40 SiCure**
3 l/ha

Wuxal P-Profi
2 l/ha

Royal MH 60 SG*
5 kg/ha



31 - 39	40 - 49	51 - 59	61 - 69	71 - 79	81 - 89	91 - 99
Längenwachstum/ Wuchshöhe	Schließen des Bestandes	Knospenbildung	Blüte	Ausbildung der Beeren	Vergilben der Pflanze	Reife der Knollen

BIOX-M (Pfl.Reg.Nr. 3790): Keimhemmung am Lager mit dem ätherischen Öl der Grünen Minze. Beratung durch DI Harald Schmidt: 0664 822 58 80

RAPS

WIRKUNGSSPEKTRUM RAPS

Produkte	*Belkar + Tanaris*	*Tanaris*	*Lontrel 720 SG + Gondor*	*Belkar*	*Korvetto*	*Panarex*	*Centurion Plus*
HRAC-Gruppe	15 (K3), 4 (O)	15 (K3), 4 (O)	4 (O)	4 (O)	A, O	1 (A)	1 (A)
Aufwandmenge/ha	0,25 l + 1 l	1 - 1,5 l	165 g + 0,5 l	0,5 l oder 2 x 0,25 l	1 l	1 l	1 l
Anwendung	NA	NA	NA	NA (Herbst)	NA (Frühjahr)	NA	NA
Gewässerabstand	10/1/1/1 m	10/1/1/1 m	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Amarant							
Besenrauke							
Distelarten			+		+		
Ehrenpreis							
Erdrauch	+			+	+		
Franzosenkraut							
Gänsefuß, Weißer							
Hellerkraut							
Hirtentäschel							
Hohlzahn, Gemeiner							
Hundspetersilie							
Kamille		+	+		+		
Klatschmohn					+		
Klettenlabkraut	+	+		+	+		
Knöterich, Ampferblättriger							
Knöterich, Vogel-							
Knöterich, Winden-							
Kornblume							
Kreuzkraut, Gemeines							
Melde, Gemeine							
Phacelia							
Stiefmütterchen, Acker-							
Taubnessel							
Vogelmiere							
Borstenhirse							
Fingerhirse							
Hühnerhirse							
Rispe, Einjährige							+
Rispenhirse							
Ausfallgetreide							
Flughafer							
Fuchsschwanzgras, Acker-							
Quecke						1)	
Windhalm							
Trespenarten							

1) 2,25 l Panarex2,) bei starkem Druck 1,5 l Tanaris im VA

nicht wirksam

schwach wirksam

gut wirksam

sehr gut wirksam

KORVETTO

Günstiges Rapsherbizid zur Unkrautkorrektur im Frühjahr

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 4060

Gewässerabstand:
1m

Packungsgröße:
3 l Kanister

Wirkstoffe:
Arylex
Clopyralid

HRAC-Gruppe:
4 (O)

EINZIGARTIG, DA:

- **Günstig und sicher im Frühjahr Unkräuter korrigieren**
- **Sehr wirksame Kombination aus den Wirkstoffen Arylex und Clopyralid**
- **Hervorragende Breitenwirkung im Raps auch gegen große Unkräuter: Klatschmohn, Klettenlabkraut, Storchschnabel-Arten, Erdrauch, Kornblume, Kamille-Arten, Taubnessel-Arten sowie Distel-Arten**

ANWENDUNG:

1 l Korvetto/ha
im Frühjahr von Vegetationsbeginn bis BBCH 50

EMPFEHLUNGEN:

WIRKUNGSSPEKTRUM:



LONTREL 720 SG

Der Profi gegen Kamille und Distel

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 3409

Gewässerabstand:
1 m

Packungsgrößen:
165 g Dose
1 kg Dose

Wirkstoff:
Clopyralid

HRAC-Gruppe:
4 (O)

EINZIGARTIG, DA:

- Sehr verträgliche Korrekturspritzung im Frühjahr
- Hochkonzentriertes wasserlösliches Granulat
- Weniger Verpackung

ANWENDUNG:

165 g Lontrel 720 SG + 0,5 l Gondor/ha

Gondor®

Bei wüchsigen Bedingungen gegen Problemunkräuter Kamille, Distel, Klatschmohn. Für einen optimalen Bekämpfungserfolg sind Nachttemperaturen über 10 °C, 2 Tage lang nach der Anwendung erforderlich.

EXPERTENTIPP:

- Sichere und starke Wirkung bis in die Wurzel
- Sehr gut verträglich und mischbar

TANARIS

Raps- und Rübenherbizid mit nachhaltiger Wirkung

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 3697

Gewässerabstand:
10/1/1/1 m

Packungsgröße:
5 l Kanister

Wirkstoffe:
Quinmerac
Dimethenamid-p

HRAC-Gruppen:
15 (K3), 4 (O)

EINZIGARTIG, DA:

- Vorlage oder Mischpartner zu Belkar im Nachauflauf
- Wirkung über Blatt und Boden gegen Ehrenpreis, Vogelmiere, Kamille u.a.
- Möglich auch in Wasserschutz- und -schongebieten

ZUGELASSEN GEGEN:

- Einjährige ein- und zweikeimblättrige Unkräuter in Raps und Zuckerrübe

ANWENDUNG:

1 l Tanaris + 0,25 l Belkar/ha im 2-Blattstadium
oder
1,5 l Tanaris im Vorauflauf gefolgt von 0,25 l Belkar/ha im Nachauflauf (bei starkem Vogelmiere-Druck und Ehrenpreis)

WIRKUNGSSPEKTRUM:



WIRKUNGSWEISE:

Tanaris erfasst viele Unkräuter inkl. Klettenlabkraut und Hundspetersilie sowie Unkrauthirsen. Es wird über Wurzeln, Hypokotyl, Keimblätter und Laubblätter aufgenommen. Deshalb erfasst Tanaris aufgelaufene und im Auflaufen befindliche Pflanzen in den frühen Stadien. Ausreichende Feuchtigkeit verbessert die Bodenwirkung.

BELKAR

Sichere Unkrautbekämpfung im Raps im Nachauflauf!

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 3957

Packungsgrößen:
1 l Flasche
5 l Kanister

Wirkstoffe:
Arylex
Picloram

HRAC-Gruppen:
4 (O)

EINZIGARTIG, DA:

- **Gezielte Anwendung im Nachauflauf im Herbst**
- **Mischbar mit Tanaris, Cymbigon Forte gegen Erdfloh und Panarex oder Centurion Plus gegen Gräser**
- **Breites Wirkungsspektrum (inkl. Besenrauke) - rasche Wirkung**

ANWENDUNG:

2 x 0,25 l Belkar/ha im 2-Blattstadium und 4 - 6-Blattstadium
oder **1 x 0,5 l Belkar/ha** im 6-Blattstadium oder
0,25 l Belkar + 1 l Tanaris/ha mit stärkerer Wirkung gegen Ehrenpreis, Kamille, Vogelmiere

WIRKUNGSSPEKTRUM:

	Belkar Splitting Anwendung	Belkar + Tanaris
Aufwandmenge	2 x 0,25 l/ha mit 14 Tagen Abstand	0,25 l + 1 l/ha
Einsatzzeitraum	BBCH 12 + 16	BBCH 12
Ackerhellerkraut	■	■
Ackerstiefmütterchen	■	■
Besenrauke	■	■
Echte Kamille	■	■
Ehrenpreis-Arten	■	■
Erdrauch	■	■
Geruchlose Kamille	■	■
Hirtentäschel	■	■
Klatschmohn	■	■
Klettenlabkraut	■	■
Kornblume	■	■
Storchschnabel-Arten	■	■
Taubnessel-Arten	■	■
Vogelmiere	■	■
Wegrauke	■	■
Weißer Gänsefuß	■	■

EMPFEHLUNGEN:



CENTURION PLUS

Macht mit Schadgräsern Schluss

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 4254

Gewässerabstand:
1m

Packungsgröße:
5 l Kanister

Wirkstoff:
Clethodim

HRAC-Gruppe: 1 (A)

ANWENDUNG:

1 l Centurion Plus/ha
gegen Einjährige einkeimblättrige Unkräuter

EINZIGARTIG, DA:

- **Einfache und günstige Anwendung**
- **Einziger Wirkstoff gegen Einjährige Rispe und Raygräser**
- **Ideales Resistenzmanagement dank DIM-Wirkstoff**

ZUGELASSEN IN:

- Zucker- und Futterrüben
- Kartoffeln
- Raps
- und viele andere Kulturen

TOPREX

Schutz vor Phoma und vor Überwachsen

ÜBERSICHT:

Pfl.Reg.Nr.: 3130-0

Gewässerabstand:
5/1/1/1 m

Packungsgröße:
5 l Kanister

Wirkstoffe:
Paclobutrazol,
Difenoconazol

FRAC-Gruppe: 3

ANWENDUNG:

0,5 l Toprex/ha bei gut entwickelten Beständen
0,35 l Toprex/ha bei mittleren Beständen und geringerem Phomadruck einsetzen

Ab dem 6 Blattstadium für gesunde, gut entwickelte Bestände in Kombination mit Wuxal einsetzen.

PRAXISTIPP:

Damit erfassen Sie sicher Phoma-Infektionen und nutzen die lange Fungizidwirkung. Gleichzeitig wirkt Toprex als starker Wachstumsregler.

PANAREX

Günstige Gräserbekämpfung im Raps

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 3201

Gewässerabstand:
1m

Packungsgröße:
5 l Kanister

Wirkstoff:
Quizalofop-P-tefuryl

HRAC-Gruppe:
1 (A)

EINZIGARTIG, DA:

- **Sicher gegen Ausfallgetreide und Ungräser**
- **Flüssigformulierung enthält bereits Netzmittel**
- **Nachhaltige Wirkung durch gute Wirkstoffverteilung**

ZUGELASSEN IN:

- Raps
- Lein
- Zuckerrüben
- Kartoffeln
- Ackerbohnen
- Erbsen

Panarex, im Herbst gemeinsam mit Fungizid und Insektizid einsetzbar

ANWENDUNG:

1 l Panarex/ha
Gegen Ausfallgetreide und einjährige Ungräser (ausgenommen Einjährige Rispe)

2,25 l Panarex/ha
Gegen Quecke

Das blattaktive Panarex wird nach dem Auflaufen der Schadgräser mit 200 bis 400 l Wasser pro ha gespritzt. Der Wirkstoff wird systemisch verteilt und stoppt sofort die Pflanzenentwicklung.

MOSPILAN 20 SG

Sicher gegen Rapsglanzkäfer

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 2830

Gewässerabstand:
3/1/1/1 m

Packungsgrößen:
500 g Flasche
3 kg Packung

Wirkstoff:
Acetamiprid

IRAC-Gruppe:
4A

EINZIGARTIG, DA:

- ▶ Gegen alle Biotypen des Rapsglanzkäfers
- ▶ Mischbar mit Prosaro in die beginnende Blüte
- ▶ Anwenderfreundliche Granulatformulierung

ZUGELASSEN IN:

- Raps
- Mais
- Kartoffeln
- Zierpflanzen
- vielen Obst- und Gemüsekulturen

ANWENDUNG:

150 - 200 g Mospilan 20 SG
+ 0,15 l Designer/ha

Designer®

Ab Entwicklung der Blütenanlage (BBCH 50) bis zum Beginn der Blüte (BBCH 61), nach dem Erreichen der Schadschwelle oder nach Warndienstaufruf spritzen.

EXPERTENTIPP:

Robert Schweifer:
Mospilan 20 SG ist im Raps und vielen anderen Kulturen gegen die wichtigsten Schädlinge zugelassen und kann breit eingesetzt werden.

Gegen Rapsschädlinge im Frühjahr



Schädlingsstrategie im Raps

CYMBIGON FORTE

Ertragssicherung gegen Stängelrüssler

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 3998

Packungsgrößen:
0,25 l für 5 ha
1 l für 20 ha
5 l für 100 ha

Wirkstoff:
Cypermethrin

IRAC-Gruppe:
3A

EINZIGARTIG, DA:

- **Jetzt fünffach konzentriert**
- **Starke Sofortwirkung (Knock-Down-Effekt)**
- **Gegen alle wichtigen Rapsschädlinge registriert**

ZUGELASSEN IN:

- Winterraps
- Senf
- Sommerraps

ANWENDUNG:

50 ml Cymbigon Forte + 0,15 l Designer/ha

Designer®

Rechtzeitig bei Befallsbeginn bzw. bei Erreichen der Schadschwelle spritzen. Auf gute Benetzung achten. Die Behandlung im Bedarfsfall wiederholen (maximal 2 Anwendungen pro Saison).

EXPERTENTIPP:

Mit Cymbigon Forte im Herbst sicher Erdfloh und Rübsenblattwespe bekämpfen.
Im Frühjahr optimal gegen Rapsstängel- und Kohltriebrüssler in Kombination mit AZO-SPEED einsetzen. Wirkt auf nicht resistente Rapsglanzkäfer (Kombination mit Mospilan 20 SG) und erfasst den Kohlschotenrüssler.

ALLOWIN

Das Schneckenkorn mit höchster Wirkungssicherheit

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 3217

Packungsgrößen:
4 kg Packung
18 kg Packung

Wirkstoff:
Metaldehyd

EINZIGARTIG, DA:

- **Alle Nackt- und Gehäuseschnecken werden sicher erfasst**
- **Breite Zulassung im Acker-, Gemüse-, Obst- und Zierpflanzenanbau**
- **Einzigartige Vorteile im Vergleich zu anderen Schneckenkörnern hinsichtlich Regenfestigkeit, Lockwirkung, Streubarkeit, Wirkungsgeschwindigkeit und –sicherheit**

ANWENDUNG:

3 kg Allowin/ha
Bei früher Anwendung vor dem Auflaufen der Kultur

4 kg Allowin/ha
Bei Furchenanwendung oder Saatbeimischung

5 kg/ha und Anwendung = maximal erlaubte Aufwandmenge bei starkem Druck, neben Gräben. In Summe ist die Ausbringung von 17,5 kg Allowin pro Kultur und Jahr erlaubt. Mit Granulatstreuer flächig ausbringen oder zur Furchenanwendung.

Allowin gleich nach dem Rapsanbau mit 3 kg/ha ausbringen. Dies ist hocheffizient, da die Schnecken weg sind, bevor die Kulturpflanze geschädigt werden kann.

EXPERTENTIPP:

Legen Sie zur Befallskontrolle am „schneckengefährdetsten" Teil des Ackers eine Plastikfolie (50 x 50 cm) aus und kontrollieren Sie regelmäßig, ob sich darunter Schnecken verbergen.

Schneckenkorn

WUXAL COMBI B PLUS

Sicherung der Borversorgung

ÜBERSICHT:

Packungsgröße:
10 l Kanister

Nährstoffe:
84 g/l B
70 g/l Mn
3,5 g/l Mo
42 g/l S

EINZIGARTIG, DA:

- Sichert die Versorgung und behebt Mangelsituationen
- Rapspflanzen haben einen sehr hohen Borbedarf
- Bessere Frühentwicklung des Bestandes sowie höhere Winterfestigkeit

ANWENDUNG:

2 l Wuxal Combi B Plus/ha

Im Herbst ab dem 4-Blattstadium in Kombination mit Herbiziden, Fungiziden bzw. Wachstumsreglern.

Gut entwickelter Raps durch Wuxal Combi B Plus-Düngung im Herbst

WEITERE INFORMATIONEN: myWUXAL

Mit myWUXAL erhalten Sie alle Informationen die Sie benötigen, um das Beste aus Ihren Kulturen herauszuholen - zu Hause, auf dem Feld, online oder offline.

Eine Besonderheit von myWUXAL ist die Möglichkeit, es als App über **myWUXAL.com** herunterzuladen, um es auch ohne Internetverfügbarkeit zu nutzen.

WUXAL BORON SICURE

NEU

Borversorgung & Spurenelemente

ÜBERSICHT:

Packungsgrößen:
10 l Kanister
25 l Fass

Nährstoffe:
72 g/l N
185 g/l P
110 g/l B
14 g/l Si
+ Spurenelemente voll chelatisiert mit EDTA
Fe, Zn, Mn, Cu, Mo

EINZIGARTIG, DA:

- Deutlich verstärkte Borwirkung durch Kombination mit Stickstoff und Phosphor
- Effiziente Boraufnahme über Blätter und Blüten
- Silizium stärkt Zellwände und erhöht die Widerstands-fähigkeit gegen abiotischen Stress
- Komplette Ausstattung mit Spurenelementen für vitales Wachstum
- Hervorragende Pufferung der Spritzbrühe und sehr gute Mischbarkeit mit Pflanzenschutzmitteln
- Bor und Silizium fördern Blüte, gleichmäßige Reife und Ertragssicherheit
- Steigert den Ölgehalt und die Qualität der Samen

ANWENDUNG:

2 l WUXAL Boron SiCure/ha

Gemeinsam mit der Behandlung gegen Stängelrüssler und Rapsglanzkäfer im Frühjahr.

Wuxal Boron SiCure zur Förderung der Pollenbildung im Knospenstadium

AZO-SPEED

Die Top-Blattdüngung mit Stickstoff, Magnesium und Schwefel

ÜBERSICHT:

Packungsgrößen:
20 l Kanister
für 1 - 4 ha
200 l Fass
für 10 - 40 ha
1.000 l Gittercontainer
für 50 - 200 ha

Nährstoffe:
300 g/l Stickstoff (N)
67 g/l Schwefel (SO_3)
33 g/l Magnesium (MgO)

EINZIGARTIG, DA:

- **Hocheffiziente und sichere N-Versorgung**
- **Magnesium und Schwefel zur verbesserten Stickstoffverwertung**
- **Deckt Bedarf an Magnesium zum Aufbau von neuem Blattapparat im Frühjahr**

Anwendungsbeispiel von AZO-SPEED: 10 l/ha in Kombination mit der Rapsstängelrüsslerbekämpfung

ANWENDUNG:

4 x 5 l oder
2 x 10 l AZO-SPEED/ha

EXPERTENTIPP:

Einsetzbar im Frühjahr von Vegetationsbeginn bis zur Blüte in Kombination mit Insektiziden, Wachstumsreglern und Bordüngern.

WUXAL SCHWEFEL

Stickstoffdüngerlösung mit Schwefel und Spurennährstoffen

ÜBERSICHT:

Packungsgrößen:
20 l Kanister
200 l Fass

Nährstoffe:
200 g/l N
693 g/l SO_3
Mikronährstoffe

EINZIGARTIG, DA:

- **Stickstoff und Schwefel sofort und vollständig über das Blatt verfügbar**
- **Frei von elementarem Schwefel, der nicht für die Pflanze verfügbar ist**
- **Herbstanwendung erhöht die Frosttoleranz**
- **Verbessert die Verfügbarkeit von Stickstoff**
- **Regt das Wachstum im Frühjahr an**

ANWENDUNG:

3 l Wuxal Schwefel/ha im Herbst und

3 l Wuxal Schwefel/ha im Frühjahr

EXPERTENTIPP:

Schwefel ist ein wichtiger Nährstoff für die Ölqualität in Ölsaaten. Wuxal Schwefel kombiniert Schwefel und Stickstoff, um das Pflanzenwachstum und die Ölproduktion zu verbessern.

Blattdüngerempfehlungen im Winterraps



WUXAL ASCOFOL SICURE

NEU

Zur Stärkung der Pflanzengesundheit unter biotischem/abiotischem Stress

ÜBERSICHT:

Inhaltsstoffe:
6,5 % Kalium
3 % Bor
0,8 % Mangan
0,5 % Zink
3 % organischer Kohlenstoff
5% Silizium

Gebinde:
10 l
25 l

EINZIGARTIG, DA:

- **Innovative SiCure Technologie: Kombination aus bioverfügbarem Silizium und hochwertigem Algenextrakt für maximale Pflanzenvitalität.**
- **Synergistische Wirkung: Stärkt Stressresistenz gegenüber Trockenheit, Hitze und Frost durch aktivierte pflanzliche Schutzmechanismen.**
- **Gezielte Mikronährstoffversorgung: Fördert Zellteilung, Fruchtgröße und Schalenqualität durch optimierte Photosynthese und Nährstoffeffizienz.**

ANWENDUNG:

2 - 3 l/ha in Ackerbau, Wein- und Obstbau und Gemüsebau

N-LEAF

Atmosphärische Stickstofffixierung

ÜBERSICHT:

Packungsgrößen:
1 l, 5 l

Inhaltsstoffe:
10^9 UFC/ml
Methylobacterium und Arthrobacter

Lagertemperatur:
4-25 °C
licht- u. luftgeschützt

EINZIGARTIG, DA:

- **Fixiert atmosphärischen Stickstoff und macht diesen pflanzenverfügbar**
- **Unterstützt Wurzelbildung, Photosynthese und Nährstoffaufnahme**
- **Umweltfreundlich**
- **Stärkt die Vitalität und Widerstandsfähigkeit der Pflanzen**

ANWENDUNG:

N-LEAF 0,5 l/ha für viele Kulturen, darunter Getreide, Raps, Mais, Gemüse, Sonnenblume, Soja, Kartoffel.

TRIFENDER WP

Für gesundes Pflanzenwachstum

ÜBERSICHT:

Aktivstoff:
Trichoderma asperellum T1

Packungsgrößen:
1 kg Packung
5 kg Packung

Lagerung:
Kühl lagern

EINZIGARTIG, DA:

- **Gesunde Kulturpflanzen durch rasches Wurzelwachstum**
- **Anwendung in allen Kulturen möglich**
- **Sorgt für besseres Auflaufen der Kultur**
- **Reduzierte Krankheitsanfälligkeit - mehr Ertrag**
- **Trichoderma verbessert die Aufnahme von Phosphor**
- **Trichoderma stärkt die Widerstandskraft der Pflanzen gegen biotische und abiotische Schadfaktoren**

ANWENDUNG:

0,5 – 1 kg Trifender WP/ha
sorgt bei der Aussaat des Raps für besseres Auflaufen, verbesserte Jugendentwicklung im Herbst, verbesserte Überwinterung, verstärktes Wurzelwachstum, erhöhte Blattmasse, verbesserte Qualität

ERTRAGSAUSWERTUNG:

Kwizda Versuchsstation, Terpeszemble, Ungarn:



+ 7 % Ertrag im Vergleich zur unbehandelten Kontrolle

ÖL- UND EIWEISSPFLANZEN

SONNENBLUME

SOJA

KÜRBIS

ACKERBOHNE

EXPRESS SX IN SONNENBLUMEN

Sicherheit zum günstigsten Preis

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 2914

Gewässerabstand:
1 m

Packungsgrößen:
100 g Dose
750 g Dose

Wirkstoff:
Tribenuron-Methyl

HRAC-Gruppe:
2 (B)

EINZIGARTIG, DA:

- **Breite Auswahl toleranter Hochleistungssorten**
- **Zur sicheren, günstigsten Unkrautbekämpfung im NA**
- **Wirkung unabhängig von Bodenfeuchtigkeit und Humusgehalt**

ZUGELASSEN IN:

- Express SX toleranten Sonnenblumen

HAUPTEMPFEHLUNG:

Anwendung im Splitting
30 g Expess SX + 0,25 l Gondor/ha
Im 2 bis 4-Blattstadium (BBCH 12 - 14)

nach 7 - 14 Tagen gefolgt von **30 g Express SX + 0,25 l Gondor/ha**
im 6-Blattstadium (BBCH 16) der Sonnenblume

Einfachbehandlung:
45 g Express SX + 0,25 l Gondor/ha
Im 4 bis 6-Blattstadium der Sonnenblume (Gänsefuß max. im 4-Blattstadium)

ANWENDUNG:

Express SX ist blattaktiv, daher müssen die Unkräuter bei der Anwendung aufgelaufen sein. Beste Wirkung und Verträglichkeit unter wüchsigen Bedingungen. Es dürfen nur tribenuronmethyl-tolerante Sorten - mit dem Aufkleber am Saatgutsack - behandelt werden.

PRAXISTIPP:

Zumischung eines Gräsermittels bei 30 g Express SX/ha möglich. Zumischung von 2 l Wuxal Boron Plus/ha bei der Herbizidanwendung zur besseren Befruchtung.

VIBALLA

Einzigartige Lösung gegen Ambrosie in Sonnenblumen

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr.: Art. 53 Antrag gestellt

Packungsgröße:
5 l Kanister

Wirkstoff:
Halauxyphenmethyl
(Tradename Arylex active)

HRAC-Gruppe: 4 (O)

ANWENDUNG:

1 l Viballa/ha zwischen 4- und 10-Blattstadium der Sonnenblume

Anwendbar in allen Sonnenblumensorten gegen Ambrosia (vorbehaltlich Zulassung nach Art. 53). Viele andere Problemunkräuter werden miterfasst. Gegen Stechapfel und Schwarzer Nachtschatten müssen andere Produkte (z.B. Express SX bei toleranten Sorten) eingesetzt werden.

Viballa Art.53 Antrag
Gegen Ambrosie, resistenten Amarant und andere Unkräuter wurde ein Art. 53 Antrag für Viballa gestellt.

KWIZDA SOJA PACK

Die sichere und verträgliche Herbizidlösung im Vorauflauf

EINZIGARTIG, DA:

- In allen Soja Sorten verträglich
- Keine Wurzelhalseinschnürungen
- Wirkstoffdepot im Boden sichert die Wirkung
- Gute Unterdrückung von Problemunkräutern

ANWENDUNG:

0,25 l Reactor + 2 l Successor 600 + 0,4 l Grounded/ha oder

1 Kwizda „Soja Pack" + 1 l Grounded + 2,5 l Stomp Aqua für 2,5 ha

PRAXISTIPP:

Der Zusatz von 0,4 l/ha Grounded reduziert die Abdrift, verhindert die Einwaschung von Clomazone in die Keimzone und verbessert die Verteilung und Anhaftung an der Bodenoberfläche.

WIRKUNGSWEISE:

Die Kombination der Wirkstoffe Clomazone und Pethoxamid ergibt ein sehr breites Wirkungsspektrum und eine lange anhaltende Dauerwirkung gegen zweikeimblättrige Samenunkräuter, Unkrauthirsen und andere Ungräser. Die beste Wirkung wird in der Keimphase der Ungräser und Unkräuter erzielt. Voraussetzungen für eine sichere Wirkung sind ein feinkrümeliges, gut abgesetztes Saatbett und eine ausreichende Bodenfeuchtigkeit (15 mm).

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr.
Reactor 2733-901
Successor 600 2881

Gewässerabstand:
15/10/5/1 m

Packungsgröße:
Kwizda Soja Pack
für 2 ha
(0,5 l Reactor,
4 l Successor 600)

Wirkstoffe:
Clomazone
Pethoxamid

HRAC-Gruppen:
13 (F4), 15 (K3)

CENTIUM CS

Zur Unkrautkontrolle in Soja

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 2733

Gewässerabstand:
1 m

Packungsgröße:
0,5 l Flasche

Wirkstoff:
Clomazone

HRAC-Gruppe: 13 (F4)

WIRKUNGSWEISE:

Frühzeitiges Ausschalten der Unkrautkonkurrenz (Ambrosia und andere Unkräuter)

Ausgezeichnete Kulturpflanzenverträglichkeit in Kombination mit TM-Partnern und Grounded

AUFWANDMENGE:

0,25 l Centium CS/ha
im Vorauflauf gegen Ambrosia und andere Unkräuter

Saubere, gesunde und wüchsige Sojabohnen mit unserem Schutzprogramm

TRICO

Die Nr. 1 gegen Wildverbiss

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 2787

Wirkstoff:
Schaffett

Packungsgrößen:
5 l, 10 l

EINZIGARTIG, DA:

- **Bereits Randbehandlung bei Feldkulturen wirksam**
- **Zweifachwirkung (Geruch und Geschmack)**

ZUGELASSEN IN:

- Mais, Sonnenblume, Soja, Raps
- Hopfen, Holunder
- Weinbau
- Forst

AUFWANDMENGE:

15 l Trico/ha
in 200 l Wasser flächig ausbringen in gefährdeten Bereichen (Waldnähe, hoher Wilddruck)

WIRKUNGSWEISE:

Mit Trico eingesprühte Pflanzen wirken abstoßend auf Reh- und Rotwild.

Oft genügt eine Randbehandlung auf der Waldseite der Felder, damit die Rehe die Feldkulturen meiden. Ein bis zwei Spritzenbreiten außen um die Kulturfläche bei Raps, Soja, Sonnenblume oder Mais wird gegen Rehwild empfohlen.

PRAXISTIPP BEI HASEN:

Wuxal Amino zur Vergrämung – 2 l Wuxal Amino in 2 l Wasser ansetzen – 2 Tage in der Sonne stehen lassen (beginnt zu stinken). Dann mit Wasser verdünnt ausbringen.

TRICO®

UNSER „KÜRBIS-SCHUTZ-PROGRAMM“

TRIFENDER WP

Für gesundes Pflanzenwachstum

EINZIGARTIG, DA:

- Gesunde Kulturpflanzen durch rasches Wurzelwachstum
- Reduzierte Krankheitsanfälligkeit - ideal bei hohem Druck mit Auflaufkrankheiten im Ölkürbis
- Steigerung der Bodengesundheit
- Trichoderma verbessert die Aufnahme von Phosphor
- Trichoderma stärkt die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen gegen biotische und abiotische Schadfaktoren

ANWENDUNG:

1 kg Trifender WP/ha

bei Böden mit hohem Infektionsdruck durch bodenbürtige Schaderreger

ÜBERSICHT:

Aktivstoff:
Trichoderma asperellum T1

Packungsgrößen:
1 kg Packung
5 kg Packung NEU

Lagerung:
Kühl lagern

CENTIUM CS + FLEXIDOR + QUANTUM + GROUNDED

Die neue Unkrautstrategie im Kürbis

ÜBERSICHT:

Centium CS
Pfl. Reg. Nr. 2733

Gewässerabstand:
1 m

Packungsgröße:
0,5 l Flasche

Wirkstoff:
Clomazone

HRAC-Gruppe: 13 (F4)

Flexidor
Pfl. Reg. Nr. 2691

Gewässerabstand:
10/3/3/1 m

Packungsgröße:
1 l Flasche

Wirkstoff:
Isoxaben

HRAC-Gruppe: 29 (L)

EINZIGARTIG, DA:

- **Bodenherbizide mit breiter Wirkung**
- **Dauerwirkung von Flexidor gegen Spätverunkrautung**
- **Ideale Kombination gegen Problemunkräuter wie Gänsefuß, Melde, Franzosenkraut, Amarant und Schwarzer Nachtschatten**

Unkrautfreier Kürbisbestand mit guter Ertragserwartung

ANWENDUNG:

0,25 l Centium CS
+ 0,25 l Flexidor
+ 1,25 - 1,5 l Quantum
+ 0,4 l Grounded/ha

Unmittelbar bis 3 Tage nach der Saat anwenden. Die Kürbissamen sollen 2 - 3 cm mit Erde bedeckt sein.

WIRKUNGSSPEKTRUM U. WIRKUNGSWEISE:

Centium und Flexidor wirken auf keimende Samen von Unkräutern, wie z. B. Weißer Gänsefuß, Melde, Franzosenkraut, Vielsamiger Gänsefuß, Amarant, Nachtschatten, Zweizahn. Quantum ergänzt das Wirkungsspektrum auf Hirsearten.

EXPERTENTIPP:

Für eine ausreichende Wirkung sind entsprechende Niederschläge nach der Anwendung (min. 15 mm) sowie ein feinkrümeliges Saatbeet erforderlich.

QUANTUM

Breit wirksames Bodenherbizid zur Flächenbehandlung in Kürbis in Kombination mit Centium CS

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 2881-901

Gewässerabstand:
15/10/5/1 m

Packungsgröße:
5 l Kanister

Wirkstoff/HRAC:
Pethoxamid/15 (K3)

EINZIGARTIG, DA:

- **Zugelassenes Herbizid zur flächigen Anwendung in Kürbis**
- **Gute Nachfolgelösung im Kürbis nach Wegfall von Dual/Basar**
- **Kombinierbar mit Centium, Flexidor und Grounded bei wüchsigen Auflaufbedingungen des Kürbisses**

ANWENDUNG:

1,5 l Quantum
+ 0,25 l Centium CS
+ 0,4 l Grounded/ha

EXPERTENTIPP:

Die neue Herbizidlösung mit breiter Wirkung im Kürbis. Wichtig für eine gute Verträglichkeit sind wüchsige Auflaufbedingungen. Nicht vor Kälteperioden anbauen, sondern zuwarten bis die Bedingungen passen.

HERBIZIDPROGRAMM FÜR FUTTERERBSE UND ACKERBOHNE

Stallion SyncTec - Centium CS (nur Futtererbse) - Panarex

EINZIGARTIG, DA:

- **Patentierte Synchron Technologie**
- **Kontrollierte Freigabe beider Wirkstoffe**
- **Breites Wirkungsspektrum inkl. Hirsen, Rispen und viele einjährige, zweikeimblättrige Unkräuter**

ANWENDUNG:

3 l Stallion SyncTec/ha
im VA auf feinkrümeligen, gut abgesetzten Boden spritzen.

ZUGELASSEN IN:

- Ackerbohne
- Futtererbse
- Kartoffel

ÜBERSICHT STALLION SYNC TEC:

Pfl. Reg. Nr. 3483

Gewässerabstand:
-/-/15/5 m

Packungsgröße:
5 l Kanister

Wirkstoffe:
Clomazone
Pendimethalin

HRAC-Gruppen:
3 (K1), 13 (F4)

Saubere Ackerbohnen- und Erbsenbestände mit Stallion Sync Tec im Vorauflauf behandelt

CENTIUM CS

Der Klettenlabkraut- und Knöterichspezialist

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 2733

Gewässerabstand: 1 m

Packungsgröße:
0,5 l Flasche

Wirkstoff: Clomazone

HRAC-Gruppe: 13 (F4)

EINZIGARTIG, DA:

- **Frühzeitiges Ausschalten der Unkrautkonkurrenz**
- **Ausgezeichnete Kulturpflanzenverträglichkeit**
- **Basisherbizid in vielen Kulturen (Kartoffel, Kürbis, Erbsen, Soja, Karotten und Mohn)**

ANWENDUNG:

0,25 l Centium CS/ha Im Vorauflauf unmittelbar bis 3 Tage nach der Saat spritzen. Die Spritzung muss in jedem Fall vor dem Auflaufen der Kulturpflanzen erfolgen.

PANAREX

Hohe Sicherheit zum günstigen Preis

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 3201

Gewässerabstand: 1 m

Packungsgrößen:
1 l Flasche
5 l Kanister

Wirkstoff:
Quizalofop-P-tefuryl

HRAC-Gruppe:
1 (A)

EINZIGARTIG, DA:

- **Panarex gegen einjährige Gräser und Ausfallgetreide**

ANWENDUNG:

1,25 l Panarex/ha
Anwendung gegen Quecke: **2,25 l Panarex/ha**

COLUMBO 0,8 MG

Gegen Bodenschädlinge im Gemüsebau

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 4114-0

Gewässerabstand:
1 m

Packungsgröße:
12 kg Sack

Wirkstoff:
Cypermethrin
(als Mikrogranulat)

IRAC Gruppe:
3A

EINZIGARTIG, DA:

- **Der Spezialist gegen Bodenschädlinge in Gemüse**
- **Drahtwurmfrei auch in Zuckerrübe**
- **Richtig kombiniert bei der Aussaat**

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG:

Mit **24 kg Columbo 0,8 MG/ha** in die Säfurche gegen Drahtwurm in Kartoffel.
In allen anderen Kulturen mit **12 kg Columbo 0,8 MG/ha** in die Säfurche.

ZUGELASSEN IN:

• Kartoffel gegen Drahtwurm	24 kg/ha
• Zuckerrübe gegen Drahtwurm	12 kg/ha
• Karotten gegen Drahtwurm, Karottenfliege (zur Schadensminderung)	12 kg/ha
• Knollensellerie, Pastinaken, Wurzelsellerie gegen Karottenfliege	12 kg/ha
• Wurzel- und Knollengemüse (Doldengewächse und Kreuzblütler) gegen Drahtwurm	12 kg/ha
• Kopf-, Blumen- und Blattkohle gegen Drahtwurm und Kleine Kohlfliege	12 kg/ha
• Raps gegen Drahtwurm, Kleine Kohlfliege, Rapserdfloh	12 kg/ha
• Kürbis gegen Drahtwurm	12 kg/ha
• Zwiebelgemüse gegen Drahtwurm	12 kg/ha
• Tabak gegen Drahtwurm	12 kg/ha
• Rasen gegen Drahtwurm, Erdraupen	12 kg/ha
• Melanzani gegen Drahtwurm, Erdraupen	12 kg/ha
• Tomaten gegen Drahtwurm, Erdraupen	12 kg/ha


Knollensellerie mit Columbo schützen

Kohlrabi schädlingsfrei mit Columbo

ZWIEBEL

SPRITZPLAN FÜR DIE ZWIEBELPRODUKTION

Unkrautbekämpfung	Unkräuter & Schad-gräser	Stomp Aqua			
	Unkräuter & Distel		Fantasia Lontrel 720 SG		
Krankheiten	Falscher Mehltau			Zorvec Entecta (Zulassung erwartet)	
	Falscher Mehltau, Mehlkrankheit, Samtfleckenkrankheit			Promesa	
	Botrytis und Falscher Mehltau			Winner	
	Falscher Mehltau, Botrytis, Colletotrichum, Alternaria, bakterielle Schaderreger & Stemphylium-Blattflecken	Trifender WP*		Cuprofor flow Kwizda Kartoffel & Zwiebel Pack	
				2 L Wuxal Ascofol SiCure	Royal MH
Beize, Keimhemmung/Dünger	Drahtwurm	Columbo			
	Thripse			Spintor / Cymbigon forte	
	Wachstumsstadien BBCH	0 Keimung / Keimpflan-zenentwicklung	12 - 13 2.-3. Laubblatt (> 3 cm) deutlich sichtbar	16 - 19 6.-9. Laubblatt (> 3 cm) deutlich sichtbar	41 - 47 Bei 10% der Pflanzen Schlotten geknickt



* Pflanzenhilfsmittel zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit gegenüber biotischen und abiotischen Schadfaktoren

CUPROFOR FLOW

Hocheffizientes Kupfermittel mit dem „Flow-Effekt“

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 3034-901

Gewässerabstand:
-/-/-/20 m

Packungsgrößen:
1 l Flasche
5 l Kanister
10 l Kanister

Wirkstoff:
Kupfer

FRAC-Gruppe: Multi-site

EINZIGARTIG, DA:

- **Breit zugelassen und wirksam gegen wichtige Zwiebelkrankheiten**
- **Gegen Falschen Mehltau, Alternaria, Colletotrichum, Stemphylium, bakterielle Schaderreger**
- **Österreichisches Produkt**

PREIS AKTION
CUPROFOR FLOW
10 L KANISTER
SOLANGE DER VORRAT REICHT

ANWENDUNG:

Zugelassen: 4 Anwendungen mit je **2,6 l Cuprofor flow/ha** (Achtung max. 3 kg Reinkupfer/ha ausbringen). Durch die feine Vermahlung ist bereits bei **1,75 l Cuprofor flow/ha** die volle Kontaktwirkung gegeben. Wartefrist = 3 Tage

PROMESA

Der Alleskönner

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 4286

Gewässerabstand:
5/5/1/1 m

Packungsgrößen:
1 l Flasche
5 l Kanister

Wirkstoff:
Azoxystrobin

FRAC-Gruppe:
11

EINZIGARTIG, DA:

- **Lange wirksam mit Vitalisierungseffekt**
- **Bekämpft 3 Krankheiten auf einen Schlag**
- **Auch in vielen anderen Kulturen zugelassen**

ANWENDUNG:

Max. 2 Anwendungen pro Jahr ab dem 3. Laubblatt mit **1 l/ha** gegen Falschen Mehltau, Mehlkrankheit und Samtfleckenkrankheit ab dem 3. Laubblatt.

Mit **1 l Promesa + 0,4 l Winner** ist auch Botrytis fest im Griff.

WINNER

Zur Krankheitsbekämpfung in Zwiebel

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 2528

Gewässerabstand:
5/1/1/1 m

Packungsgrößen:
1 l Flasche
3 l Flasche

Wirkstoff:
Fluazinam

FRAC-Gruppe:
29

EINZIGARTIG, DA:

- **Das einzige Kontaktfungizid mit Stoppeffekt in Zwiebel**
- **Zugelassen gegen Falschen Mehltau und Botrytis**
- **Perfekter Mischungspartner zu vorbeugenden Fungiziden bei Befall**

ANWENDUNG:

3 x 0,5 l Winner/ha
Das einzige sporizide Fungizid, Winner, ist auch im Kwizda Zwiebel Pack enthalten. Bei hohem Druck, vorbeugend:
1 l Promesa + 0,5 l Winner/ha.

HINWEIS:

- Regenfest nach 1 Stunde
- Wartezeit 14 Tage

KARTOFFEL UND ZWIEBEL PACK

Gegen Peronospora und Botrytis in Zwiebel und Schalotten

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr.
4221-901 + 2528-0

Packungsgröße:
3 x 5 l Prevint Flow
1 x 5 l Winner

Wirkstoff:
200 g/l Initium
+ 500 g/l Fluazinam

FRAC-Gruppe:
45; 29

Formulierung:
Emulsionskonzentrat (EC)

EINZIGARTIG, DA:

- Völlig neuer Wirkstoff in der Zwiebel
- Sicherer Schutz , der mitwächst
- Doppelt vorbeugend und sporizid
- Weniger Gebinde für 12,5 ha

ZUGELASSEN IN:

- Zwiebel
- Schalotten
- Kartoffel

ANWENDUNG:

1,2 l Prevint Flow + 0,4 l Winner/ha

Der Kwizda Kartoffel und Zwiebel Pack besteht aus Prevint Flow (Initium) und Winner (Fluazinam). Initium greift in die Atmung des Schaderregers ein und hemmt die Differenzierung und Beweglichkeit der Zoosporen sowie die Zoosporenentlassung aus den Zoosporangien. Diesem speziellen Wirkungsmechanismus wird der Multi-Site Wirkstoff Fluazinam als Resistenzvorbeugung zur Seite gestellt. Zusammen ergibt dies eine zweifach vorbeugende und durch Winner eine zusätzlich sporenabtötende Wirkungsweise.
Der Kwizda Kartoffel & Zwiebel Pack reicht für 12,5 ha und darf 2 x pro Saison angewendet werden. Wartefrist: 28 Tage

WIRKUNG KWIZDA KARTOFFEL & ZWIEBEL PACK IM VEGETATIONSVERLAUF:



SPINTOR

Ein modernes Insektizid gegen Thripse

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 3296

Gewässerabstand:
5/5/5/1 m

Packungsgrößen:
0,1 l Flasche
0,5 l Flasche
2 l Flasche NEU

Wirkstoff:
Spinosad

IRAC-Gruppe:
5

EINZIGARTIG, DA:

- Neuartiger Wirkmechanismus
- Sichere Wirkung auch bei hohen Temperaturen
- Besonders umwelt- und nützlingsschonend
- Biotauglich
- Sehr breite Zulassung

WARTEZEIT:

7 Tage (Speisezwiebel)
14 Tage (Bundzwiebel)

ANWENDUNG:

Designer®

Gegen Thripse in Speisezwiebel
0,2 l SpinTor/ha
in 400 - 600 l Wasser,
max. 4 Anwendungen

Gegen Thripse in Bundzwiebel
0,3 l SpinTor/ha
in 400 - 600 l Wasser,
max. 2 Anwendungen

Die Zugabe von 0,15 l Designer/ha optimiert in beiden Fällen die Wirkung

EXPERTENTIPP:

Hoher Wirkungsgrad auch bei hohen Temperaturen (Thripswetter). Beste Wirkung bei Spritzungen in den Morgenstunden.

CYMBIGON FORTE

Gegen Thripse und Lauchmotte in Zwiebel

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 3998

Packungsgrößen:
0,25 l für 5 ha
1 l für 20 ha
5 l für 100 ha

Wirkstoff:
Cypermethrin

IRAC-Gruppe:
3A

EINZIGARTIG, DA:

- Preiswert gegen wichtige Schädlinge
- Zulassung in Zwiebel, Schalotten, Knoblauch und Porree

WARTEZEIT:

7 Tage

ANWENDUNG:

Designer®

Gegen saugende (Thripse) und beißend-minierende (Lauchmotte) Schädlinge
50 ml Cymbigon Forte/ha

Die Zugabe von 0,15 l Designer/ha optimiert die Wirkung.

Auf gesunde Bestände achten, frei von Schadinsekten.

LONTREL 720 SG

Effizient bis in die Wurzel

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 3409-0

Gewässerabstand:
1 m

Packungsgrößen:
165 g Dose
1 kg Dose

Wirkstoff:
Clopyralid

HRAC-Gruppe:
4 (O)

EINZIGARTIG, DA:

- **Sehr gute Wirkung gegen Distel und Kamille**
- **Hochkonzentriertes wasserlösliches Granulat**
- **Gute Verträglichkeit**

ANWENDUNG:

Gegen Ackerkratzdistel und zweikeimblättrige Unkräuter in Zwiebelgemüse (Nutzung als Trocken- oder Bundzwiebel).
2 x 80 g Lontrel 720 SG/ha im Abstand von 5 bis 10 Tagen

Lontrel gegen Distel in Zwiebel

HINWEISE:

- max. 2 Anwendungen /Jahr
- ab 4-Blattstadium der Kultur bei wüchsigen Bedingungen einsetzen.

WARTEZEIT:

Trockenzwiebel: KEINE
Bundzwiebel: 35 Tage

FANTASIA

Wirkt über Blatt und Boden

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 4342-0

Gewässerabstand:
10/5/5/1 m

Packungsgrößen:
5 l Kanister
15 l Kanister

Wirkstoff:
Prosulfocarb

HRAC-Gruppe:
15 (N)

EINZIGARTIG, DA:

- **Über Blatt und Boden wirksam**
- **Gute Hirsewirkung**
- **Breites Unkrautspektrum**

ZUGELASSEN IN:

- Speisezwiebel und Frühlingszwiebel
- Getreide, Kartoffel, Mohn, Ackerbohne, u.a.

ANWENDUNG:

In Speise- und Frühlingszwiebel im NA im 1 - 3-Blattstadium:
4 l Fantasia/ha in 200 - 400 l Wasser

EXPERTENTIPP:

Volle Wirkung ist bei vorwiegend über den Boden wirksamen Herbiziden nur bei ausreichend Bodenfeuchte oder bei Niederschlag bis ein paar Tage nach der Applikation zu erwarten.

Sauberer Bestand mit Fantasia

ROYAL MH 60 SG

Zur Verhinderung der Triebbildung in Zwiebel

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 3281-0

Gewässerabstand:
1 m

Packungsgröße:
5 kg Sack

Wirkstoff:
Maleinhydrazid

EINZIGARTIG, DA:

- **Einfache Handhabung auf dem Feld**
- **Höhere Zwiebelqualität bei Lagerung und Verkauf**

ZUGELASSEN IN:

- Zwiebelgemüse: Speisezwiebel, Knoblauch, Schalotten, Perlzwiebel, Wintersteck-zwiebel.

ANWENDUNG:

4 kg Royal MH/ha in 500 l Wasser/ha
Netzmittelzusatz unbedingt empfohlen: 0,25 l Neo-Wett/ha

EXPERTENTIPP:

- Keine Niederschläge in den ersten 10 Stunden nach der Anwendung
- Wartezeit 7 Tage
- Am Ende der Wachstumsperiode, ca. 4 - 5 Wochen vor der Ernte, wenn 10 % bis 50 % der Schlotten geknickt sind.

TRIFENDER WP

Für gesunde Pflanzen

ÜBERSICHT:

Aktivstoff:
Trichoderma asperellum T1

Packungsgrößen:
1 kg Packung
5 kg Packung

Lagerung:
Kühl lagern

EINZIGARTIG, DA:

- **Gesunde Kulturpflanzen durch rasches Wurzelwachstum**
- **Anwendung in allen Kulturen möglich**
- **Reduzierte Krankheits-anfälligkeit - mehr Ertrag**
- **Trichoderma verbessert die Aufnahme von Phosphor**
- **Trichoderma stärkt die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen gegenüber biotischen und abiotischen Schadfaktoren**

ANWENDUNG:

0,5 – 1 kg Trifender WP/ha
bei Kartoffeln und Gemüse (Zwiebel, Knoblauch, andere Gemüsepflanzen) Ausbringung vor/bei der Aussaat Spritzen und Einarbeitung in den Boden

INSEKTIZIDE

Produkt	Kultur	Indikation	Aufwandmenge	Anw.*	Wartefrist
CYMBIGON FORTE Pfl. Reg. Nr. 3998-0	Karotten	Möhrenfliege, Blattläuse, Raupen	50 ml/ha		7 Tage
	Radieschen, Schwarzwurzel	Erdflöhe, Blattläuse, Raupen	50 ml/ha		7 Tage
	Petersilie, Kren, Knollensellerie, Pastinake	Blattläuse, Raupen	50 ml/ha		7 Tage
	Knoblauch, Schalotten, Zwiebel, Porree	Lauchmotte, Thripse	50 ml/ha		7 Tage
	Blumenkohle, Kopfkohle, Kohlsprossen,	Blattläuse, Raupen, Kohltriebrüssler, Erdflöhe, Rübsenblattwespe	50 ml/ha		7 Tage
	Erbsen (mit und ohne Hülsen), Bohnen (mit Hülsen)	Erbsenblattrandkäfer, Erbsenwickler, Blattläuse	50 ml/ha		7 Tage
	Bohnen (ohne Hülsen)	Erbsenblattrandkäfer, Erbsenblattwickler, Blattläuse	50 ml/ha		14 Tage
	Rote Rübe		50 ml/ha		7 Tage
	Steck- und Stoppelrübe	Raupen, Blattläuse	50 ml/ha		7 Tage
		Raupen, Blattläuse, Erdflöhe			
HARPUN Pfl. Reg. Nr. 3837-0	Tomaten[2], Gurken[2], Melanzani[2]	Weiße Fliege	3,75 ml/100 m² (Pflanzenhöhe bis 50 cm) 7,50 ml/100 m² (Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm) 11,25 ml/100 m² (Pflanzenhöhe über 125 cm)	2	3 Tage
Mospilan 20 SG Pfl. Reg. Nr. 2830-0	Gurke[1]	Blattläuse	0,15 kg/ha	2	3 Tage
	Gurke[2]	Blattläuse	0,15 - 0,3 kg/ha	2	3 Tage
	Kräuter (frisch)[3]	Blattläuse	0,25 kg/ha	2	3 Tage
	Kräuter (frisch)[1]	Weiße Fliegen	0,3 kg/ha	2	3 Tage
	Zucchini, Kürbis-Hybriden	Blattläuse	0,15 kg/ha	2	3 Tage
	Kohlrabi[1]	Kohlmottenschildlaus, Mehlige Kohlblattlaus	0,325 kg/ha	2	14 Tage 14 Tage
	Blumenkohle, Kopfkohle[1]	Weiße Fliegen	0,325 kg/ha	2	14 Tage
	Blumenkohle, Kopfkohle[1]	Blattläuse	0,25 kg/ha	2	14 Tage
	Kohlsprossen[1]	Weiße Fliegen	0,325 kg/ha	2	21 Tage
	Kohlsprossen[1]	Blattläuse	0,25 kg/ha	2	21 Tage
	Tomaten, Melanzani[2]	Blattläuse	0,15 - 0,225 kg/ha	2	3 Tage
	Schnittmangold, Kohlrübe, Stielmus, Spinat, Stielmangold, Kohlgemüse, Feldsalat (Vogerlsalat), Speiserübe (Stoppelrübe, Mairübe), Erbse (Gemüseerbse), Blattgemüse Korbblütler, Winterportulak (Tellerkraut), Rote Rüben, Gemüseportulak (Sommerportulak), Kressen, Rucola, Raucken, Radieschen (Rettich), Schwarzer Rettich, Wollfrüchtiger Feldsalat Nutzung als Baby-leaf-Salat	Blattläuse	0,25 kg/ha	1	3 Tage
Columbo 0,8 MG* Pfl. Reg. Nr. 4114-0	Gemüseindikationen siehe S. 88 Indikationen „Granulat gegen Bodenschädlinge“		12 kg/ha	1	
Raptol HP Pfl. Reg. Nr. 4477-0	Jungpflanzen	Blattläuse, Thripse, Schmetterlingsraupen	0,6 l/ha	2	-
	Salate	Blattläuse, Schmetterlingsraupen	0,6 l/ha	2	7 Tage
	Tomaten, Aubergine Gewächshaus	Blattläuse	0,6 - 1,2 l/ha	2	3 Tage
	Spargel, Kohlgemüse	Schmetterlingsraupen, Käfer	0,6 - 1,2 l/ha	2	3 Tage
	Bohnen	Blattläuse	0,6 - 1,2 l/ha	2	1 Tage
	Erbsen	Blattläuse	0,6 l/ha	2	1 Tage
	Kräuter	Blattläuse, Thripse, Schmetterlingsraupen, Käfer	0,6 l/ha	2	3-7 Tage

*Max. Zahl der Anwendungen [1] nur Freiland [2] nur unter Glas [3] Freiland und unter Glas [4] Zwischenreihenbehandlung [5] Nach dem Stechen

Produkt	Kultur	Indikation	Aufwandmenge	Anw.*	Wartefrist
SPINTOR Pfl. Reg. Nr. 3296-0	Kohlgemüse [1] (ausgen. Kohlrabi und Blattkohle)	Freifressende Schmetterlingsraupen, Thripse	0,2 l/ha	4	3 Tage
	Speisezwiebeln [1], Porree [1]	Thripse	0,2 l/ha	4	7 Tage
	Zwiebelgemüse [1] (Bundzwiebeln)	Thripse	0,3 l/ha	2	14 Tage
	Feldsalat [1]	Minierfliegen	0,3 l/ha	2	14 Tage
	Tomaten [2]	Thripse	0,3 – 0,6 l/ha	4	3 Tage
		Minierfliegen	0,6 – 1,2 l/ha	4	3 Tage
	Gurke [2]	Thripse	0,3 – 0,6 l/ha	3	3 Tage
	Melanzani [2]	Thripse	0,3 – 0,6 l/ha	4	3 Tage
		Minierfliegen	0,6 – 1,2 l/ha	4	3 Tage
	Gemüsefenchel [1]	Thripse	0,3 l/ha	2	7 Tage
	Schnittlauch [3]	Thripse, Lauchmotte, Minierfliegen	0,2 l/ha	2	7 Tage
			0,2 l/ha	2	7 Tage
	Rucola-Arten [3]	Minierfliegen, Thripse	0,2 l/ha	2	7 Tage
	Salat [1], Endivie [1], Basilikum	Minierfliegen, Thripse	0,3 l/ha	2	7 Tage
	Salat, Endivie [2]	Minierfliegen, Thripse	0,3 l/ha	2	14 Tage
	Buschbohne [1]	Minierfliegen, Thripse	0,3 l/ha	2	14 Tage
	Erbse [1]	Minierfliegen, Thripse	0,3 l/ha	2	14 Tage
	Paprika [2]	Thripse	0,3 l/ha	2	3 Tage

AKARIZIDE UND MOLLUSKIZIDE

Produkt	Kultur	Indikation	Aufwandmenge	Anw.*	Wartefrist
ACORIT 250 SC Pfl. Reg. Nr. 3550-0	Gemüsebau [2] Gurke, Zucchini, Melone, Kürbis, Wassermelone, Paprika, Tomaten, Melanzani (Aubergine)	Spinnmilben (Eier und Larven)	max. 0,32 l/ha	1	3 Tage 3 Tage
			max. 0,40 l/ha (0,20 l/ha/m Pflanzenhöhe)		3 Tage
	Gurke [1]		max. 0,12 l/ha		3 Tage
	Hopfen		max. 0,6 l/ha		28 Tage
SAMBA K Pfl. Reg. Nr. 2762-0	Gemüsebau [2] Tomaten, Melanzani, Paprika, Gurke, Zucchini	Spinnmilben	0,9 - 2 l/ha bei Pflanzhöhen bis 50 - über 200 cm		
			1,5 - 2 l/ha bei Pflanzhöhen bis 50 cm und 50- 100 cm	1	7 Tage
	Bohnen (frisch, mit Hülsen)				
ALLOWIN Pfl. Reg. Nr. 3217-0	Tomaten, Melanzani, Paprika, Gurke, Zucchini	Nackt- und Gehäuseschnecken	5 kg/ha (max. 17,5 kg/ha und Jahr)		0 Tage 0 Tage 0 Tage
	Hülsenfrüchte [1], Artischocken [1], Kopfkohle [1], Kohlsprossen [1], Salat [3], Spinat [3], frische Kräuter [3], Karfiol [1], Brokkoli [1]	Nackt- und Gehäuseschnecken	5 kg/ha (max. 17,5 kg/ha und Jahr) oder 4 kg/ha in die Saatfurche streuen		0 Tage 0 Tage
	Kohlrübe [1], Steckrübe [1], Rote Rübe [1], Zuckermais [1]				

HERBIZIDE

Produkt	Kultur	Indikation	Aufwandmenge	Anw.*	Wartefrist
CENTIUM CS Pfl. Reg. Nr. 2733-0	Karotten, Mohn, Ölkürbis, Futtererbsen, Sojabohne	Klettenlabkraut, Vogelmiere, Taubnesselarten, u. a. Unkräuter	250 ml/ha	1	0 Tage

*Beachten Sie bitte die aktuell gültigen Indikationen zum Anwendungszeitpunkt in der Kultur im AGES Register, da 2026 Änderungen erwartet werden.

*Max. Zahl der Anwendungen [1] nur Freiland [2] nur unter Glas [3] Freiland und unter Glas [4] Zwischenreihenbehandlung [5] Nach dem Stechen

GEMÜSE

Produkte und Anwendungen

HERBIZIDE

Produkt	Kultur	Indikation	Aufwandmenge	Anw.*	Wartefrist
FANTASIA Pfl. Reg. Nr. 4342-0	Speisezwiebel (Trockenzwiebel)	1-keimbl. u. 2-keimbl. Unkräuter	4 l	1	60 Tage
	Frühlingszwiebel	1-keimbl. u. 2-keimbl. Unkräuter	4 l	1	60 Tage
	Stangensellerie	1-keimbl. u. 2-keimbl. Unkräuter	4 l	1	60 Tage
	Knollensellerie	1-keimbl. u. 2-keimbl. Unkräuter	4 l	1	100 Tage
	Porree	1-keimbl. u. 2-keimbl. Unkräuter	4 l	1	70 Tage
	Kümmel	1-keimbl. u. 2-keimbl. Unkräuter	4 l	1	90 Tage
	Schnittlauch (Bulbenanzucht)	1-keimbl. u. 2-keimbl. Unkräuter	5 l	1	0 Tage
	Echte Kamille	1-keimbl. u. 2-keimbl. Unkräuter	4 l	1	42 Tage
	Johanniskraut	1-keimbl. u. 2-keimbl. Unkräuter	4 l	1	70 Tage
	Ampfer-Arten (Pharm. Zwecke)	1-keimbl. u. 2-keimbl. Unkräuter	3 l	1	10 Tage
	Gingko (Pharm. Zwecke)	1-keimbl. u. 2-keimbl. Unkräuter	3 l	1	10 Tage
	Primula-Arten (Pharm. Zwecke)	1-keimbl. u. 2-keimbl. Unkräuter	3 l	1	10 Tage
LONTREL 720 SG Pfl. Reg. Nr. 3409-0	Zwiebel	Distel, 2-keimblättrige Unkräuter	83 g/ha	2	0 Tage
	Bundzwiebel	Distel, 2-keimblättrige Unkräuter			35 Tage
	Rhabarber[4]	Distel, 2-keimblättrige Unkräuter	167 g/ha	1	0 Tage
	Zuckermais	Distel, 2-keimblättrige Unkräuter	167 g/ha	1	70 Tage

FUNGIZIDE

Produkt	Kultur	Indikation	Aufwandmenge	Anw.*	Wartefrist
CUPROFOR FLOW Pfl. Reg. Nr. 3034-901 PREIS AKTION CUPROFOR FLOW 10 L KANISTER SOLANGE DER VORRAT REICHT	Kürbis mit genießbarer Schale[3]	Falscher Mehltau, Bakterielle Schaderreger	2,6 l/ha	4	3 Tage
	Tomate, Melanzani				
	Wurzelgemüse[1]	Phytophtora, Bakterielle Schaderreger	2,6 l/ha	4	3 Tage
		Blattflecken, Cercospora, Bakterielle Schaderreger	2,6 l/ha	4	14 Tage
	Spargel[4]				
	Paprika[3]	Pilzliche Krankheitserreger	3,3 l/ha	3	0 Tage
	Zwiebelgemüse[1]	Bakterielle Schaderreger	2,6 l/ha	4	7 Tage
	(ausgenommen Porree und Schnittlauch)	Falscher Mehltau, Alternaria, Colletotrichum, Stemphylium, Bakterielle Schaderreger	2,6 l/ha max. 3 kg Reinkupfer/ha/Jahr	4	3 Tage
DAGONIS Pfl. Reg. Nr. 4036-0	Fruchtgemüse Kürbisgewächse mit und ohne genießbare Schale[3]	Echter Mehltau, Didymella brioniae	0,6 l/ha	3	3 Tage
	Futtererbse	Blattbrand, Brennfleckenkrankheit, Rost	2 l/ha	1	7 Tage
	Karotten		0,6 l/ha	2	7 Tage
	Karotten	Echter Mehltau, Alternaria	0,6 l/ha	1	7 Tage
	Wurzel- und Knollengemüse (s. Register)	Sclerotinia	0,6 l/ha	2	7 Tage
		Echter Mehltau			
	Wurzel- und Knollengemüse (s. Register)	Alternaria	1 l/ha	2	7 Tage
	Wurzel- und Knollengemüse (s. Register)	Sclerotinia	2 l/ha	1	7 Tage
	Salat (ausgenommen Chikoree)		2 l/ha	1	14 Tage
	Porree	Sclerotinia, Rhizoctonia	1 l/ha	2	14 Tage
	Brokkoli, Karfiol, Kopfkohl	Alternaria, Rost	1 l/ha	3	14 Tage
	Kartoffel	Alternaria, Mycosphaerella	0,75 l/ha	4	3 Tage
	Tomate[2] Paprika[2]	Alternaria	0,6 l/ha	2	3 Tage
	Tomate[2] Paprika[2]	Echter Mehltau Alternaria	1 l/ha	2	3 Tage
WINNER Pfl. Reg. Nr. 2528-0	Zwiebel, Schalotten	Botrytis, Falscher Mehltau	0,5 l/ha	3	28 Tage

[1] nur Freiland
[2] nur unter Glas
[3] Freiland und unter Glas
[4] Zwischenreihenbehandlung
[5] Nach dem Stechen

*Max. Zahl der Anwendungen

SONSTIGE PRODUKTE GEMÜSE

Produkt	Kultur	Indikation	Aufwandmenge	Anw.*	Wartefrist
ROYAL MH 60 SG Pfl. Reg. Nr. 3281-0	Zwiebel (ausgenommen Frühlingszwiebel)	Verhinderung der Triebbildung	4 kg/ha	1	7 Tage
NEO-WETT	Gemüsebau (z.B. Zwiebel, Kohl, etc.)	Verbesserung der Benetzung	0,1 % (0,2 – 0,3 l/ha)		0 Tage
DESIGNER	Gemüsebau	Zusatz für Fungizide und Insektizide	max. 0,15 l/ha		0 Tage

ERDBEERE

	Produkt	Indikation	Aufwandmenge	Anw.**	Wartefrist
INSEKTIZIDE	**SAMBA K** Pfl. Reg. Nr. 2762-0	Spinnmilben [3]	2 l/ha	1	7 Tage
	LIMOCIDE Pfl. Reg. Nr. 4097-0	Zwiebelthrips [2], Echter Mehltau [2]	3 l/ha	6	1 Tag
	MIMIC Pfl. Reg. Nr. 2620-0	Freifressende Schmetterlingsraupen [1] (in Beständen zur Pflanzguterzeugung)	0,8 l/ha	2	0 Tage
	ACORIT 250 SC Pfl. Reg. Nr. 3550-0	Spinnmilben [1]	0,4 l/ha	1	3 Tage
	SPINTOR Pfl. Reg. Nr. 3296-0	Thripse, Kirschessigfliege, Freifressende Schmetterlingsraupen	0,2 l/ha	2	3 Tage
HERBIZIDE	**FLEXIDOR** Pfl. Reg. Nr. 2691-0	Unkrautbekämpfung	0,4 l/ha	Anwendung auf unkrautfreiem Boden oder Reihenbehandlung	0 Tage
	LONTREL 720 SG Pfl. Reg. Nr. 3409-0	Zweikeimblättrige Unkräuter [1]	167 g/ha	Vor der Blüte oder nach der Ernte (spätestens bis 15. September) gegen Distel	0 Tage
FUNGIZIDE	**DAGONIS** Pfl. Reg. Nr. 4036-0	Echter Mehltau [3]	0,6 l/ha	3	1 Tag
	PROMESA Pfl. Reg. Nr. 4286	Colletotrichum-Beerenkrankheit [3]	1 l/ha	2	3 Tage
	CUPROFOR FLOW Pfl. Reg. Nr. 3034/901	Mycosphaerella [1], Colletotrichum [1], Bakterielle Schaderreger [1]	2,6 l/ha max. 3 kg Reinkupfer/ha/Jahr	5	3 Tage

**Max. Zahl der Anwendungen [1] nur Freiland [2] nur unter Glas [3] Freiland und unter Glas [4] Freiland nach der Ernte [5] Nach dem Stechen

* Aufwandmenge, wenn nicht anders angegeben, pro 100 l Brühe.

GRÄSERMITTEL

Produkt	Kultur	Indikation	Aufwandmenge	Anw.*	Wartefrist
Centurion Plus Pfl.Reg.Nr. 4254-0	Erdbeere, Zwiebel, Knoblauch, Karotte, Kopfkohl, Kümmel zur Samennutzung, Karfiol, Brokkoli, Schwarzwurzel	gegen Einjährige Gräser	1 l/ha	1	30 Tage
		gegen Quecke	2 l/ha	1	30 Tage

GRÜNLAND

SIMPLEX

Herbizid zur Bekämpfung von Ampfer und anderen Unkräutern im Grünland

EINZIGARTIG, DA:

- **Beste Breiten- und Dauerwirkung**
- **Nachhaltige Wirkung gegen Ampfer und andere Dauerunkräuter**
- **Stärkstes Produkt gegen Giftpflanzen (Jakobskreuzkraut)**

ANWENDUNG:

2 l Simplex/ha
Gegen zweikeimblättrige Unkräuter, insbesondere Ampfer, Distel, Löwenzahn und Hahnenfuß

1 %ige Simplex-Lösung
in Wasser zur Horst- und Einzelpflanzenanwendung gegen Ampfer, Distel und Große Brennessel

max. 2 l Simplex/ha
im Streichverfahren (Rotowiper) gegen Ampfer

ANWENDUNGSHINWEISE:

Eine Flächenanwendung erfolgt während der Vegetationsperiode (April - Ende Juli). Eine Punkt- oder Abstreifbehandlung darf auch bei Schnittnutzung durchgeführt werden. Simplex wirkt am besten, wenn sich die Unkräuter zum Zeitpunkt der Behandlung in einer aktiven Wachstumsphase befinden und ausreichend Wirkstoff aufnehmen können.

INFO:

Das Mittel darf nur auf Flächen mit dauerhafter Weidenutzung oder nach dem letzten Schnitt angewendet werden. Keine Schnittnutzung (Gras, Silage oder Heu) im selben Jahr nach der Anwendung. Diese Einschränkung gilt nur nach einer Flächenanwendung.

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 3212

Gewässerabstand:
1 m

Packungsgröße:
1 l Flasche

Wirkstoffe:
Fluroxypyr
Aminopyralid

HRAC-Gruppen:
4 (O)

ARTIS PRO

Mikrobiologisches Pflanzenhilfsmittel zur Ertragssteigerung und Wachstumsförderung

ÜBERSICHT:

Mikroorganismen-präparat

Packungsgröße:
5 kg Packung

AKTIVSTOFF:
Beauveria bassiana Pilz,
Stamm: BOV1 (NCAIM 155/2012); (5 m/m%)

Pilzgehalt:
CFU/g: 1,5 x 10^8
Perlit (90 m/m%)
Wasser (5 m/m%)

EINZIGARTIG, DA:

- **Bodenpilz - natürlicher Gegenspieler von Engerlingen**
- **Unterstützt den Aufwuchs des Grünlandes**
- **Für Bio- und konventionelle Betriebe geeignet**
- **Nachhaltige Sicherung des betriebseigenen Futters**

ANWENDUNG:

3 kg Artis Pro/ha
Ausbringung in Kombination mit der umbruchlosen Grünlanderneuerung unmittelbar vor der Bearbeitung

oder

3 kg Artis Pro/ha
Ausbringung mit dem Cultan Gerät auf steilen oder steinigen Flächen bei ausreichender Bodenfeuchtigkeit

Exigon OD Art. 53 Zulassung gegen Engerlinge für 2026 beantragt.

OD Formulierung mit 0,5 l/ha Aufwandmenge zur Anwendung mit Injektorgeräten (Cultan) auf Wiesen und Weiden oder auf Sportrasenflächen. Auch für EasyCert genehmigt, daher auch bei „Verzicht auf ertragssteigernde Betriebsmittel“und bei biologischer Produktion anwendbar.

RANGER

Das breit wirksame und flexibel einsetzbare Herbizid für Wiesen und Weiden

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 3684

Packungsgröße:
2 l Flasche

Wirkstoffe:
Triclopyr
Fluroxypyr

HRAC-Gruppen:
4 (O)

EINZIGARTIG, DA:

- **Sehr gute Breitenwirkung - gegen Ampfer, Löwenzahn, Brennnessel, Vogelmiere**
- **Wirkstoff Triclopyr wirkt perfekt gegen verholzende Unkräuter und Sträucher**
- **Breites Anwendungsfenster**
- **Sehr gute Gräserverträglichkeit**

ANWENDUNG:

2 l Ranger/ha
zur Flächenbehandlung gegen Ampfer-Arten, Löwenzahn, Brennnesseln und andere zweikeimblättrige Unkräuter

100 ml Ranger/10 l
zur Einzelpflanzenbehandlung und Teilflächenbehandlung gegen Ampfer-Arten und Große Brennnessel

400 ml Ranger in 50 l Wasser/ha zur gezielten Einzelpflanzenbehandlung gegen Ampfer-Arten mit dem Dolchstreich-/Abstreifgerät

ANWENDUNGSHINWEISE:

Die Anwendung erfolgt während der Vegetationsperiode nach dem Auflaufen der Unkräuter. Ranger wirkt am besten, wenn sich die Unkräuter in einer aktiven Wachstumsphase befinden und ausreichend Wirkstoff aufnehmen können.

Hochwertiges Grünland dank Ranger

PROCLOVA

Breit wirksames Grünland-Herbizid mit herausragender Klee- und Gräserschonung

EINZIGARTIG, DA:

- **Breites Wirkspektrum bei gleichzeitiger Kleeschonung**
- **Starke Wirkung auf Doldenblütler (inkl. Bärenklau und Wiesenkerbel)**
- **Neuer Wirkstoff Rinskor Active (Florpyrauxifen-benzyl) kombiniert mit Amidosulfuron**

ZUGELASSEN IN:

- Grünland
  auf Wiesen und Weiden
  zur Flächenbehandlung

ANWENDUNG:

eine Anwendung während der Vegetation

Etabliertes Grünland: **125 g Proclova + 0,25 l NM/ha**
Neuansaaten: **85 g Proclova + 0,17 l NM/ha**

HINWEISE:

Einsatz auf Grünland, einschließlich Wiesen und Weiden mit Weißklee ist möglich.
Optimal bei warmem Wetter, wenn der Boden feucht ist und das Unkraut aktiv wächst.
Trockenstress hat eine geringere Wirksamkeit zur Folge.
Bei schnell wachsendem Grünland kann eine Wuchshemmung auftreten, die nachhaltig keinen Rückgang der produzierten Trockenmasse bewirkt.
Bei neu angelegtem Gras/Klee kann Proclova ab dem Dreiblattstadium des Grases und des Weißklees ausgebracht werden.
Der Einsatz von Proclova auf Neuansaaten mit Rotklee ist zu vermeiden

WIRKUNGSSPEKTRUM:

Unkraut	Ranger	Procloca™	Harmony
Wiesenkerbel	-	✓✓✓	-
Wiesen-Bärenklau	✓✓	✓✓✓	-
Spitzwegerich	✓	✓✓✓	-
Scharfer Hahnenfuß	✓	✓✓	✓
Kriechender Hahnenfuß	-	✓✓	✓
Stumpfblättriger Ampfer	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Löwenzahn	✓✓✓	✓✓	-
Brennnessel	✓✓✓	✓✓	✓
Klee-Arten	✓✓✓	-	✓
Gräser	-	-	✓

ÜBERSICHT:

Pfl. Reg. Nr. 4497

Gewässerabstand:
1/1/1/1

Packungsgröße:
2 ha Packung
(0,75 kg Proclova
+ 0,5 l NM)

Wirkstoffe:
Florpyrauxifen-benzyl;
Amidosulfuron

HRAC-Gruppen:
4 (O), 2 (B)

BERATUNG FELDBAU



Country Manager Österreich

ANDREAS REISCHÜTZ
0664/250 56 80
a.reischuetz@kwizda-agro.att

Spezial-beratung Bio-Produkte

HARALD SCHMIDT
0664/822 5880
h.schmidt@kwizda-agro.at

Spezial-beratung Blattdünger und Bio-Stimulanzien

MATTHIAS BAUER
0664/961 45 34
m.bauer@kwizda-agro.at

Fachberater Gemüse- und Obstbau

GREGOR LEHNER
0664/969 47 18
g.lehner@kwizda-agro.at

Industrieviertel, Burgenland, NÖ Süd

PETER ROJACZ
0664/969 48 33
p.rojacz@kwizda-agro.at

Weinviertel, Marchfeld

MARTIN FELBER
0664/454 03 01
m.felber@kwizda-agro.at

Weinviertel, Marchfeld

ROMAN KÖCHER
0664/852 92 72
r.koecher@kwizda-agro.at

St. Pölten, Tulln, Hollabrunn, Südbahn, Absdorf Spezialberatung Feldbau NÖ

GÜNTHER FISCHELMAIER
0664/400 06 45
g.fischelmaier@kwizda-agro.at

St. Pölten, Tulln, Hollabrunn, Korneuburg, Waidhofen/ Thaya, Horn

JOSEF MANN
0664/780 66 169
j.mann@kwizda-agro.a

Waldviertel, Melk, Scheibbs, Amstetten

ROBERT SCHWEIFER
0664/822 57 38
r.schweifer@kwizda-agro.at

Oststeiermark

MATTHIAS FESSLER
0664/887 63 636
m.fessler@kwizda-agro.at

Steiermark, Kärnten, Spezialberatung Obstbau

FRANZ KRÖLL
0664/534 58 50
f.kroell@kwizda-agro.at

Oberösterreich

LUKAS KASTNER
0664/780 66 131
l.kastner@kwizda-agro.at

Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg

HUBERT HUEMER
0664/466 17 27
h.huemer@kwizda-agro.at

Hier finden Sie Ihren Pflanzenschutzberater und alle regionalen Infos!

Kwizda Agro GmbH, Universitätsring 6, 1010 Wien
Tel.: +43 5 9977 40
E-Mail: agro@kwizda-agro.at
www.kwizda-agro.at

Kwizda Agro